

32104/A

C. XVI. e

18

67. A. 19

31244

feeling
15/10/12



IO. MARIAE LANCISII,
 Intimi Cubicularii & Archia-
 tri Pontificii,
 DE
 SVBITANEIS
 MORTIBVS
 LIBRI DVO.



Juxta Exemplar excusum

ROMÆ,

Sumptibus JO. FRIDERICI GLEDITSCH,
 Bibliopolæ Lipsiensis.


M DCC IX.



CLEMENTI XI.

PONT. OPT. MAX.

IO. MARIA LANCISIVS
FELICITATEM.

 *Aius, ac iustius obsequii genus, quam simplicem libri nuncupationem, sisto ad SANCTITATIS TVÆ PEDES, B. P. dum hos qualescunque labores meos, in publicam salubritatem*

tem Tuo Iussu, qua decet veneratione, susceptos, Tibi nunc humiliter offero. Hoc enim, quantumvis tenuissimo munere, non solum gratum animum erga beneficentissimum Principem; sed promptam etiam, ac sollicitam erga suprema Tua Mandata voluntatem profiteor, & obedientiam. Siquidem, hoc ineunte anno, quo repentinarum mortium strages in Vrbe multis iam mensibus grassabatur, nihil, post diuinam imploratam opem, habuisti prius, quam, detectis causis, ipsas morborum radices euellere. Hinc, ut solitudine, curaue mea vigilantissimæ Prouidentia Tuæ, Principibus aliis ad populorum salutem imitandæ, responderem; suspenso tantisper studio, Tibi iam debito, Tibique a me plures annos elucubrato, de Motu Cordis, & Aneurysmatibus, me totum ad ista

conuerti. Quare Pindari ductu, ^{Ode}
qui, cum promissum Agesidamo ^{I.} &
hymnum distulisset, adiecit alium ^{II.}
breuiorem, ut sorti persoluenda
usuram adiungeret; nos, hasce in-
ter moras, presentes libros, tan-
quam fœnus maioris operis, Tibi
dependimus; hoc certe Pindaro
diligentiores, quod sortem fœ-
nore præcurramus. Vtinam hæc,
PONTIFEX SANCTISSIME,
id vnice assequantur, ut Tuo uni-
uersos apud homines admirabili
iudicio comprobentur: quo sane
iudicio, insigniumque operum, a
Te iam absolutorum, luce, & ex-
emplis in spem erigimur, ut Reli-
gionem quoque ad extrema terra-
rum propagatam, reliquas sacras
Ædes, ac vetera Urbis Monumen-
ta restituta, nouaque in prisco-
rum æmulationem Cæsarum subli-
mius euecta publice gratulemur;


Et magnifica inter hæc naturalibus etiam scientiis latiore viam per tuta, ac solida experimenta patefactam prospiciamus: ne quid sub tanto Principe ipsa Roma vel Atticæ Academiæ, vel exterorum nostræ ætatis inuentis habeat inuidendum; quorum profecto Consiliorum magnitudinem nemo cogitatione rectius metiatur, quam nos, qui SANCTITATI TVÆ propius adstantes, famam de Iustitia, de Celsitudine Animi Tui, cum admirabili moderatione coniuncta, deque cæteris Virtutibus uniuersis latissime diffusam, veritate ipsa longe minorem animaduertimus; atque Tuis in Actibus cunctis ea, quæ raro in eundem conueniunt, una concurrere admiramur, summam nempe doctrinam cum incredibili humanitate, grauitatemque veteris discipli-

*Sciplina, quam crebris ieiuniis, &
austera pietatis exercitatione profite-
ris, mira cum sermonis, morumque
suauitate conspirantem; ut qui tam
sublimi fastigio potestatis, ac merito-
rum, præclarisque operibus antecellis,
tamen aliis Te fœdere charitatis, ac
sensu Christianæ humilitatis exæques.
Ita Deus Te diu sospitem ad Eccle-
siæ & populorum felicitatem seruet,
ac cœptis tuis, votisque nostris beni-
gnus adspiret. Ex Quirinali Tuo
Kal. Nou. MDCCVI.*

Imprimatur,

Si videbitur Reuerendissimo Patri Magistro Sacri Palatii Apostolici,


*Dominicus de Zaulis Episcopus
Verulanus Vices gerens.*



Librum Illustrissimi Domini Io. Mariæ Lancisii perlegi, & gustauī meo non sine lucro, quo in Libro multam quidem doctrinam, & elegantiam, nihil vero Religioni, & moribus Catholicis contrarium deprehendi; propterea, si Reuerendissimo Patri placuerit, in lucem dari posse arbitror.

Romæ iv. Kal. Febr. MDCCVII.

Jacobus Sinibaldus Protomedicus Generalis.



Imprimatur,

Fr. Paulinus Bernardinius Ordinis Prædicatorum Sacri Apostolici Palatii Magister.

OR.

ORDO, ET INDEX

Capitum, Historiarum, & Scholiorum, quæ in duobus iis Libris continentur.

Occasio scribendi.

LIBER PRIMVS.

CAP. I. *Vita in quo consistat præsertim apud animalia perfectæ.* pag. 1.

CAP. II. *Ostenditur mortem esse indiuiduam, & subitanæ, sed ex hominum opinione varie dispertiri.* pag. 6.

CAP. III. *Quæ vera sit in hominibus Mortis idea, & unde discrimina petenda sint.* pag. 10.

CAP. IV. *De Natura, & differentiis repentina mortis.* pag. 13.

CAP. V. *Agitur in genere de causis mortis, quam vocant repentinam.* pag. 15.

CAP. VI. *De causis subitanæ mortis ex parte fluidorum maioris usus, & primo ex parte aëris.* pag. 19.

CAP. VII. *De causis subitanearum mortium ex parte sanguinis.* pag. 22.

- CAP. VIII.** *De causis subitanearum mortium ex parte fluidi neruorum, seu spirituum animalium.* pag. 25.
- CAP. IX.** *De causis subitaneæ mortis ex parte solidorum maioris vsus, & primo ex parte instrumentorum, respirationi famulantium.* pag. 31.
- CAP. X.** *De causis improuisarum mortium ex parte cordis, & magnorum vasorum.* pag. 35.
- CAP. XI.** *De causis improuisarum mortium ex parte cerebri, & neruorum.* p. 43.
- CAP. XII.** *Subitanei morbi hætenus expositi ad tria capita rediguntur, ad Suffocationem, ad Syncopem, atque ad Apoplexiam, quæ & simul plerumque concurrunt.* pag. 57.
- CAP. XIII.** *Recensitæ causæ subitanearum mortium inuincibiles, aut vincibiles existunt.* pag. 61.
- CAP. XIV.** *De signis improuisæ mortis, & primo de simulatis, ac suppositis, seu supplantatis mortibus.* pag. 66.
- CAP. XV.** *Exponitur difficultas inueniendi certa signa, quibus dignoscantur qui natura, non arte pseudo-mortui occurrunt.* p. 69.
- CAP. XVI.** *De signis, quibus pseudo-mortui a vere mortuis distingui possunt.* pag. 73.
- CAP.**

CAP. XVII. *De signis medicis, quibus repentina mors prænosci potest.* pag. 82.

CAP. XVIII. *Agitur de signis futurae mortis repentinae, petitis ex lésione instrumentorum, respirationi famulantium.* pag. 87.

CAP. XIX. *De signis futurae subitaneae mortis a Corde, Magnis Vasis, & Sanguine.* pag. 95.

CAP. XX. *De signis improuise mortis a cerebro, neruis, & liquido animali.* pag. 113.

CAP. XXI. *Agitur in genere de methodo præseruandi a subitaneis mortibus.* p. 119.

CAP. XXII. *Qua methodo præseruanda sunt corpora aspectu sana.* pag. 123.

CAP. XXIII. *De methodo præseruandi a subitaneo interitu corpora valetudinaria.* pag. 130.

LIBER SECVNDVS.

De subitaneis mortibus, illarumque causis, quæ decursu annorum
1705. & 1706. Romæ
contigerunt.

CAP. I. *Queritur, an causa repentinæ mortium, quæ Romæ per hæc tempora grassata sunt, fuerit vniuersalis, & simplex, an vero particularis, & mixta.* pag. 150.
CAP.

CAP. II. *Demonstratur, inaequalem aëris constitutionem fuisse etiam inter causas vagantium repentinarum mortium.* p. 155.

CAP. III. *Adducuntur quædam argumenta ad confirmandum, non ex vniuersali solum causa tot hominum discrimina Romæ contigisse, sed ob morbosas eorundem corporum dispositiones, ac potissimum intemperantiam.* pag. 159.

CAP. IV. *Numerus morientium in Vrbe forsitan hoc tempore minor extitit, licet maior visus sit, ex quo consueti, & exitiales Romæ morbi nequaquam vagati sunt.* pag. 166.

CAP. V. *Quæ remedia hoc anno iis maxime profuerint, qui a subitaneis morbis repentinæ mortes minitantibus, euaserunt.* pag. 169.

OBSERVATIONES.

Physico-Medice nonnullorum, qui, cum primum istiusmodi repentinis morbis tentati fuerint, feliciter euaserunt. pag. 187.

OBSERVATIO I. *Apoplexia cum aphonia, & paralyti dextera corporis medietatis, phlebotomia, chatarticis, ac diaphoreticis soluta.* pag. 188.

OBSERVATIO II. *Fortis Apoplexia cum*

cum relicta paralysi feliciter curata in
Matrona sexagenaria. pag. 192.

OBSERVATIO III. *Subita capitis oc-*
cupatio cum aphonía ex affectione cerebri
partim idiopathica, partim sympathica,
prosperè cedens. pag. 197.

OBSERVATIO IV. *Apoplexia cum af-*
fectione epileptica, & syncopali in para-
lysim dextera medietatis corporis, salua
tunc Ægri vita, concedens. pag. 201.

Ætiologia huius morbi, & Ægri mors. p. 212.

Dissectio cadaueris. pag. 217.

Scholium dissectionis. pag. 221.

OBSERVATIONES.

Physico-Anatomica nonnullorum, qui primo
impetu morbi repente per hæc tempora
perierunt. pag. 235.

OBSERVATIO I. *Repentina mors ex*
apoplexia syncopali in Viro obeso, & ca-
chochymo. pag. 238.

Cadaueris dissectio. pag. 240.

Scholium. pag. 244.

OBSERVATIO II. *Subita mors ex syn-*
cope ob cordis magnitudinem, prolapsum,
atque aneurysma. pag. 252.

Cadaueris dissectio. pag. 254.

Scholium. pag. 256.

OB-

OBSERVATIO III. *Cita mors ob interceptum motum aëris , & sanguinis in præcordiis , vna cum cerebri consensu.*

pag. 269.

Cadaueris dissectio.

pag. 270.

Scholium.

pag. 272.

OBSERVATIO IV. *Repentina mors ex conuulsione thoracis , præcordiorum, meningum, ac totius corporis, in fortissimam apoplexiam ocysime desinente.*

pag. 283.

Cadaueris dissectio.

pag. 284.

Scholium.

pag. 287.

OBSERVATIO V. *Improuisa mors ex subita Causa intra pericardium disruptione cum aneurysmate arteriæ magna.*

pag. 300.

Cadaueris dissectio.

pag. 301.

Scholium.

pag. 305.

OCCASIO SCRIBENDI

De subitaneis Mortibus.



VM in Vrbe Roma
improuisæ homi-
num mortes, decur-
su æstatis, autumni, & hyemis
anni 1705. vsque ad æquino-
ctium vernum currentis anni
1706. frequentius acciderint;
atque hinc vulgus, tacito per-
cussum timore, ac metu erra-
bundum, in diuersa, vt asso-
let, scinderetur, nunc prauam
tabaci qualitatem, nunc puti-
dos ex præteritis terræ moti-
bus excussos halitus, nunc ab-
usum chocolatæ, nunc igno-
tum ambientis virus imperite
non minus, quam temere in-
cusans; merito Sanctissimus,
ac Vigilantissimus Pontifex

CLEMENS XI. primo Animum ad spiritualia Remedia conuertit, feruidis ad Deum fufis Precibus, nouaque in Ecclesia vniuerfali, ad implorandam bene, pieque moriendi gratiam, instituta Liturgia: subinde prudentiam cum pietate coniunxit, & vere sapiens publica vſus fuit prouidentia, quæ in tanti mali cauſas diligenter inquirens, eidem opportuna, ſi quæ forent neceſſaria, præſidia porrigeret, vel ſaltem bona ſpe timidæ, anticipesque populi mentes firmaret. Iuſſit propterea menſe Ianuario labentis anni, vt Protomedicus, & Conſiliarii Medicorum Almæ Urbis Collegii, diſſectis aliquorum, qui repente deceſſerint, cadaueribus, veras graſſantis libitinæ cauſas

Qualis eſſe debeat Principum Sigillaria in his caſibus.

per-

perquirerent; quibus sane extispicijs me idcirco præesse mandauit, vt, re penitus obseruata, si quæ magis spectanda occurrissent, S A N C T I T A T I S V Æ illico referrem.

Omnem interea facturis periculum munificam præbuit opem Eminentiss. Card. Pallauicinus, Gubernator tunc Urbis meritissimus. Qua de re, selecto ad cadauerum sectiones publico Romani Archilycei Theatro, cœpta fuerunt experimenta.

Postulat itaque suspicienda, admirandaque sollicitudo Pontificis, vt, cum omnia, qua publica, totius nempe Christiani Orbis, qua priuata subiectarum prouinciarum studia diuino quodam animi robore ipse regat, ac moderetur, faciatque vnus, & solus, quæ præsens stupeat ætas, & miratura sit

B poste-

postera, postulat, inquam, ut nos quoque in partem et si minimam suarum curarum scribendi celeritate, atque alacritate veniamus. Et quoniam in causas vagantium repentinarum mortium supremo Principis iussu satis per cadauera, perque alias observationes inquisitum fuit, consentaneum rationi ducimus, peracta, fideliterque descripta experimenta ad rationis lancem diligenter expendere; quæ quidem eo nunc liberius in manus hominum prodire sinimus, quod plures viderimus de subitis istius anni casibus sparsim editas hetrusco, ac latino sermone dissertationes, quæ, utcunque argumentum egregie attingant, integrum tamen, propter observationum paucitatem, perstrictumque nimis causarum examen, minime complectuntur.

At

At vero, vt opus hoc nec inu-^{Operis}
tilis, nec indecora doctrinae va-^{distributio.}
rietas commendaret, e re puta-
uimus in primo libro agere de
subitaneis mortibus in vniuer-
sum, idque eo libentius, quo
nemo Recentiorum magnum
aliquid conferre huc videatur.
Multi enim particulatim, &
obiter, nullus, quod sciam, post
detectam circulationem, gene-
ratim, discrete, atque ex institu-
to de hoc argumento scripse-
runt; visuri deinde in secundo
libro veluti in hypothesi, an v-
niuersale, vel particulare, an ve-
ro, vt putamus, mixtum fuerit
principium, ex quo supremi
hoc anno fati causa tot Roma-
nis Ciuibus, & Incolis impen-
derit. Quod varijs insuper ob-
seruationibus anatomicis o-
stendere, ac demonstrare cura-
bimus. Iis frui Lector, & vale.

οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐκ τῶν φανερῶν τὰ ἀφανῆ
σκέπτεσθαι ἐκ' ἐπίστανται, τέχνησιν γὰρ
χρεόμενοι, ὁμοίησιν ἀνθρώπινῃ φύσει, &
γινώσκουσι. Θεῶν γὰρ νότον ἐδίδαξε μι-
μέσθαι τὰ ἐαυτῶν, γινώσκοντας ἅ ποιέου-
σι, καὶ ε' γινώσκοντας ἅ μιμέονται.

At vero homines ex manife-
stis obscura considerare non
nouerunt: quum enim ar-
tibus vtantur similibus hu-
manæ naturæ, id ipsum
ignorant. Diuina enim
Mens edocuit ipsos sua ipso-
rum imitari; ita vt cogno-
scant, quæ faciunt, & non
cognoscant, quæ imitan-
tur.

*Hippocrates lib. 1. de Dieta
num. 13.*

DE SVBITANEIS MORTIBVS

In genere LIBER PRIMVS

*Vita in quo consistat, præsertim apud
animalia perfectæ.*

C A P V T I.



VM nemo veram,
ac perspicuam vl-
lius mortis ideam
 fingere sibi possit,
quin claram prius,
atque veram vitæ
rationem diligenter expendat; pro-
fecto necesse in præsens erit, vt, na-
turam, & causas subitanearum mor-
tium inuestigaturi, genuinas vitæ
notiones præmittamus. Longas
itaque rejicientes disputationum
tricas, quibus Peripatetici se suis

*Ex vite
notione
vera
mortis
idea de-
sumen-
da.*

*Singu-
larium*

*natura
per ide-
as ab-
strac-
tās
raro
eluce-
scit.*

aculeis compungunt ; illud vnice aduertendum ducimus , proprias, atque indiuiduas rerum naturas per complexum multarum abstractarum idearum raro perspicuas haberi posse. Quo fit, vt prisci physiologi, dum vniuersalem quandam vitæ rationem quærunt, quæ cum plant-animalibus, insectis, & monstris, cum piscibus, brutis, & hominibus adamussim congruat, nihil præter confusionem & ambiguitatem nostris mentibus ingerant. Exemplo sint quæ sparsim de vitæ conceptibus obscure tradidit Aristoteles, & collegit inter alios Licetus.

Aristoteles de Vita conceptus tradidit obscuros. lib. de ijs qui viu. sine alim. Res rerumque modi hocum numerum susperant.

II. Cum enim vocum numerus a rebus, rerumque modis longe superetur; cumque nomina a maioribus nostris aliquando perperam rebus imposita fuerint; exinde sæpe oritur, vt, cupientes vna sub voce multas res comprehendere, incauti aut falsas, aut saltem obscuras ideas nostris

stris cogitationibus infundamus, atque admisceamus.

III. Qua de re pauca de vita hic præfaturi, non de quacunque fluidorum motione intra quæcunque resistantium, & cohærentium corporum organa, ex principio seminali proficiscentia, nobis agendum proponimus: (etiamsi sciamus notionem istam vniversales quasdam vitæ regulas, ac rationes in nobis vtcunque posse ingenerare) sed consilium est nostram mentem, sponte alioquin sua, per omnia viuentium regna vagaturam, ad perfectorum, vt aiunt, solummodo animalium vitam inquirendam dirigere, ac serio determinare.

IV. Quod sane, vt assequamur, memoria repetendum est, ex Anatomicis & Chymicis, vitam in perfectis animalibus, (vt consulto de illorum sensationibus taceamus) non vni duntaxat, sed complexui plurimorum principiorum, ac duorum potissimum deberi, organi-

*Vita in
anima-
libus
perfe-
ctis*

Solidorum ac liquidorum maioris usus structura ac motui debetur. cæ nimirum structuræ solidarum partium maioris usus, simulque congruæ mixturæ, fluiditati, ac moli partium liquidarum similis usus, quæ tum intestino nixu, tum etiam externa continentium pressione perenniter ea methodo agitantur in nobis, vt, anima præside, *Ars naturæ operum imitatrix.* liquida cum solidis mutuo sibi opulentur, vicissimque manus præbeant ad motum. Scilicet quemadmodum ars, naturæ operum imitatrix, vt aduertit Hippocrates, qui primus mechanicam in medicina inuexit, quemadmodum, inquam, ars hydraulicas machinas compaginavit, quas eadem aqua mota, dum relabitur, ad certum tempus mouet, iterumque mouetur: ita multiplici, ac nunquam satis admirando diuino artificio, idem Sanguis, chylo renutritus, qui in iam natis ab alterno cordis, pulmonum, ac thoracis motu pellitur, & quaqua- uersum per arterias, mouetur, cum partim immutatus per venas, par- tim

tim sub fluidi animalis crasi per
 nervos recurrat, ac relabatur in
 thoracem, pulmones, & Cor, hæc
 rursus viscera mouet, a quibus fu-
 erat dimotus, eritque in posterum
 per singulas ætates mouendus. Si-
 militer cerebrum suis cum mem-
 branis, quod liquidum animale,
 propriis e glandulis secretum, pro
 sua parte ad mouendum Cor, &
 thoracem per nervos vndatim pel-
 lit, accepto vicissim a corde, ac
 thorace Sanguine pro illius viribus
 mouetur. Vita igitur perfectorum
 animalium nihil aliud esse videtur,
 quam continuus, præside ac mo-
 uente anima, fluxus, ac refluxus,
 plus, minusve sensibilis aeris,
 sanguinis, & liquidi nervorum per
 organa, & ex organis maioris v-
 sus, satis probe constitutis, & mu-
 tuo, atque alterne plus minusve
 sensibilibiter agitatis, & agitantibus;
 ad quorum deinde motuum con-
 seruationem mira profecto ener-
 gia, miroque inter se ordine con-


*Vita
 conti-
 nuus est
 fluxus
 refu-
 xusque
 aeris
 sangui-
 nis &
 liquidi
 nervo-
 rum per
 organa
 maioris
 usus.*

currunt innumera alia organa sub glandularum, tubulorum, muscutorumque specie, per viscera, artusque dispersa; scilicet vt fluida partim renoventur, partim defœcuntur, ac perficiantur.



Ostenditur mortem esse indiuiduam & subitanæam, sed ex hominum opinione varie dispertiri.

CAPVT II.

 Væ per compendium in præcedenti cap. de vitæ ratione posuimus nos facile ducent ad ea intelligenda, quæ mortis subitanæ præsertim naturam, & discrimina, non omnibus obuia, possunt ostendere.

II. Is porro non sum, qui mortem repentinam, vt vulgo fertur, raro censeam aduenire. Nullam enim noui mortem, nisi repentinam,

nam, siue puncto temporis con-
 tingentem: scilicet, vt vitæ prin-
 cipium in puncto saliente, cum
 omnia concurrunt, subito excita-
 tur: ita vitæ finis, cum aliquid ad
 vitæ necessitatem constantissime
 deficit, repente semper, hoc est
 puncto temporis, accidit. Iter v-
 trique ad mortem, quod ægritudi-
 nem, atque agonem appellamus,
 nunc tardum ac longum, nunc
 plus minusue concitatum, ac bre-
 ue fecit, vt vulgus hominum mor-
 tem, suapte natura individuum, di-
 stingeret in longam, breuem, ac
 subitanæam. Illud vero nunquam
 non maxima admiratione me per-
 culit, qui nimirum fiat, vt delica-
 ta, ac perexilis hæc, affabreque
 contexta, ac dimota fluidorum, so-
 lidorumque compago, quam vitam
 in animalibus dicimus, non semper
 citissimo, atque improuiso morbo,
 sed tam sæpe naturali confecta se-
 nio, paulatim contabescat, ac dis-
 soluatur.

*Quali-
bet
mors est
repente-
tina.*

*Vita &
mors
puncto
tempo-
ris ac-
cidunt.*

*Cur
Vulgo
mors,
et si in-
diuidua
in plu-
res ta-
men di-
stingua-
tur.*

III. At enim vero quanquam vniuersæ mortes puncto temporis natura contingant; earum tamen aliquæ nobis metu, ac dolore præuisæ, ac diu, quasi dixerim, præsensæ, aliquæ vero tacite veluti subrepentes, tanquam inopinatæ nobis offeruntur, quæ quidem variorum mortium species varias, corrigendi mores hominum in præceptis labentium, occasiones, & causas moralibus potissimum Philosophis exhibuerunt; varias itidem Iuriconsultis, Canonistis, ac Theologis rationes præbere solent iudicandi, decernendique circa ea, quæ dicuntur, aut fiunt ab hominibus in extremo vitæ termino constitutis. Qua de re fuse differit Paulus Zacchia. Physicis vero non tam morum, rerumque ciuiliū, quam valetudinis curam gerentibus, illud præcipue huiusmodi moriendi discrimina suggerunt, vt diuersas illorum causas diligenter per-

qui-

*Varia
morti-
um spe-
cies
quot
modis
Sicenti-
bus Sti-
les.*

*Quæst.
Med.
leg. lib.
2. tit. p.
quæst.
19.*

quirant , quibus detectis , & cognitis, ipsi iudicent, num prævifas necesse aliquo excogitato, vel experimentis comprobato remedio auertere queant; & num quæ inopinato nobis adveniunt , ipsæ quoque occulto aliquo, & peculiari prævideri signo, atque exhibitto pharmaco, saltem ad animæ salutem , aliquantisper prorogari possint. Quod si nec prævideri, nec prorogari vlla arte valeant, id Medici assequantur, vt Philosophiam experimentalem plenius illustrent. Pulchrum est enim , vt scripsit Hippocrates, ea quoque ad discere, quæ in experimentum assumpta successu caruerunt, & cur successum non habuerunt.

Philosophia experimentalis

mentalis illustratur

etiam ijs, quæ successu caruerunt.

Lib. de articul.

n. 46.


Hippocrat. testimo-
nium.

IV. Itaque huiusmodi rationibus ducti vtemur nos etiam cum vulgo ijs differentiis, & nomenclaturis mortium, quæ inter se distinguuntur non ex varia ipsius necis natura, cuius vna semper, eademque proprietas est subito in-

Mortis differentia
hinc

uadendum petenda

uadendi atque occupandi , sed solummodo ratione causæ, ac modi, nimirum morbi, qui mortem infert; vel ratione nostræ mentis, quæ de futuro interitu silet, aut cogitat: idcirco nonnullas subnectemus definitiones, ac diuisiones, quas ituris per obscuros lethi liberos lumen aliquod prælaturas non dubitamus.



*Quæ vera sit in hominibus Mortis
idea, & unde discrimina petenda sint.*

CAPVT III.



*Mors
est tota-
lis cessa-
tio mo-
tus aë-
ris*

Mors in hominibus, qui perfectorum animalium sunt omnium opinione perfectissimi, quacunque ex causa, & quomodolibet contingat, est vera, & omnimoda cessatio motus aëris, sanguinis, & flu-

fluidi neruorum in organis, & per organa maioris vsus, quæ naturales suas motiones vere, ac omnino amiserunt; ita tamen firma, & constans, vt per naturæ vires rescitari non possit, quam vtique animalium motuum cessationem, seu dissolutionem nexus naturæ, vt cum Aretæo loquar, necessario comitatur, & constituit discessus animæ, quæ, vt momento temporis infunditur, ita momento temporis, plane imperceptibili, seiungitur a corpore, ac separatur.

sanguinis, & liquidi neruorum in organis, & per organa maioris vsus.

II. Huiusmodi vero absoluta cessatio motuum animalium, ac discessus animæ a corpore, quanquam cogitatione citius perpetuo contingat; nihilominus tamen, vulgaris consuetudinis, clariorisque doctrinæ gratia, distinguitur in mortem naturalem, immaturam, & violentam; singulæ vero in lentas, & subitaneas; in præuisas, ac præsensas; denique in improuisas, insensiles, atque inopinatas.

Varia mortis differentia.

*Mors
natu-
ralis
qua-
nam.*

*Etiā
in iuue-
nibus.*

III. Mors naturalis non ea solummodo dicenda est, quæ decrepitis, sed quæ, vel ijs accidit, quos, etsi annorum numero metientes, passim vocemus pueros, adolescentes, ac iuuenes, adeo tamen languidam suorum corporum constitutionem, nascendo, sortitos fuisse videmus, vt breviori temporis decursu, sed pari cum senibus fato, hebescentibus membris, vt Fabius loquitur, similes senectæ pigrescant, ac necem ipsam incurrant; scilicet quod utrobique sensim, ac sine sensu subtile illud, atque oleosum volatile, fluida, solidaque pervadens, ac dimouens, partim transpiratum deficit, partim non extrinsecum desideratur; vnaque simul prompta fibrarum distractilitas, & contractilitas, lento tabo deficiens, fluida vicissim excipere, & contra eadem opportune oscillare non potest.


*Mors
imma-
tura
qualis.*

IV. Mors immatura illa esse videtur, quæ ex interno morbo proveni-

ueniens, homines; cæteroqui sanos, & vegetos, de medio vitæ tollit.

V. Mors denique violenta ea firmanda est, quæ ab externa, & cum sensibili, magnaue vi agente causa, hominibus obvenit.

VI. De cæteris vero indicatis *Violenta* mortium discriminibus ita procul *tabnde* dubio decernendum putamus, vt *dica-* eadem oriri dicantur a variis senti- *tur.* endi, cogitandique modis, quibus homines diuturno, aut celeri, sensibili, aut insensibili morbo, atque agone confectos, cum signis lethali- bus, vel sine illis sublato videmus. De subitanea siquidem, atque improuisa morte, quippe quæ nostri scopus est laboris, accuratius proximo capite agendum esse arbitramur.



*De Natura, & differentiis repen-
tinae mortis.*

CAPUT IV.



Subitanea, seu repentina mors, vltro hodie, vel ipsi vulgo innotescit, quomi-

*Repen-
tina
mortis
idea.*

nus longo sermone sit pertractanda: illa siquidem appellari solet, quæ per morbum celerrimi motus homines ut plurimum sanos, vel morbis inducias permittentibus dentos, absque ullo, vel certe breviori agone de viuentium numero tollit; & cum plerunque inopinato imperitis adueniat, terribile facit moriendi compendium.

*Mors
ex præ-
cordio-
rum pa-
ralysi
insensi-
bilis.*

*Synco-
pem le-
thalem
ex ob-
structione
& corro-
sione*

II. In subitanea vero nece diligenter notandum est, morbi celeritatem, ex qua ipsa constituitur, aliquando esse nobis insensilem, & improuisam, ut occurrit e. g. in syncope ex præcordiorum, vasorumque sanguineorum paralyti, quæ, nihil nobis de illa cogitantibus, aut sentientibus, in mortem transire solet, si perseueret; aliquando vero ægrotis esse sensibilem, & curantibus præuisam; quemadmodum obseruamus in eademmet lethali syncope ex obstructione, & corrosione magnorum vasorum, hanc enim præcedere solent anhelitus,

tus; dolores circa cor, pulsus inæ-
 qualitates, & animi deliquia, quæ
 vltro præsentuntur, mortemque
 reddunt Medicis non modo præui-
 sam, sed præcautam. Vt nihil pe-
 nitus dicamus de vulneribus sum-
 morum vasorum, de magnis cere-
 bri contusionibus, de fulminum
 ictu, de carbonis empyreumate, de
 peste, similibusque veneficis causis,
 quæ nunc præsensæ, nunc clanculum,
 sæpe tamen repente solent occidere.

magno-
rum ba-
sorum
qua-
nam
præce-
dant.



*Agitur in genere de causis mortis,
 quam vocant repentinam.*

CAPUT V.

Hic statim notandum, nullam
 esse causam, seu ægritudi-
 nem, celerrime occidere
 potentem, quæ vires suas per
 diuisibilia temporis momenta non
 exerceat; & licet acutissimorum,
 atque maxime exitialium tempora

Subita-
neæ
mortis
cause
semper
cum
tempore
operari
solent.

(a) In
suo
Tract.
de
morb.
subit.

morborum , quos (a) Ranchinus merito subitaneos vocat , velocissimo cursu compleri advertamus, nunquam tamen in syncope , e. g. aut apoplexia , quantumvis ocysissime plerunque soleant interimere, aliqua temporis momenta non excurrunt , priusquam ad illud perveniatur momentum , in quo talis fluidorum, solidorumque quies inducta sit, quam post animæ discessum , mortem appellamus. Hoc autem propterea hic aduertimus, ne lector in posterum quæratur, si nos acturi de subitanæ , quam vocant, mortis causis , nonnullarum meminerimus, quæ clam , aut palam, semper tamen cum tempore, nostrorum etiam sensuum iudicio operari solent.

Occasi-
ones sa-
pe con-
fundun-
tur cum
causis
subita-
nea
mortis.
(b) Lib.
9. c. 12.

II. Præterea monendum ducimus, quædam pro veris subitaneorum mortium causis sæpe sæpius accusari, quæ potius occasiones videntur habendæ. (b) *Fine namque vite nostra*, ut ait Val. Max. *variis*,

Et occultis causis exposito, interdum quadam immerentia supremi fati titulum occupant: cum magis in tempus mortis incidant, quam ipsam mortem accersant.

III. Quanquam vero innumeræ sint causæ, quæ subitaneas mortes valent inducere, eæque varie inter se misceri, & complicari soleant, ut raro simplicem inuenias; duobus tamen generibus, ad doctrinæ claritatem, apte distingui posse videntur, quorum alterum est vitium solidorum, alterum fluidorum maioris usus, dummodo vitium sit constans, & maximum. Etenim cum vitam posuerimus in motu liquidorum, ac solidorum prædicti usus; certe quidquid citissime, ac pertinaciter enunciata fluida, aut solida maxime lædere, vel alternos illorum motus, qui nullo artis, vel naturæ auxilio restituantur, tollere potest, repentinam mortem inducet.


*Mortis
subita-
nea
causa
duplicis
sunt ge-
neris.*

IV. Et quoniam tria sunt fluida,

Solida totidemque solida maioris usus, quæ
& flui- vitæ machinam potissimum librant,
da ma- scilicet ex parte liquidorum primo
ioris b. aër, secundo sanguis, tertio flui-
sus b. dum neruorum; ex parte solido-
traque rum, primo aspera arteria cum pul-
tria; & monibus, cæterisque partibus respi-
qualia. rationi inferuientibus; secundo cor
 cum appensis sanguiferis vasis; ter-
 tio cerebrum cum neruis, præfer-
 tim splanchnicis: eapropter ab ho-
 rum altero, pluribus, aut omnibus,
 seorsim, aut simul, modo maxime,
 & constantissime læsis, improuisa
 mors impendere potest: vt enim
 singula hæc, integra cum sunt, in
 vitæ beneficium, ita, si vitientur, in
 maleficio, vicissim conspirant, vi-
 resque confociant.

Animi V. Cæterum causas ab animo
passio- pendentes ideo peculiari capite a
nes quo- corporeis non distinguimus, quia
modo idcirco improuisam mortem inter-
mortem dum accersunt, quod solidas cor-
impro- poris partes, apud illos, quos inte-
visam rimunt, præcordia scilicet, & cere-
accer- brum,
sant.

brum, admodum imbecilla, pene-
que effracta, aut inueniant, aut ef-
ficient. Vnde promiscue de vtro-
que causarum genere scribere con-
stituimus.



*De causis subitanea mortis ex parte
fluidorum maioris usus, & pri-
mo ex parte aëris.*

C A P V T V I.



Idimus hactenus in vniver-
sum ex quibus fontibus im-
prouisarum, quas dicunt,
necium causæ fluere soleant; nunc
agendum, vt, saltem obiter, inter-
noscamus modos, quibus aliquæ
ex vnoquoque genere vires suas va-
lidissimas exerunt.

II. Et quidem ex parte aëris ce-
lerrimus animalium interitus potest
contingere, cum vel moles eius,
vel pondus insigni diminutione, aut
excessu laborant; vel id, quod sub-
tilissi-

*Aër
multi-
fariam
ad ne-
cem
subitam
conspi-
rat.*

tilissimum in aëre ad vitæ necessitatem natat, & intercurrit, magno aliquo vitio lethaliter afficitur.

III. Diminuitur primo aëris moles in vacuo, per Boylii anthliam facto, vbi animalia statim deficiunt, & mox emoriuntur. Minuitur vero pondus in atmosphæra, premendis pulmonibus, & sanguine respectiue leuiori reddita; vt in conclaui nimis calido, & quorundam montium cacuminibus, vbi, vt fertur, celerem homines interitum subeunt, nisi cito illinc reducantur.

IV. E contrario adaugetur pondus aëris, eiusque compactior euadit elater in quibusdam metallicis fodinis. Narrat etiam Boylius, ex peculiari flante apud septentrionales vento, homines repente interire: tanta enim eius est densandi vis, vt vel hispanicum vinum congeliet.


V. Tandem magno aliquo vitio noxius, ac lethalis fit aër, ut ex fumo carbonum in conclaui clauso, ex
con-

constitutionibus pestiferis, ex veneficis odoramentis, aut sæua quadam, ac naturali mephiti; vt etiam ex sepulchris, aut frumenti puteis diu clausis, cum primo aperiuntur; quæ omnia solent inopinato animalia suffocare, & interficere, densata scilicet, aut vitata illa, quæ per cranii meatus, & pulmonum poros permeare deberet, particularum mixtura, quæque subtilis alioquin, & nescia quietis, sanguinis fluiditatem, & nervis spirituosum vitæ igniculum erat conciliatura.

VI. Sed quoniam non vna, eademque omnibus in animalibus, aut pulmonum laxitas, aut fluidorum mixtura inuenitur; hinc non omnibus eadem nocent inquinamenta aëris, ex quo euenit, vt particulares narrentur pestes, quæ nunc solos homines, nunc hoc, vel illud pecudum genus interficiunt. Quinimo, cum vna, eademque minima solidorum textura, ac particularum sanguinem integrantium pro-

*Aër
juxta
corpo-
rum di-
spositi-
onem ap-
paret
noxius.*

portio, nec semper, nec singulis hominibus accidat. Hoc sane in causa est, cur, sæuiente peste, in eadem vrbe, ac etiam domo, alii pereant, alii seruentur. Adeo verum est, ad labem, ex aëre potissimum contrahendam, eo usque valere corporis dispositionem (quam ut plurimum intemperans, atque incontinens vitæ genus infert) ut propterea nonnullis in medio Tiburi, Sardinia sit.



De Causis subitaneæ ruita mortium ex parte sanguinis.

C A P V T VII.



*Sanguis
qua-
drupli-
citer
mortem
inten-
tat*

EX parte sanguinis improuisam mortem intentant quatuor præcipuæ eiusdem affectiones. Primo præceps ac talis diminutio molis eiusdem, quæ, cordi, & cerebro subtracta, alternum horum viscerum motum, & cir-

circuli continuationem penitus ^{repen-}
tollat. Hinc sanguis a maioribus ^{tinam.}
venæ cauæ, & pulmonicæ truncis,
vel a corde, summisque arteriis,
pulmonica scilicet, & aorta, affa-
tim erumpens, improuiso vitam
intercludit.

II. Secundo celerrima pariter,
nimisque abundans eiusdem san-
guinis, præsertim efferuescentis, ad
cor, atque ad cerebrum confluxio,
& quauis ex causa, mora pertinax,
vbi languescenti vi circumpulsiuæ
horum viscerum valide renitatur,
& vitæ cursum, quem in motu po-
suimus, continuo suspendat; vt in
iis obseruatur, qui, subito timore,
mœrore, vel gaudio perculsi, re-
pente concidunt; aut qui nimia
plethora saginati, vel qui post cor-
poris excalefactionem, siue præsen-
te aliqua euacuatione, frigido po-
tu, vel balneo vtuntur. Non e-
nim capacitas ad continendum, &
vis ad pellendum sanguinem in
corde, & appensis vasis sunt inde-
finitæ,

finitæ, atque immensæ: verum proportionē respondent certæ, ac determinatæ moli, & grauitati eiusdem sanguinis, quem nonnisi citra violentam distractionem, ac resistantiam capere, atque vrgere possunt.


III. Tertio, vitam sæpe confestim adimit illud sanguinis vitium, quod ab hypochondriis, ab vtero, vel aliunde, ac præsertim a ventriculo communicatum, propter summam acredinem, vel aliam externis sensibus non satis expositam qualitatem, præcordia, & cerebrum conuellit, & valde efficax est ad fluida, vel coagulanda, vel dissoluenda; quibus in casibus magna interdum feri copia, ex coacto intra pulmonum, ac cerebri vasa sanguine, violenter extruditur, & in thoracis, vel cerebri cavitatibus colligitur; hinc frequens erroris ansa apud minus in arte peritos, qui, lympham in sinibus cerebri inuenientes, illam apoplexiæ causam,

*Lympha
in cau-
tatibus
collecta
iniuste
pro
morbi
causa
plerun-
que ab*

sam, cum plerunque fuerit duntaxat effectus, accusare solent.


*imperi-
tis ac-
cusatur.*

IV. Postremo pestiferum quid, ac plane veneficum in sanguine vitium, haustum ex aëre, ex ingestis per os, aut aliunde, recondi posse experimur, quod dato tempore, vires suas in spiritus, cordisque, ac cerebri fibras exerat, ignoto sane, tacitoque molimine, ac velut, syderatione.



*De causis subitanearum mortium ex
parte fluidi neruorum, seu spiritu-
um animalium.*

C A P U T V I I I .

 Vod denique ad tertium maximi vsus fluidum, nempe ad liquidum neruorum, seu spiritus animales, attinet, iis profecto, vtpote a sanguine deriuatis, eadem vitia congrue aptari possunt, quæ mox ipsi sanguini attribuimus. Etenim primo loco subtracta,

*Multi-
plex
spiritu-
um de-
fectus
impro-
visa
mortis
causa.*

tracta, vel intercepta contumaci-
ter tanta sanguinis copia, quanta
per carotides, & ceruicales arteri-
as, earundemque plexus ad cere-
bri, & cerebelli cortices naturali-
ter fluxura est, vt liquidum ner-
uorum separetur, statim debent &
ipsi spiritus, qui ex solo sanguine
secernuntur, deficere. Hoc sane
contingit in magnis sanguiferorum
circa iugulum vulneribus, vel intra
cerebrum rupturis, in quibus po-
stremis, si fuerit ingens copia effu-
si sanguinis, eiusdem procul dubio
defectum mortifera cerebri, ac ce-
rebelli compressio sequatur neces-
se est. Possunt pariter iidem spiri-
tus deficere, cum eorum excursus
per nervos ad præcordia, aliasq; ma-
ximi vsus partes, penitus intercludi-
tur vi conuulsionis, compressionis,
vel obstructionis, e solo corporis
vitio, aut simul animi motibus pen-
dentium. Possunt quoq; deesse spi-
ritus ob inedia, ob motuum vio-
lentiam, ob nimias euacuationes, ob
intem-

intemperantem veneris vsum, præfertim in senibus, quos satis iam ætas spiritibus destituerat. Quod genus exempla inuenientur abunde apud Authores, quibus hic repetendis frustra non immoramur.

II. Secundo, nimia etiam eorundem copia, quæ semper sanguinis vbertatem comitatur, nimia pressura, & inflatione glandularum corticalium cerebri, neruorum vias ita potest aliquando comprimere, vt fluxuro animali liquido omne spatium adimatur, fiatque propterea, vt, vel in cerebro spiritus non separentur, vel a cerebro (infirmatis villis extrudentibus, & aucta resistantia extrudendi liquidi) in præcordia non dimittantur; quod interdum contingit in ebriosis, aliisque, qui cibis, & potibus plurimo sale, ac sulphure narcotico refertis, sese ingurgitant.

III. Tertio, summa spirituum acrimonia ex eodem sanguinis vitio, atque ex lentis animi pathematibus. *Ipsorum acrimorum æq; noxia.*

*Epilep-
sia
transi-
tus in
apople-
xiam ex
Hipp.*

*(a) lib.
de
gland.
n. 9.*

*Qua
ratione
huius-
modi
transi-
tus fiat.*

matibus, studiisque intensioribus inducta, conuellendis pertinaciter præcordiis, & cerebro, homines, alioquin valetudinarios, ad idem repentinæ mortis genus potest adducere; vt olim in amplissimo Card. vidimus, & passim in exitialibus epilepsiis, quæ dicto citius in fortes desinunt apoplexias, de quibus agit etiam (a) Hippocrates.


IV. Sed quoniam ætiologiam epilepsiarum, quæ in apoplexias, mortemque desinunt improuisam, hic scitu summopere necessariam putamus, idcirco attente considerandum, conuulsionem membranarum, ac sinuum, nec non fibrillarum cerebri, in qua pene tota ratio idiopathicæ epilepsiæ posita est, multifariam, sed duplici potissimum modo contingere; altero scilicet, cum acre, ac fere arsenicale, vel aliud quoduis liquidum, conuellendis neruis idoneum, non omnia simul cerebri segmenta, sed eadem successiuo quodam, atque in-

inæquali ordine, ac tempore irritat, & crispat; vnde nonnisi inæquales, inordinati, atq; inæqualiter contingentes conuulsiui artuum, ac thoracis motus, per totum fere paroxyſmum, respondent, ac obseruantur. Quod sane quotidianum, ac vulgare huius morbi exemplum se prodit. Altero vero modo, cum eodem pene tempore, æqualibusque viribus irritans causa, quaquauerſum per cerebrum diffusa, æqualiter eodemque tempore anteriores cum posterioribus partibus, dextras cum sinistris, immo forte etiam ipsum cerebellum, adeo vehementer conuellit, vt, inde animale liquidum simul, & æqualiter in omnes contranitentes musculos valide expressum, post breuissimas artuum contorsiones, vniuersum corpus tensum, rigidum, atq; immobile reddat. Hæc autem, posterior epilepsiæ differentia, ea præsertim existit, quæ si plus iusto perseueret, frequenter in apoplexiam transiens,

subitum vitæ discrimen solet afferre: quia scilicet, non solum vasa cerebri, si a lenta prius ægritudine fuerint debilitata, & in varices dilatata, ex illo forti, & vniuersali nixu conuulsionis, ac strangulationis, sanguinem prementis, atque intercipientis, & renixu eiusdem contenti sanguinis, mole, & acie sua extrorsum vrgentis, sæpe dissiliunt; sed, vel maxime, quia idem sanguis, propter inæqualem suarum partium indolem, vno in loco volatili oleoso spiritu expers, viscidulus ex mora concrescit; alio autem fluxilior & acrior, suos extra limites, per glandularum orificia, nervorumq; tubulos exprimitur: propterea, quanquam ipsa denique conuulsio deficiat, attamen, perturbata iam spirituum materie, & in alienam naturam conuersa, iisdemque cerebri, nervorumque vis, qua dilatatis, ac discissis, qua compressis, & obstructis; fortissima inducitur apoplexia, quæ
ple-

plerunque subitam mortem accersit.

V. Tandem ignotum illud virus, quod in aëre, ac sanguine superius notauimus, potest in ipsos animales spiritus deriuari, eundemque lethalem, ac repentinum effectum producere; vt in peste, & venenis, infusis, vel ingenitis frequenter offendimus.



De causis subitanea mortis ex parte solidorum maioris usus, & primo ex parte instrumentorum respirationi famulantium.

CAPVT IX.

Fluidorum vitiis iam explicatis, ad ea solidorum mala progredimur, quæ sunt mortalis huius exitus principia; illud iterum, iterumque monentes, quod vtriusque ordinis causæ tuam sibi opem, ad subitum infe-

*Solida
& li-
quida
mutuo
concur-
su mor-
tem in-
ferunt
impro-
visam.
Ex par-
te soli-
dorum
maioris
æfus,
quomo-
do sub-
ita
mors.*

rendum interitum, necessario præ-
bent; vt proinde non inuenias vi-
tium solidorum, repente aptum
occidere, quod motui saltem liqui-
dorum non officiat; & vicissim flui-
dorum vitium lethale absque soli-
dorum læsione.

II. Sed ad mortiferas causas, ex
ipsis solidis ortas, propius accessu-
ri, illud etiam accurate aduerten-
dum, solida maioris vsus duabus
conditionibus naturaliter instructa
esse oportere, vt ad vitæ conser-
uationem conspirent, nimirum, vt
sint integra, seu organica naturali
structura donentur; deinde, vt in al-
terno constrictionis, ac distensio-
nis motu perpetuo versentur. Quid-
quid propterea structuram, vel mo-
tum prædictarum partium maxime,
ocysime, & pertinaciter lædet,
mortem quoque celerrimam, quam
subitam dicunt, poterit inferre.

III. Sequentes itaque præfatam
initio solidorum distinctionem, as-
serimus primo, ex parte instru-
men-

mentorū, rēpirationi inferuientium, animalia repente posse interire, si aspera arteria, eiusque bronchia obstructa, conuulsa, vel compressa, citissime, ac penitus iter aëri per pulmones intercludant, vt in laqueo suspensis passim animadvertitur, vel in iis, quibus solidum corpus inter deglutientem laryngis foramen occludat, vel pus, rupta vomica, vel aqua in demersis, per bronchia, loco aëris diffusa, non reuomantur; vel serum, aut sanguis in repentino pectoris hydrope pulmones, quominus ab aëre impleri possint, subito impediat. Tanta enim est hominibus spiritus necessitas, vt ad rem scripsit ^(a) Hippocrates, vt siquidem ^(a) lib. omnibus aliis abstineat homo, neque de flat. n. 6. cibum sumat, neque potum, possit tamen plures dies ducere. Si cui vero spiritus in corpus intercipiatur, vel exigua diei parte pereundum sit.

IV. Deinde, si omnia simul inspirationis, atque expirationis in-

Varia
tra-
chea, &
bron-
chio-
rum
mala
repente
interficiunt.

*Spiritus
sponte
cohibi-
tus mor-
tis cau-
sa apud
Gale-
num.*

*(b)2.de
Mot.
muscul.
cap. 6.*

*Huius
effectus
causæ
expo-
nuntur.*

*Qua-
nam
thoracis
vulne-
ra, ex-
ternum
cum in-
terno
pulmo-
num æ-
re a-
quili-
brando,
lethalia*

strumenta suis ab officiis cito, ac
pertinaciter vacauerint, ob eun-
dem impeditum aëri alternum in-
tra pulmones ingressum, atque e-
gressum, illico extremi fati dies est
in procinctu; ob quam sane ratio-
nem seruus ille barbarus apud (b)
Galenum, coacto sponte spiritu,
citam sibi mortem consciuisse, fer-
tur; cuius profecto voluntarii, si
verus est, effectus, multæ etiam
morbosæ, ex necessitate operantes,
numerantur causæ, quæ scilicet
aptæ sunt diaphragmatis, sterni, co-
starumque structuram, continuita-
tem, vel motum ita firmiter læde-
re, ut alterne supra pulmones con-
cidere, vel a pulmonibus recedere
nequeant. Ita magna e. g. vulne-
ra, quæ utrunque thoracis latus,
septumque simul transuersum con-
fodiunt, si aperta detinerentur, ce-
lerrimam mortem possent accerfi-
re: aër enim, per dehiscentia vul-
nera ingrediens, & forinsecus pul-
mones premens, æquilibraretur
cum

cum aëre, qui per tracheam intra pulmones labitur, ipsosque pulmones, veluti quandam immobilem stateram, cum totius circulantis sanguinis mora, vitæque pernicie, suspenderet, ac libraret; & sic de quacunque alia consimili prædictorum læsione organorum, respirationi famulantium, paralyſi nempe, aut conuulsione (dummodo subita, magna, ac pertinax fuerit) erit sentiendum.



De causis improuisarum mortium ex parte cordis, & magnorum vasorum.

CAPVT X.

Roxime dicendum venit de cordis, magnorumque sanguiferorum vitiis, homines celerrime interimentibus; & quanquam omnia, quotquot dari possunt, ad id vnice colliment, vt

cordis motum penitus tollant, & lethiferam syncopem inducant; nihilominus tamen, cum ad vitæ necessitatem, ex parte cordis, tria

*Tria ex
parte
cordis,
& vasorum
ad vitam
necessaria.*

considerari debeant; primo congrua structura tam cordis, quam magnorum vasorum; secundo viarum libertas; tertio vis mouens, quam facultatem pulsivam dicunt; certe ex vnoquoque fonte maximi oriri possunt morbi, qui confertim perimant.

II. Primo, quod attinet ad structuram, cum ad eam constituendam integritas, & continuïtas fibrarum, villorum, & membranarum potissimum exigatur; quotiescunque aut inflicto vulnere, aut lenta exesione, in aneurysmatibus, eo tandem peruenitur, ut continuïtas parietum cordis, & magnorum sanguiferorum auferatur, illico, profiliante vberime sanguine, mors urget, ut historia V. eorum, qui hac temporum constitutione repente interierunt, publico patuit in theatro.

III.

III. Quod vero spectat ad viarum libertatem, quæcunque causa venam cauam, vel pulmonicam, & aortam, aut arterias carotides eousque constantissime, atque integre potest conuellere, comprimere, vel obstruere, vt sanguis ad auriculas, & ventriculos peruenire, aut ab auriculis, & ventriculis in maiores arteriarum ramos, atque in cerebrum fluere prohibeatur, subitum minitari potest interitum, vt de magnis sanguiferorum polypis, ac de tumoribus, vel ossibus, maiora vasa comprimantibus, vel obstruentibus, memorant Obseruatores.

IV. Denique, quia vis mouens cor non solum pendet a congrua fibrarum structura, sed etiam a fluidis nerueo, & sanguineo, idcirco labefactari potest, vt hominem celerissime interficiat, si vtrunque liquidorum contumaciter deficiat; (vnde syncope ex cordis, & arteriarum paralyfi) aut quoduis aliud

*Cordis
Easorumque
conuul-
sio, com-
pressio,
& ob-
structio,
mortis
causa.*

*Vis mo-
uens
cor a
fluidor-
um de-
fectu, &
sitio le-
thalite-
labefa-
tatur.*

*Oris
Ventriculi, &
cordis
morsus
a ver-
mibus.*

*(a) Lib.
7. c. II.
(b) De
ægrit.
cord.*

*cap. I.
(c) Lib.
2. obs.
194.
Cur le-
thalis.*

lethale vitium contrahat, quod sa-
ne accidit non in peste solum, sed
vbi os ventriculi, vel ipsum etiam
cor a vermibus mordetur, vt pro-
inde (a) Trallianus, (b) Mesue, &
(c) Schenchi-
us referant, aliquos ex
huiusmodi causis repente decessisse.
Vermes enim cuiusdam speciei, non
erodendo duntaxat, sed veneficum
forte liquidum sanguini, ac fluido
animali penitus hostile, vulneribus
inspergendo, interimere solent.
Quod sane adeo ex antedictis per-
se clarum est, vt summatim indi-
casse satis fore duxerimus. Illud
solummodo memorandum hic arbi-
tratur, cordis, magnorumque va-
sorum motum diuidi in systolem,
ac diastolem; & licet alter dunta-
xat ex iis motibus sit agens, vter-
que tamen ad vitam est necessari-
us: idcirco fieri potest, vt æger re-
pente moriatur, tum si cor alterne
constringi non possit (quod vel e-
neruata penitus structura, vel præ-
dictorum maximo vitio liquido-
rum,

*Systole,
& dia-
stole
cordis
& c. 6.
traque*

rum, solet contingere) tum si al-
 terne dilatari nequeat, quod, vel
 pertinaci eiusdem spasmo, vel ex
 causis illud validissime comprimen-
 tibus, contractione nempe, vel tu-
 more cordis, pericardii, aut adia-
 centium partium, facile oriretur.
 Sic olim vidimus, inflicto vehe-
 menter pugno sub cartilagine mu-
 cronata, vitæ nodum ex tempore
 solutum; nimirum quod eo loci
 vna conueniunt, valideque per
 nerueam, ac tendineam cohæsi-
 onem iunguntur sinistrum ventriculi
 orificium, diaphragmatis centrum,
 arteria magna, vena caua, & pericar-
 dium; excitata idcirco repente, ob
 fortem percussione vim, prædicta-
 rum simul omnium partium con-
 uulsione, subito pariter, apud imbe-
 cillem alioqui hominem, tum respi-
 ratio, cum sanguinis motus lethali-
 ter potuit subsistere. Sic (a) Rasis af-
 firmat, repentinas mortes ex cor-
 dis apostematibus evenire. Quam-
 obrem, & cordis dolor, ut in coacis
 scripsit

ad si-
 tam ne-
 cessa-
 ria.

Ex in-
 flicto
 sub xi-
 phoide
 pugno,
 ob mi-
 rabilem
 parti-
 um co-
 hæsi-
 onem
 subita
 mors.

(a) lib.
 7 cont.
 cap. I.

(a) lib. scripsit (a) Hippocrates, *seniori sapi-*
 3. sect. *us consuescens, repentinam mortem si-*
 2. n. 17. *gnificat.* Præcordiorum enim con-
 uulsio, si pertinax fuerit, atque
 per id temporis sanguis, qui inter-
 currere deberet, necessariam fluxi-
 litatem, & crasim amitteret, (vt de
 cerebri conuulsionibus diximus) e-
 tiam si postea spasmus ille cessaret,
 non ideo tamen cruor sublatae resi-
 stentia obsecundaret, cursumque
 suum repeteret; idcirco subitam
 necem facillime induceret. Inte-
 rim vero, indicatas alibi causas o-
 mnino veneficas, ex ventriculo,
 vel alio quouis viscere deriuatas,
 consulto tacemus.

V. Sed, cum studium detegen-
 dae veritatis nihil nos vel præteri-
 re, vel dissimulare patiatur, aduer-
 tendum, istiusmodi veneficos suc-
 cos, motum cordis subito ener-
 uantes, intra nostra corpora cu-
 mulari, non vitio duntaxat fer-
 mentorum, animi pathematum,
 aliarumque etiam causarum, a ci-
 bis,

Vide
 latius
 tracta-
 tam de
 cordis
 dolore
 materi-
 em cap.
 XIX.
 n. 2.


bis, potibus, atque aëre deductarum; sed interdum (vt reticeam quæ palam venena dicuntur) culpa *arcanorum*, vt iactant, remediorum, per quæ ignauum vulgus magnos morbos profligatum iri confidit. Quanquam enim in vnaquaque Ciuitate, iustissimis constituta legibus, pseudo-chymici, & agyrtæ, ne medicinam faciant, semper vetentur, & tamen semper retineantur; sane accidit non raro, vt aliquis, siue lue venerea, siue hypochondriorum ægritudine vexatus, postquam rectam medendi viam, ob mali contumaciam, vel suos ob errores, prorsus inutilem expertus est, iis tandem agyrtis, celerem salutem perfricta fronte pollicentibus, facile credat. At, cum miser homo, antimoniale, mercuriale, aliudue huius farinæ medicamentum acceperit, proprio (vti *Mors ex Agyrta- rum ar-* nam pœnitentia delendo) discit *canis.* experimento, se non ad salutem, sed ad necem pseudo-medicis vsum fuisse.

fuisse. Etenim, huiusmodi remedia, si male parata fuerint, veneni naturam induunt; si vero extra dosim, aut sine methodo valetudinariis corporibus propinentur, varia subinde cum prauis hypochondriorum succis inita miscela, & foedere, in toxicum conuertuntur, & hominem repente plerunque perimunt. Quod sane vbique locorum, sed in Romana maxime Ciuitate, vsu venire dolendum, in qua multos proinde vidimus, sumptis, per aliquot dies, huiusmodi *arcanis*, tandem stomachi, ac præcordiorum doloribus correptos, citissime sublatos fuisse. Vnde (a) Brunonianis vocibus exclamare compellimur. O deplorandam Magistratum lenitatem, qua impune de corio humano ludere concessum, qua datur ita temere sæuire in humana viscera! O inexcusabilem dissimulationem!

(a) In
lex.
Med.
verb.
agyr.

De causis improuisarum mortium ex parte cerebri, & neruorum.

CAPVT XI.

 Vanquam ex antedictis de vicio sanguinis, & liquidi neruorum abunde colligi possit, quales causæ ex parte cerebri, & neruorum, ad subitum producendum interitum, concurrant: ne tamen hæc nostra elucubratio alicubi manca videatur, præcipuo capite perstringimus eas causas, quæ cerebri, tanquam solidæ partis, culpa, homines citissime de medio tollere possunt.

II. Cum vero, vt superius de *Tria in* corde monuimus, tria quoque in *Cerebro,* cerebro, suisque membranis, ac *menin-* neruis, ad vitam summopere ne- *gibus,* cessaria, considerari debeant; scili- *& ner-* cet primo congrua structura; se- *uis ad* cundo viarum libertas; tertio mo- *vitam* tus alternus membranarum, & cor- *necessa-* ticis eiusdem: sane ex maxima, *ria; &* *qualia.*
con-

constantique prædictorum læsione, citissima mors, sub specie fortis apoplexiæ, potest accidere; mutuo scilicet inter se conspirantibus prædictis vitiis; ita ut maxima structuræ læsio alternum motum, vasorumque libertatem tollat; quemadmodum cessatio motus supponit, vel infert impedimentum viarum; denique maximum viarum impedimentum statim naturalem cerebro motum aufert, & aliquale structuræ vitium inducit.

III. Primo itaque, si capitis, ac cerebri structuram spectemus, quotiescunque eadem ob magnum, profundumque vulnus, vel contritionem ita vitietur, ut inde tollatur membranarum motus, viarum, & fluidorum continuïtas, ad spirituum præsertim animalium, usque in præcordia, descensum, illico animal corruit, ac moritur.

IV. Neque solum ex magna craniï, cerebrique dedolatione, aut contritione, quæ contentis partibus

*Spiri-
tuum
descen-
sus ad
præcor-
dia in-
hibitus
rep.
moris
causa.*

mo-

motum, & vasis continuitatem auferat, homines breui moriuntur; sed interdum ex leuibus quantumvis creditis capitis contusionibus, & concussionibus, ob occultam vasis rupturam, cum ægri maxime conualuisse videntur, tunc subito pereunt, rigore correpti. Ichor enim, aut sanies intra membranarum, aut cerebri cuniculos colligi solet, acerrimamque, & plane veneficam, ex mora indolem nancisci, ob quam vniuersa cerebri, ac neruorum œconomia subuertitur; nimirum, crispatis, aut syderatis neruis, & ruptis quandoque sanguiferis, vitale illud commercium cerebri cum corde, & cordis cum cerebro e vestigio intercipitur. Ita

Magna capitis latio, & parua interdum aequalethifera.

(a) Magnenus narrat, nonnullos sternutantes, agitato violenter capite, disruptisque eo impetu meningum vasis, subito interiisse. Quod sane a (b) Famiano Strada exemplo pistoris suburrani confirmatur, qui, cum ter, ac vices sternuisset,

(a) Exerc. 8. de Tabac. Quo modo ex sternutatione, mors subita. (b) lib. 3

præ-
lect. 4. nuisset, vigesimo quarto sternuta-
cul. cur mento animam efflauit. Qua de
sternu- causa, nempe ob vitæ periculum,
entes euenisse putat (a) Sigonius, (quan-
salu- quam a Famiano redargutus) vt,
tentur. consueto iam diu more, salutem
Ex Fa- sternuentibus a Deo precemur; sci-
miano licet, quod multi tempore D. Gre-
Strada gorii Magni, cum sternutarent, re-
exem- pente spiritum emittebant.
plum.

(a) lib. V. Ab internis quoque causis
I. de lentæ in cerebro congestiones fieri
regn. solent, quæ postquam diu ægros,
Ital. nunc hemicrania, & sopore, nunc
Mos mœrore & epilepsia, iuxta varium
precan- pressionis momentum, variamue
di salu- interceptorum succorum indolem,
tem ster diuexarunt; denique, fortissima in-
nuenti- ducta apoplexia, repente iugulant.
bus Sn.
de.

Lenta in cere- VI. Nouimus Equitem Com-
bro con- mendatarium ex familia de Puteo,
gestio- qui floridioribus annis hemicrania,
nes tan- atque hæmorrhoidibus obnoxius,
dem re- post quinquagesimum ætatis suæ an-
pente num incertis animi motibus, mœ-
iugu- rore præsertim, exagitari cœpit, &
lant. pau-
Histo- riam i-
riami- rabili
confir- matur.

paulatim fere ad triennium suppressis identidem mariscis, iugi grauius circa tempus sinistrum dolore infixio, varias vices ex medentium auxiliis expertus fuit. Verum, cum ex Lauretana Domo rediret, (præcedente grauiore sincipitis dolore, ad sinistrum oculum protenso, vna cum animi luctu) Fulginei repente in leuem apoplexiam incidit, facie subpallida, tumentibus palpebris, respiratione libera, nisi illam sicca tusis frequenter interturbasset, quibus febricula per aliquot dies accessit; a quo sane paroxýsmo, propter opportunam opem eidem præstitam a Clarissimo Physico Nuccarino, antiquæ probitatis Viro, eoque nomine mihi coniunctissimo, vindicatus fuit. Romam deinde repetens occurrit nobis cum sicca tusi, meticulosior, taciturnus, obliuiosus; quini-
mo decursu autumnii, & hyemis 1694. recurrentibus semel, vel bis in vnoquoque mense apoplecticis in-

sultibus , infelicis plane vitam duxit. Tandem die 26. Ianuarii 1695. cum se melius habere videretur, fortissima correptus syderatione, subito interiit. In cuius cadauere præcipuum fuit obseruare in posteriori hepatis parte , qua diaphragmati adnectitur, tumorem folliculatum , æruginosa veluti argilla plenum. Vnde septum transuersum eo loci subrufam coloris labem contraxerat ; atque inde siccam tusim, qua æger tenebatur, profectam existimauius. In Cerebro autem omnia piæ matris sanguifera, ac lymphatica vasa pene in varices abierant. In ventriculis copiosa serositas continebatur. Sed malorum summa latebat sub dextera parte osis frontis; vbi dura, & pia mater in multam crassitiem euaserant, & finitimus cerebri cortex concreuerat in crudum abscessum substantiæ fere polypeæ , & magnitudinis æqualis illi pomo , quod appium redolens appellatur. Interim pro-

*Tusfis
sicca ex
dia-
phrag-
matis
labre ab
hepate
contra-
cta.
Lym-
phatica
Pia ma-
tris va-
ricosa.*

*Ingens
abscessus*

fundi-

fundior cerebri cortex, eiusque medullæ pars, quæ tumori substernebatur, adeo diffinuebat, vt puris crasim æmularetur.

*polype-
us me-
ningum
& cor-
ticis ce-
rebri.*

VII. Hoc sane extispicium non tantum admirationem excitat, propter ipsam tumoris in cerebro collecti conditionem, quantum propter situm; vt, cum æger de grauitiæ sincipitis, & oculi sinistri dolore perpetuo quereretur, morbi causa in dextero meningum, cerebrique latere ineunte fuerit. De cuius phænomeni ratione plura differemus in scholio dissectionis cadaueris Illustrissimi Præfulis Spadæ.

*Doloris
sincipi-
tis &
oculi si-
nistri in
opposita
parte
delite-
scens
causa.*

VIII. Nouimus item Eminentiſſimum Sacchettum nostræ, ac doctissimi iuxta, atq; humanissimi Joh. Trulli curæ traditum simili congestione laborasse, cuius breuem tum historię, cum extispicii descriptionem, a nobis exhibitam diligentis. (a) Pacchiono (Iuueni virtutis, & ingenii meritis mihi iucundissimo) huc congrue transferemus. Vir

(a)
*Quam
inferuit
suz dif-
fertati-*

oni
epist. de
gland.
&
lymph.
me-
ning.

*Hydatis
insignis
supra
cere-
brum.*

igitur Eminentissimus sexagenario maior, a suppressa podagra melancholicus, immemor, atque epilepticus euaserat; sedula tamen curandi methodo, præsertim vini abstinentia hinc sex supra annos vixerat; Tandem repente sublato, in eius dextera corticali cerebri parte verus occiput, insignis hydatis, oui columbini molem adæquans, inuenta est, laxa, & lacera, quæ construi videbatur ex ipsamet pia meninge, suis potissimum dilatatis, scissisque lymphaticis, interceptoque liquido. Quod fane, vel nudis occurrebat oculis ex fluido intus contento. Erat enim lymphæ partim subtilis, & flaua, partim in crassam veluti gelatinam conuersa. Vbi, quod mirabilius apparuit, id certe fuit, vt istius folliculi basis, cortex nempe cerebri, ad talem resistentem consistentiam deueniret, quæ plane scirrhusa videretur.

IX. Ex his vero duobus exemplis satis patet, obstructis paulatim

fan-

sanguiferis, ac lymphaticis, posse in cerebro congeri tumores, intercipientes liquida, maximopere viscosa, simulque acria, vel quouis alio modo capiti, & nervis hostilia, quæ, ruptis tandem alicubi repagulis, per proxima vasa diffluent, & quaquaversum subito diffusa, tum animalium spirituum crassim penitus inuertant, tum eorundem vias intercludant, & meningum, minimumque cerebri motum, vna cum vita penitus tollant.

X. Secundo, quanquam de viarum libertate satis dicat, qui de structuræ vitio agit; adhuc tamen monendum censemus, aliquando, etiamsi vasorum in cerebro structura nusquam appareat vitiata, fieri posse, ut celerrime mors inuadat, ratione solius repentinæ totalis pressio-
Obesis
repen-
tinato-
nalis
vaso-
rum in-
tra cra-
nium
 sionis, & obstructionis vasorum inferentium, ac referentium, nec non minimarum glandularum cerebri, ac cerebelli, quod præsertim obesis interdum accidere videmus, in quibus

obstru- bus ob celerrimam sanguinis stagna-
ctio, fa- tionem non modo subita vasorum
cilis. obstructio, sed subita quoque para-
 lysis membranarum, sinuum, toti-
 usque cerebri corticis proficiscitur,
 cuius exemplum dabimus hist. i. il-
 lorum, qui hoc anno repente inte-
 rierunt, de quibus etiam habitus
 est sermo superius cap. VII.

XI. Facit pariter ad viarum in-
Nervo- terceptionem quidquid nervos, qui
rum ad ad præcordia, & ad meninges fe-
præcor- runt, ita comprimere potest, ut
dia, & animalium spirituum ad eas par-
menin- tes cursum penitus intercludat. Ita
ges ten- mulierem, quam aphonia, & bra-
denti. chii paralytis diu detinuerat, repen-
um te mortuam aperuimus, in qua ni-
com- hil conspicuum inuentum fuit, præ-
presso ter scirrhosam glandulam, quæ sub
morti- cerebello, ad internum principium
fera. spinalis medullæ, prædictos nervos
 validissime compresserat. Quid non
 etiam iidem nerui extra cranium
 obstructi, aut compressi, post ali-
 quas præcordiorum passiones illa-
 tas,

tas, repentinam mortem inferre valent, quamvis nulla sensibilis causa in ipsis cadaueribus postmodum inueniatur? Constat enim per diligentissimum (a) Valsalvam, cordis nervos ad iugulum canis arcte constrictos, & illico solutos, adeo in structura insensibili labefactari, ut canis intra aliquot dies, eodem modo, ac si nervi illi amputati essent, inde moriatur, licet iidem rursus inspecti, in se nullum sensibilis læsionis vestigium ostendant. Quod sane multo facilius potest contingere, si sanguis, per cor devoluendus, ob minorem, quam par est, fluxilitatem, ac volatilitatem, motui retineatur, quod hisce in casibus plerumque contingit.

XII. Postremo, membranarum, & cerebri motus, ut de corde diximus, tolli potest, vel ob recens inductum structuræ vitium, quod ex magnis vulneribus, magnaue ossis depressione accidit; vel ob repentinam meningum, totiusque ner-

(a) De
auris,
part.
vfu
cap. 5.
Novile
Valsal.
6a ex-
peri-
men-
tum.

Meningum, & cerebri motus multipliciter ablatum

*Animi
passio-
nes cur
letha-
les.*

uosi generis paralyfim, quæ ex nar-
coticis, aliisque cerebrum afficien-
tibus venenis oritur; vel si prehen-
dat fortis, & pertinax conuulsio,
quæ, omnia cerebri vasa strangu-
lando, cursum sanguinis, lymphæ,
ac spirituum illico, & pertinaciter
intercipiat; vt contingit in morti-
feris epilepsiis, ac potissimum in
magnis, ac subitis animi pathema-
tibus, de quibus egimus cap. VII.
quæque in ipso statim cerebro vi-
res suas lethaliter interdum exer-
cent. Etenim, cum huiusmodi
animorum affectiones, per exter-
nos sensus a cerebro suscipiantur, si
viscus hoc natura, morbo, vel ætate
languidulum, simulque fluidum,
acie, ac mole intra cerebri vasa re-
dundans, inueniatur, facile, propter
subitam vasorum omnium strangu-
lationem, epilepticam apoplexiam
inducunt, hominemque ex tempo-
re tollunt; cuius profecto rei eui-
dens ante plures annos habuimus
experimentum in Optimate quo-
dam

dam fene, ac valetudinario, qui, *Exem-*
 dum tranquille alioquin coenaret, *plo res*
 improviso accipiens nuncium de *illustra-*
 aduentu sibi neque grato, neque
 honorifico consanguinei sui, repen-
 tina syderatione sublatuſ est. In hu-
 ius vero dissecti cadaueris cerebro
 vasa vndique tumida ex intercepto,
 propter subitum animi pathema,
 sanguinis, lymphæque cursu, inde-
 que cavitates tum fulcorum, cum
 ventriculorum vsque ad spinalem
 medullam, exundante sero, repletæ
 occurrerunt.

XIII. Ad eundem postremo
 censum spasmodicarum passionum *Artu-*
 cerebri, & neruorum splanchnico- *um*
 rum referri possunt dolores imma- *sphace-*
 nes, qui ex artuum, sphacelo cor- *lato-*
 reptorum, amputatione oriuntur, *rum*
 si ea, qua nondum mortui sunt, *ampu-*
 parte (præsertim si debiles fuerint) *tatio-*
 refecentur; de quibus apud ^(a)Hipp. *nes in-*
 scriptum legimus, *Magnum pericu-* *terdum*
lum est, ne præ dolore in animi deli- *subita*
quium incidant. Talia vero animi *mortis*
deli- *causa*
ex Hipp.
(a) lib.
de ar-
tic. n. 8.


deliquia multos iam e vestigio peremerunt.

*Tirillus inter
priscos
egit de
morti-
bus re-
penti-
nis.*

XIV. Hæc de subitanearum mortium causis attulisse satis duximus, ne liber in magnum volumen euaderet. Qui ad curiositatem explendam longiorem exemplorum seriem petierit, penum habebit paratam inter veteres quidem in vna Dominici Tirilli Tractatione de causis repentinæ mortis, qui sane Auctor fuit cum rebus Philosophicis, tum Medicis (vt temporibus illis) satis eruditus. Inter nostros vero in miscellaneis naturæ Curiosorum Germaniæ, in Boneti sepulcreto, & medicina septentrionali, aliisque compilatorum libris, qui priscorum, recentiorumque observationes breui, & concinna methodo ad nos traduxerunt,

Subitanei morbi hactenus expositi ad tria capita rediguntur, ad Suffocationem, ad Syncopem, atque ad Apoplexiam, quæ & simul plerumque concurrunt.

CAPUT XII.

T consulamus iis, quos facile tædet multitudinis idearum, quæ veniunt concipiendæ, ad intelligendas possibiles subitanearum mortium causas, earundemque operandi modos, opportunum censemus hoc loco tribus tantum malorum speciebus vniuersam hanc, peneque immensam rem solerter complecti, quæ quidem species sub genere morbi attoniti, & sensuum, respirationis, pulsusque officia plus, minusve tollentis comprehenduntur. Cum enim repentinæ mortes ex certis tantummodo repentinis morbis oriantur, horum sane interimere potentes sunt.

Sub genere morbi attoniti totæ res ista comprehenduntur.

II. Primo quidem, morbi omnes, qui ex aëris vitiis, aut læsionibus instrumentorum, respirationi inferuentium, producti, confestim interficiunt; id sane faciunt, quia vitam alterno aëris, & illius, quod in aëre natat, corporis pabulo defraudant, ac proinde ad præcipitem suffocationem, aut præfocationem tuto referri debent.

Aër
sanguinem
fœcundat.
III. Cum vero aër reciproca inspirationis, atque expirationis lege, sanguinem obscuro, ac pene ignoto mouente fœcundet, eundemque clara nobis pulsione per venam pulmonicam versus læuum cordis ventriculum vrgeat; idcirco, prohibita respiratione, statim vniuersa sistitur circulatio, indeque cor, & cerebrum, propriis motibus destituta, necessario in syncopem, atque apoplexiam incurrunt.

Prohibita respiratione,
quomodo cor,
& cerebrum
ledantur.
IV. Secundo, morbi omnes, ex sanguinis, aut cordis, magnorumque sanguiferorum vitio exorti, si ægros ex tempore interimant, id

moliuntur, quia alternum cordi ^(in iis scilicet qui subito moriuntur) motum celeriter auferunt, ac propterea syncopem inducunt, ex qua facile est concipere, quomodo cum cerebri, tum pulmonum motus continuo sistatur, seu quomodo apoplexia, & suffocatio ex necessitate succedant. ^{pulmonum motus sistantur.}

V. Postremo, maxima illa spirituum animalium, & cerebri mala, quæ subitam necem accersire posse probauimus, non alio tendunt, quam ut motum, ac sensum internis visceribus, externisque organis, ^{Cerebro laeso, idem} & artubus non illico solum, sed omnino tollant, seu fortissimas apoplexias inducant, At vero, post his huiusmodi apoplexiis, e vestigio motus cordis, atque pulmonum extinguitur, ac proinde syncope, & suffocatio necessario suboriuntur. ^{cordis & pulmonibus accidit.}

VI. Sed non ipsa solum infelix prædictorum trium successio malorum; quin lethifera etiam eorundem complicatio ut plurimum, tantumquam,

quam subitarum mortium causa, vno, eodemque corpore concurrunt, tunc præcipue, cum ab interno, fluidoque principio iidem morbi dependent. Non enim humoralis causa, quæ, cum mouetur, e. g. potens est in cerebro inducere conuulsionem, aut paralysem eorum nervorum, qui ad viscera maioris usus feruntur, hominem subito interimeret, nisi per eadem viscera cum sanguine diffusa, in corde syncope, in pulmonibus præfocationem, in cerebro apoplexiam eodem fere momento temporis plerumque machinaretur. Hoc sane præcipue apparebit ex iis, quæ in obseruationibus trademus.

Magna liquidorum bitia solidis existalia, & contra. Magna liquidorum vitia fluidorum, statim cum solidis partibus communicantur, & vicissim solida, magnopere labefactata, fluidas partes diu incolumes superesse non sinunt. Vnde scite, prudenterque aiebat (a) Hippocrates, *Consensus unus, conspiratio una, consentientia omnia.* Quod certe non pro


(a) de
alim.
n. 4.

pro seruanda solum, sed pro destruenda animalium œconomia intelligendum esse putamus.



Recensita Cause subitanearum mortium inuincibiles, aut vincibiles existunt.

CAPVT XIII.

 Vemadmodum sæpe factum est, vt morbi, qui ad suffocationem, ad syncopem, vel ad apoplexiam referuntur, hominem inopinato occiderint; ita non dubitamus, quin aliquis suffocatus, aut præfocatus, syncope grauissima, vel fortissima apoplexia correptus; etiamsi pro mortuo habeatur, ac prædicetur; ad vitæ tamen officia, naturali interdum via, redire possit. Quare inter morbos, inopinatam subitamque mortem inducere potentes, alii penitus inuincibiles, alii vero, vel

Præfocati etc. ad vitam naturaliter quandoque restituntur.

Subita mortis causa

F ipso

*non
omnes
inuincibiles.*

ipso negligentia, ac temporis beneficio, vel medicamentorum ope, vincibiles sint oportet.

*Inuincibiles
qua.*

II. Inuincibiles, hoc est, omnino insuperabiles, ac vere subitoque interimentes, sunt omnes morbi, qui, ex insigni aliquo intra præcordia, cerebrum, vel abdomen sanguifero vase, sponte, aut violenter disrupto, originem habuerunt, quique ex discissa quomodolibet in iugulo, vel in artubus arteria, per quam vniuersus sanguis iam effluerit, dependent.

III. Inuincibiles quoque sunt, qui ex ablata continuatione cerebri cum nervis, præsertim cum scissio neruorum iungitur vulnere, ac discissioni arteriarum, & viscerum. Vnde inter genera mortium expeditissimum æque, ac certissimum illud est, a quo nemo vnquam euasit, capitis nimirum, vel trunci dissectio; nisi per lusum excipere velimus illum, quem lepidissimus inter etruscos Poetas fabulatur,

medium ense acutissimo diffisum, morte nondum cognita, quippe partibus adhuc hærentibus, arma tractare non destitisse.

(a) *Così colui del colpo non accorto*

Andaua combattendo, & era morto.

(a)

Bern.in suo

Poe.

mat.

ital.Or.

land.

innam.

lib. 2.

cant.

24.ot-

tau. 60.

Fortis

senum

apople-

xia in-

uinci-

bilis.

Synco-

pe pari-

ter, qua

ab ero-

sione

etc. in-

duci-

tur.

IV. Inter subitaneos morbos, qui itidem sunt inuincibiles, numeratur quoque fortis apoplexia, quæ decrepitis accidit ob concursum duarum simul causarum, hebetudinem scilicet solidorum ad circumpellendum, ac defectum partium oleoso-volatilium, quæ ipsa solida, fluidaque mobilia reddunt.

V. Simile de illa syncope iudicium ferendum erit, quæ ab indurctis paulatim erosione, polypo, tuberculo, lapide, & consimilibus, in corde, eiusque vasis, motum sanguinis inhibentibus, proficiscitur; de quibus aliqua etiam dicemus cap. XIX.

VI. Denique paucis concluden-

*In gene-
re, qui-
nam
morbi
insupe-
rabiles.*

do, causæ insuperabiles repentinæ mortis intra vires naturæ, vel artis, sunt omnes ii morbi, qui valent inducere integrum defectum sanguinis, vel tollere continuitatem cerebri cum nervis, aut cordis, & insignium sanguiferorum cum cerebro, aliisque magni usus visceribus, aut aliæ huius generis maximæ affectiones, quas sigillatim piget enarrare.


*Vinci-
biles a
meden-
tium
Auda-
cia, &
natura
bi, qui-
nam.*

VII. Vincibiles vero appellamus improuisarum mortium causas, quæ, etiamsi plerunque viæ sint ad interitum, aliquando tamen, vel extra humanam spem, ipsa curantium audacia, sed non plane temeritate, imo ipsius, (quod frequentius accidit) intromouentis naturæ energia, mirabiliter fugantur. Ad huiusmodi autem morbos ii præcipue referuntur, qui a simplici, celeriterque facta obstructione, pressione, aut conuulsione instrumentorum, motui aëris, sanguinis, ac liquidi animalis inseruientium, depen-

dependent. Ita correptos apople- *Apople-*
 xia ex solo infarctu vasorum, vt Ti- *xia*
 mocratem in Helide, apud (a) Hip- *per in-*
 pocratem, interdum simplex cura- *ediam*
 uit inedia, cuius beneficio, obstru- *Curata*
 cto cerebro, non solum nihil ad- *apud*
 ditur; imo vero per validiorem in- *Hipp.*
 ductam sanguinis subtiliationem, & *(a) v.*
 motum, aliquid perpetuo detrahi- *epid.*
 tur. Ita hystericas, & præfocatas, *hist. 2.*
 mortuis quantumuis adscriptas, per *Rei ra-*
 ipsam, quæ necem intulisse visa est, *tio assi-*
 paroxysmi diuturnitatem, aliquan- *gnatur.*
 do reuixisse comperimus; scilicet *hysteri-*
 vsura temporis (cum cætera sana *carum*
 sunt) subtilissimum illud miasma, *paro-*
 quod intra neruorum texturam in- *xyfmi*
 terceptum, enormiter conuelle- *cur sola*
 bat, sensim oleosis halitibus læui- *tempo-*
 gatum, subtiliatum, ac circumpul- *ris vsu-*
 sum effluit, liberumque reddit cor- *ra quæ*
 pus, quod mortali tensione rigue- *doque*
 rat. Vnde prudens Medicus raro *supe-*
 tam abiectam de istiusmodi impro- *rentur.*
 uiso mortuis habere debet spem, vt *Medici*
 sit omnino desperatissimus: nimi- *spes his*
in casti-
bis
qualis.

(a) De
Nobil.
cap. 31.
n. 434.
& 597.

rum boni Medici erit (dummodo internorum vasorum rupturæ, aut contumacissimæ obstructions, pressiones, aliæque prorsus inuincibiles viscerum, neruorumque affectiones abfuerint) subito fateri, quam maximus timor, quam minima sit spes, vt omnem absque famæ suæ detrimento mouere lapidem, ægrumque, si adhuc viuit, ab orci faucibus possit eripere. Ita enim homo fit homini Deus, vt pulchre aduertit (a) Tiraquellus, cum Medicus morti proximos, ac veluti adiudicatos, atque etiam quosdam, qui mortui putabantur, reddidit sanitati.



De signis improuisa mortis, & primo de simulatis, ac suppositis, seu supplantatis mortibus.

C A P V T XIV.



Quoniam hætenus quales improuisarum sint causæ mortium ostendimus, exempla

emplaque ex parte tum fluidorum, cum solidorum, de quibus dicere oportebat, subiecimus: iam hinc, quibus signis non tam præsens, quam imminens, ac futurus inopinatus interitus sit cognoscendus, breuiter inquiramus.

II. Principio itaque non sum ignarus, vaferrimos inueniri homines, qui, vt facilius ex commertis euadant suppliciis, macerato prius per inedia corpore, eique inducto per sulphuris halitum squallore, iniectis itidem validis ad brachia vinculis, tandemque, blando epoto narcotico, aut sponte parumper coacta respiratione, subito mortuos se fingunt; quod, vt expeditius patrent, custodem, amicum, vel seruum, quo ex pacto, & conuentu rem agant, sibi adsciscunt. Sed istos, plane irridendos, ac peiori deinceps pœna mulctandos, promptum est deprehendere, si eorundem denudata, atque excussa corpora, flagris, fer-

Fictorum mortuorum calliditas detegitur.

ro, igneque, si opus est, tractentur. Arterias enim, solutis vinculis, rursus in carpis micare; & respirationem, violenter coactam, in libertatem redire sentiemus. Quod Iudicum causa monendum duximus, ut sint posthac, aduersus huiusmodi fallacias, cautiores.

III. Deinde improbi scelerum machinatores proprios sæpe hostes, vel alios, lucri causa, quantumvis plane innoxios, veneno, strangulatione, vel exili intra præcordia vulnere perimunt; & mox ad veram necis causam occultandam, eosdem in flumen, aut puteum demergunt, vel per scalam præcipientes agunt; quo nimirum sponte, vel casu mortui palam iudicentur. Nunc, si quis particularia signa ad has, vel illas effectas, aut veras subitaneas neces detegendas, pro relationibus, præsertim in fori usum, sedulus atque curiosus exoptet, ad-

(a) lib. 4. de relat.

(a) Fortunat. Fidel. & Quæstiones med. legal. Pauli Zacchiæ. Nos enim

enim hic causas , & signa potissimum naturalium affectionum quærimus , non forenses coniecturas. medi-
corum
per
totum.



*Exponitur difficultas inueniendi certa
signa , quibus dignoscantur qui na-
tura, non arte pseudo-mortui oc-
currunt.*

CAPVT XV.

Illa utique nec præterire volumus , nec debemus, quibus non hominum docemur calliditatem , sed vitia, dixerim , an suetos naturæ motus , quæ finit aliquando , vt ii , qui nondum mortui sunt , pro talibus habeantur.

II. Profecto non ex aliorum duntaxat historiis nobis innotuit, multos , qui decessisse credebantur, vel prope sepulcra euigilasse; sed nostro etiam experimento id ipsum comprobatum recordamur in Viro

nobili, adhuc viuento, qui viginti ante annos, cum ei iusta persoluerentur in Templo, ad motuum, sensuumque munia omnium cum terrore magis, quam admiratione rediuit. Merito idcirco exclamat

(a) De-
clamat.

8.

(a) Fabius -- *Vnde putatis inuentos tardos funerum apparatus? Vnde quod exequias planctibus, ploratu, magnoque semper inquietamus vlulatu? quam quod vidimus frequenter post conclamata suprema redeuntes.* Prudenter igitur lege veritum est quoscunque mortuos, & eos præfertim, qui repente decesserunt, statim sepelire.

(b) Ex
Paræo

lib. 23.

cap. 46.

Turpis

Vesalii

calamitas.

III. Horret meminisse (b) Vesalium, neglectæ olim Anatomes parentem, ad mulierem hystericam, quæ mortua credebatur, disseccandam accersitum, eo negligentia sua fuisse perductum, vt vix alteram nouaculæ impressionem adegerit, cum illa motu, & clamore se viuat ostendit, quæ sane res Virum odiosum, ac detestabilem reddidit;

dit; idcirco nil prius sibi esse duxit, quam se fuga subtrahere. Sed ne sic quidem intestinum terrorem, ac carnificem, quo iudice, nemo nocens absolvitur, fugere potuit; mœstitia enim confectus non multo post, magno rei, & publicæ & medicæ detrimento, interiit.

IV. Difficultas autem noscendi *Cur pseudo-*
illos, qui, etiamsi mortui nondum *mortui*
sint, mortui tamen apparent, ex *difficul-*
inde oritur, quod motus alternus *ter a*
aëris, sanguinis, & succi neruo- *mortuis*
rum per organa maioris usus (in quo *distin-*
fane motu omnem vitæ rationem *guan-*
consistere dictum est) nostros ali- *tur.*
quando sensus prope fugit, ut fere
soli naturæ innotescat. Vicissitu-
do namque motionis pectoris, do-
cente potissimum ^(a) Galeno, tam ^{(a) 8.}
minima esse potest, ut, dum costæ, ^{De ad-}
ad sternum pertingentes, non mo- ^{ministr}
ventur, sed solum diaphragmatis ^{anat. &}
centrum tantisper trepidat, inermes ^{4. de}
oculos plerunque fallat. Sanguis ^{loc.}
itidem, (integris cæteroquin exi- ^{affect.}
stenti. ^{Illorum}
^{thorac-}
^{eis, &}

dia- stentibus vasis, proprioque oleoso-
phrag- volatili sale fluens) ob solam con-
mati- tractionem summarum venarum,
motus. & auricularum, nudamque cordis,
qualis. quasi dixerim, iectigationem, tacite
Cordis interdum per ventriculos vrgeri, &
motus, per arterias, vt passim per venas,
qui- adeo leniter deuolui potest, vt vi-
nam. talis hic motus pulsum in solis car-
Pulsum pis exploranti penitus abscondatur.
cur ta- Idem plane de neruorum liquido
etui im- sentiendum, quod, cum fluidissi-
per ce- mum suapte natura sit, exiguis ad-
ptibi- eo vndis per neruos præcordiorum
lem. nonnunquam agitari potest, vt re-
Eorum liquum illud minimum anima-
liquidi lis vitæ igniculum, fere nobis
neruei ignotum, conseruet. Vt enim
motus. non omnia incorporea menti-
Menti, bus, ita nec semper sensibus
& sensi- omnia corporea manifesto patent;
bus non quibus sane factum est, vt (a) Paul.
omnia
inno-
tescunt.


(a) Quæst. Zacch. nullum, quod aliquando
 Med. non fefellerit, præsentis mortis
 legal. inuenerit indicium, præter cadaue-
 præfer-
 tim

ris liuorem, æstuationem, ac fœtorem.

conf.
79.
n. 21.

V. Sed quanquam qui de pseudo-mortuis iudicare debet, obscuram prouinciam suscipere cogatur, & quotidianum, ac frequentissimum sit, creditum vulgo mortuum, re ipsa decessisse: nihilominus tamen nonnulla indicia speculari operæ pretium erit, quibus eos discernamus, qui syncope, aut fortissima apoplexia detenti, occubuisse videntur.

Inter
signa
mortis
certissima
cadaveris
fœtor,
ex Zacharia.



De signis, quibus pseudo-mortui a vere mortuis distingui possunt.

CAPVT XVI.

Hoc ante omnia maxime aduertendum censemus, non semper Artis defectui; sed artificum, atque assidentium incuriæ plerunque adscribi debuisse, quod ægri, nondum vere mortui,

Autho-
ris mo-
nitum.

tui, derelicti fuerint, ac vespillonibus traditi, idque potissimum pestis tempore. Rogo itaque non tantum Medicos, sed etiam pios illos Religiosos, qui Romæ, atque alibi, ex instituto animam agentibus adfistunt, ut sequentibus indiciis diligenter utantur.

Mortuus a pseudo-mortuo distinguitur primo ex progressis causis.

II. Porro, ut Medicus facilius iudicet, an reuera quis vita functus fuerit, omnium primo necis causas exploret, quæ si extiterint inuincibiles, de quibus egimus cap. XIII. libere decernat, ægrum iam e viuis exemptum fuisse, cum vocem, respirationem ac pulsum, breui etiam si tempore, amiserit. Quod si contra causæ occurrant per se vincibiles, tunc acriori sensuum, rationisque criterio sibi opus erit.

Secundo a sepulto & respirationis, & cordis motu.

III. Et quoniam absque voce, usuque internorum, externorumque sensuum, ac motuum, a voluntate pendentium, vitam aliquandiu protrahere possumus; sine sepulta tamen, atque exili saltem respi-

respiratione, cordisque trepidatione non possumus; hinc iure meritoque scriptores, daturi notas, quibus viuentem a mortuo distinguamus, in superioribus hisce duobus maxime versantur. Quidquid in contrarium scribat Paul. ^(a) Zacch. qui ^(a) Lo-
exemplum adducit cuiusdam, quem ^{co cit.}
grassante peste, dum vespillones, vt ^{n. 5.}
mortuum, ad destinatum locum
asportabant, vitæ signa dedisse vi-
derunt. Etenim quis ignorat, pe-
stis tempore omnem rem, nonnisi
tumultuarie, peragi; ac proinde le-
ue duntaxat studium, ad secernen-
dum veros a pseudo-mortuis, ad-
hiberi.

*Respi-
ratio
sepulta
quomo-
do exci-
tanda.*

IV. Respirationem itaque sepul-
tam, atque inconspicuam tentabi-
mus, primo sternutatoriis acribus,
ac vehementibus, quibus maxime
fidentes inuenio ^(b) Hollerium, & ^(b) Pri-
^(c) Fort. Fidelem. Secundo ipsius ^{mo de}
^(d) Galeni consilio, paleam, tenu- ^{morb.}
emque lanam ægri naribus suspen- ^{inter.}
dendo. Si namque viuit homo, vi- ^{cap. 58.}
cisfi- ^(c) De ^{relat.}
^(d) Ter- ^{med.}
tio de ^{lib. 4.}
cap. I.

diff. cisitudine motus aëris , quantum
resp. uis lentissimi , lana mouebitur.
cap. IO.

Lana Quod profecto experimentum me-
agri morat (a) D. Gregor. olim susce-
naribus ptum fuisse in Presbytero Vrsino,
admo- cui, solutis membris , atque in
uenda. morte distento , cum Presbytera
(a) Di- sua, si quid vitale spiramen inesset,
al. lib. naribus opposita curasset arte di-
4. c. II. gnoscere, (magno certe ad hone-
statem tuendam argumento) sensit,
se ab ægro, collecta voce , vehe-
menter obiurgari, *discede a me mu-
lier; adhuc igniculus viuit; paleam
tolle.* Tertio, alii cereum, exiguumque lumen ori, ac naribus moribundi applicant, cuius flamma si a recto sursum tramite deflectat, ac tremula fiat, homo etiamnum viuit. Quarto, abstersum speculum ori apponunt, quod si paulo post maculis fœdetur, de vita spes est. Quo sane speculo feliciter vsus fuit

(b) Lib. (b) Albertinus Botton. ad explo-
I. de randam superstitem vitam in mu-
morb. liere patauina , quæ , hysterico
mul. stran-
cap. 45.

strangulatu correpta, adstantium omnium consensu mortua existimabatur.

V. Tandem, cum ad ipsius motum diaphragmatis, quantumvis minimum, efficiendum, costas spurias, quibus illud alligatur, moueri aliquo modo necesse sit; iure a practicis proponitur, vt, supino firmiter locato ægro, cyathus aqua plenus ad ima pectoris, supra cartilaginem ensiformem ad perpendiculum ponatur. Tunc si cyathus, contentumque fluidum, vel ^{Cyathus supra xiphoi-} minimum dimoueantur, in viuis ^{dem} est, si secus, iam mortuus æger. ^{cartilaginem}

VI. At enim vero huiusmodi suspensio respirationis indicia non ^{locandus} obiter, atque oscitanter, sed consulto, ac repetito periculo adamussim sunt expendenda, vt prudentes de vita, vel morte ægri, nunquam poenitendum, iudicium adhibeamus; contingit enim aliquando, vt ^{Motus etiam non sicut} certus motus tum abdominis, cum pectoris, etiam apud vita functos, ^{tales}

*ali-
quando
in mor-
tuis.*

excitari possit a naturali solidarum partium concidentia, vel a præternaturali contentorum fluidorum fermentatione, flatuumque præsertim elatere: quibus forsitan factum est, ut minus in arte periti, vitam cadaueribus attribuentes, non solum falsi, atque certe ridiculi interdum euaferint. Sed hæc omnia non tantum præceptis, quantum usu, ac diligentia docentur.

*Cordis
motus
in Pseu-
do mor-
tuis
quot
modis
sit per-
quiren-
dus.*

VII. Deinde ad lenem motum deprehendendum summarum venarum, auricularum, & cordis in pseudo-mortuis, longe maiori afficimur difficultate, quam sit ea, in qua versatur quisquis notas exilis, ac sepultæ respirationis inquirat. Et enim thoracis machina, & circumfusus aër, qui alterne per tracheam in animalibus ducitur, reduciturque, nostris certe sensibus propinquiora sunt ipso corde, eidemque appensis arteriis, quæ, nonnisi tenuatæ, ad extrema corporis pertinent. Accedit, ad rei momentum,

con-

consuetudo explorandi pulsum in
 solis carpis; exinde namque fit, vt,
 deficiente arteriarum ictu prius in
 carpis, quam in corde, aut in aor-
 ta, maioribusque illius ramis, sæpe
 nonnulli de omnimoda cessatione
 motus cordis iudicium ferant, cum
 primum in carpis pulsum desidera-
 ri cognouerint. Qua de re, vbi
 locus erit dubitationi, tunc motum
 cordis, & arteriarum non tantum-
 modo in artubus quæremus, sed,
 inclinato languentis corpore in sini-
 strum latus, calidam manum regi-
 oni cordis admouebimus, exquisi-
 turi, an motus aliquis in corde su-
 perfit. Deinde valida etiam digi-
 torum pressione tentabimus arteri-
 as carotides, quæ, cum diametro
 maiores sint iis, quæ ad manus
 sparguntur, nec oblique, & per an-
 gulum in axillis, sed recta ferantur
 ab arcu arteriæ magnæ versus caput,
 gradum impetus sanguinis, etiam si
 tenuissimum, a corde acceptum, fa-
 cilius excipere, & explorantibus

*Caro-
tides
arteriæ
ad su-
persti-
tem
pulsum
explo-
ran-
dum cur-
aptio-
res.*


ostendere, possunt. Interim vero superstites apud præcordia vitæ scintillulæ omni arte, admotis qua intra, qua extra corpus cardiacis volatilibus, ac suaueolentibus, fouendæ, atque excitandæ erunt, vt in arteriarum pulsibus clarius erumpant.

VIII. Enim vero, quemadmodum cauendum nobis est, ne occulto viuentem, propter imperitiā explorandæ reliquæ illius, quantumvis tenuissimæ, arteriarum pulsationis, inter mortuos reponamus; ita diligenter prouidendum, ne, vana opinione inuenti pulsus, artem nostram in contemptum adducamus. Siquidem exemplum habemus cuiusdam, quem prudens reticeo, qui, cum uni ex summis Romanæ Aulæ Proceribus, repente mortuo, & a nobis iam derelicto, adlisteret, tota strepente domo, nobisque stoliditatem illius mirantibus, Procerem etiamnum viuere contendebat. Cumque nos creduli-

dulitatis suæ causam sciscitaremur, pro signo adduxit superstitem adhuc pulsum. Neque sentiebat ^{Quæ} homo excors, pulsum, quem mor- ^{bitanda} tuo attribuebat, sensum esse arteria- ^{ne quis} rum propriorum digitorum (erat ^{pulsum} enim feruida fluidorum crasi dona- ^{mortuo} tus) quibus cum arctissime preme- ^{perpe-} ret cadaueris carpum, cæteroquin ^{ram at-} excarnem, & aridum, refluxum li- ^{tribuat.} berum ad venas proprii sanguinis impediēbat, ideoque suis arteriis validius ad extrema pulsantibus, sibi, & domesticis errorem hunc ineptissime obiecerat.

IX. Porro, vt redeamus ad pen- ^{Sopitas} sum, nullus sapiens, sedulusque ^{neruo-} Medicus curam negliget animal- ^{rum} ium spirituum, ac neruorum, sal- ^{motio-} tem splanchnicorum, mediis cla- ^{nes ex-} moribus in aures, stimulis ad ma- ^{citant-} gis sensiles partes, odoramentis, & ^{tia.} acribus volatilibus ori, ac naribus adhibitis, aliisque, quorum sylvam nemo practicorum non nouit, & de quibus plura dicemus in secun-

do libro, vbi de medicamentis, quæ hoc anno iis maxime profuisse visa sunt, qui, subitaneis morbis tentati, feliciter euaserunt.



De signis medicis, quibus repentina mors prænosci potest.

CAPVT XVII.

NON utilis modo, sed maxime necessaria Medicis videtur scientia præcognitionis repentinarum mortium, cum nostra (a) Præceptor Artis clare ostendat, cum non solum culpa vacaturum, verum etiam boni Medici nomen, atque admirationem consecuturum, qui, cum omnes sanos facere non possit, futura saltem præsentiat, atque prædicat. Hanc itaque spartam ornaturi, illud imprimis cauendum ducimus, ne quis tanti putet notas, quas subnectimus, vt eas vel omnino certas, &

(a) Hipp.in
vestib.
lib.
progn.

vt

ut aiunt, pathognomonicas credat,
 vel sine delectu, ac sigillatim accipi-
 at. Si quod enim in vniuersa me-
 dicina difficile, arduumque negoci-
 um, hoc procul dubio in ferendis
 futurorum iudiciis locatum est.
 Multa siquidem variis anni tempe-
 statibus, agrorum continentia, vel
 incontinentia, lätis, aut tristibus
 animi pathematibus mutantur in
 melius, aut in deterius; ut proinde
 etiam ad rem medicam pertinere
 putauerim, quod in Iuris doctrina *Summa*
 passim vsurpatur, nempe vel totam *pruden-*
 esse prudentiam, vel sine pruden- *tia in*
 tia exerceri non posse. Atque, *arte*
medica
 hinc ^(a) Hipp. voluit Medicum tum in *est ne-*
 cetera arte, tum in predictionibus *cessa-*
 consultissime se gerentem, ac probe in- *ria.*
 telligentem, eum, qui predictionis suc- ^{(a) Lib.}
 cessum consecutus sit, apud prudentem ^{2. præ-}
 agrum admirationi fore, qui vero de- ^{dic. n. 3.}
 errauerit, præter quam quod odio gra-
 uabitur, eum ne insania quidem su-
 spicionem effugere posse.

II. Ut igitur Medicus, præsagi-

Prudentia quomodo acquirenda. turus inopinatas mortes, in ipsamet coniecturali arte verax, ac prope securus euadat, primo, multis aliorum, & propriis observationibus diligenter studeat; deinde ex tota signorum messe manipulos quasi colligat, & ad suas quosque classes reducat, vt postmodum, cum occasio postulat, mature, ac studiose recogitando, & cogitata cum rebus conferendo, cautus, ac prudens pronunciet.

III. Nemo autem interea in spem erigatur, dari signa, quibus omne genus improuisæ mortis præsentiri, ac prænunciari possit. Et enim, quæ ab internis, sed cæcis, nullaque indicia producentibus, *Internæ varices cognitu difficiles.* principiis veniunt, vt inter alia sepultæ in ventribus venarum varices existant, eæ quidem Medicis raro innotescunt. Illæ duntaxat nobis aliquatenus patuerint, quæ fluunt a morbosis dispositionibus partium tum solidarum, cum fluidarum maioris vsus, a quibus, vt munus rite suum

suum peragentibus vita, & salus, ita, deerrantibus, morbi paulatim inducuntur, primo quidem aspectu leuiore, sed qui tandem, aceruatim erumpendo, inopinato solent interficere.

IV. De singulis suo tempore, nunc dicimus de vniuersis; vnum postremo summæ necessitatis huic loco adiicientes, scilicet non quemcunque ægrum, cui subitanæ mortis periculum imminet, de eodem esse commonefaciendum. Etenim omnes quidem homines, etsi seuerioris virtutis, animi tamen affectionibus sunt obnoxii, eisdemque aliquatenus perturbantur; ast ii maxime, qui vehementer timidi, atque imbecilles existunt, quos ipsamet mortis opinio, aut in mortem, aut in mortis discrimen adducit. Hinc recte ^(a) Galenus aliter cum sapientibus, aliter cum timidis, & stultis agendum esse consulu-
 (a) 6. epid. sect. 2. comm. 43.
 (b) de decent. ornat. n. 9.

rum ægroto occultanda esse. Sed interdum fit, vt, contraria penitus ratione, generosis Viris subitanæ mortis periculum sit enunciandum; vt timore ad ea flectantur vsurpanda remedia, quæ alias nimis fidenter spernere consueverunt.

*Mors
repen-
tina
quibus
potissi-
mum
acci-
dat.*

V. Quoniam vero repentinæ mortes iis potissimum solent accidere, qui morbos aliquos, vel propter symptomatum leuitatem, vel propter assuetudinem, sibi familiares redditos, facile despiciunt, sperantes, se aut sola naturæ ope conualituros, aut nonnisi præuia longi agonis admonitione fore decessuros: idcirco vnumquodque futuræ mortis indicium, ex vnoquoque genere huiusmodi malorum erit depromendum.

*Eius si-
gna ex
quibus
fonti-
bus
hauri-
enda.*

VI. Itaque eodem plane ordine, quo repentinæ mortis causas persecuti fuimus, vtemur etiam in examine signorum, quæ easdem necesse nobis portendunt, distinguentes huiusmodi notas; primo in eas, quæ

quæ colliguntur ex læsis instrumentis respirationis, & aëre; secundo in illas, quæ veniunt ex affecto corde, magnis vasis, & contento sanguine; tertio in reliquas, quæ proficiuntur ex morbis cerebri, nervorum, atque liquidi eorundem.



Agitur de signis future mortis repentinæ, petitis ex læsione instrumentorum, respirationi famulantium.

CAPUT XVIII.

Inter notas, quibus repente futurus indicatur interitus, non ultimum locum tenent illæ, quæ ex læsione pectoris, & pulmonum deducuntur.

II. Primo sane ortophnæa cum *Diuturnus* tussi apud Senes, si diu humida persistens, statim mutetur in siccam, *tus sis humida in siccam* morbo interim de sua vi nihil re-
mit-

conuer- mittente, improvisam necem, ut
sa,quan plurimum, præfagit, scilicet quod
do exi- lymphæ copia, quæ, suppressa ana-
tialis, catharsi, in pulmone, iam languido, atque obstructo subsistit, facile parit suffocationem, præsertim, si æger intemperantius, aut incontinentius vixerit.

Suffo-
catiua
quomo-
do,

III. Secundo tussis molesta, & suffocatiua ex acri latice, per glandulas arytænoideas, tracheæ, & bronchiorum affatim secreto, si magno cum impetu identidem recurrat, mortem subitam portendit, præcipue si æger, vel senex, vel languidus, atque etiam in vitæ regimine sit aliquanto liberior; apoplexia namque pulmonum, quam suffocatiuum catarrhum dicunt, ab irritantium serositatum confluxu, & articulorum pulmonum conuulsio-

Pulmo-
num a-
pople-
xia
morti-
fera,

(a) 2.
 De
 morb,
 n. 52.

ne, ut cum (a) Hippocrate loquamur, producitur. Quod sane mortis genus nos frequenter vidimus, & primum quidem, supra viginti annos, in Carolo Petrazzino aro-

matario ad Capitolii radices ; is enim, cum senex esset, atque huiusmodi tuslim sperneret, media tandem nocte , vt eidem prædictum fuit, suffocatus interiit.

IV. Tertio interni pectoris dolores, qui modo spirandi difficultatem, præsertim per accliuia, modo cordis angorem , sæpe pulsus inæqualitatem comites habent, quique non sinunt ægrum in vtrumque latus æquali facilitate decumbere, & corporis gracilitatem inducunt, ex tempore solent interficere, præcipue si ægri subeant violentos aliquos corporis motus, parumque laudabili cibo sese ingurgitent. Gerunt enim sepultum plerumque in altero pulmonum loco tuberculum, vel aliam congestionem, aut venæ pulmonicæ dilatationem, quorum, propter repentinam rupturam, aut propter inductam quaquauersum validissimam conuulsionem, liber transitus per cor, & pulmones tam sanguini, quam

*Interni
pectoris
dolores
quinam
lethales.*

*Ex iis,
qualis
morbus
latens
arguitur.*

(a)
Cent. 3.
obs.
cap. 22.
*Vena
pulmo-
nica
ruptu-
ram
qua-
nam
præce-
dant ex
Pote-
rio.
Ex pul-
monum
Bomica
repent:
moris
prædi-
ctio.*

quam aëri ocysime tollitur. Quam certe moriendi viam non pauci inierunt ex iis, quos nouimus; atque horum numero adscribendus videtur Doctor Medicus Vinciguerra, qui elapso anno, cum diu leui anhelitu, sepultisque in pectore doloribus vexatus fuisset, tandem in tempesta nocte, domesticis, ac Sacerdote vix accersitis, e viuis sublatus fuit. Vide quæ scripsit experientissimus (a) P. Poteri de iis, qui illico moriuntur ob rupturam venæ pulmonicæ iuxta sinistrum cordis ventriculum; illi enim respirandi quadam difficultate, deambulantes, corripiuntur, &, ob præcipientem virium lapsum, propinquis tenentur niti adminiculis.

V. Quarto magis adhuc repentina mors prædici potest in consimilibus casibus, si id, quod in pulmone congeritur, fuerit de natura vomicæ, quæ potissimum cognoscitur ex sicca tussi cum foetore quasi cadauerico, quem ægri, aërem edu-

educendo, identidem sentiunt. Rumpitur enim incerto alicubi tempore, cum erosus, vel nimium distractus fuerit folliculus, & plerumque occiditur, dictum factum, homo, ut scripsit^(a) Tulpus. At enim^(a) Lib. vero, si huiusmodi morbus hominem corripit, qui se in cibo, potuq;^{2. observ.} contineat, noxiumq; aërem præca-^{cap. 10.} ueat, tunc neque magnam in molem^{Qui-} augetur, neque semper extempore^{nam} disilit, aut si diffiliat, subitam necem^{super-} afferre solet. Quinimo nonnullos^(b) De superstites, atq; sanos, ut^(b) Willisio^{morb. pecc. sect. I. cap. II.} contigit, nos etiam vidimus. Secus atque, si æger baccho, & genio indulgeat, tunc Medicus, ratione contraria, securius iudicium de subitaneo interitu pronunciare poterit.

VI. Quinto cum ad motum^{Asthma} thoracis tantopere nervi concur-^{conuul-} rant, fit aliquando, ut conuulsiva^{suum} asthmata ad repentinam necem de-^{ali-} ducant ægros, qui, antiquato iam^{quando} malo, putant se misere vivere, si^{morti-} medice vivant, morbumque pro-^{ferum.} pterea

pterea nouo morbo cumulantes,
externa plerumq; accedente causa,
repente moriuntur.

VII. Tandem cum in respirati-
onis materiem veniat aër, & quid-
quid in aëre latitat, non immerito

*Ex an-
ni tem-
pestati-
bus, quæ
ad subi-
tam
mori-
tem du-
cant.* inter subitanæ mortis signa repo-
nendas esse putauerim particulares
quasdam tempestatum, aërisque
affectiones, quippe quæ multos,
lente cæteroquin ægrotantes, re-
pente solent occidere, & quidem
non vi primarum tantum, vt aiunt,

qualitatum; sed pulsu, & varia mix-
tura particularum, quæ miris mo-
dis nostrarum partium officia vari-
ant, atque perturbant. Sagax ita-
que, & peritus Medicus vtatur
consilio Hippocr. qui sparsim do-
cet, ex magnis temporum mutati-
onibus mala præaffectis iam corpo-
ribus euenire. Sed clarius de subi-

(a) n. 3. taneis mortibus loqui videtur (a) in
libro de aëre, locis, & aquis, cuius
sane integrum hic textum, vtpote
plura docentem, transcribimus.

*Lotus
Hipp.*

Præ-

Præcipue vero maxima anni temporum mutationes obseruanda sunt, vt neque medicamentum purgans iubenter exhibeamus, neque partes circa ventrem vramus, aut secemus, ante dies decem, aut etiam plures. Maxime tamen sufficient decem. Ac maximi periculi plena sunt ambo solstitia, præcipueque æstiuum. Periculosissima etiam ambo æquinoctia existimantur, maxime vero autumnale. Syderum quoque ortus obseruandi, præcipueque canicula, deinde arcturi, & vergiliarum occasus. His enim potissimum diebus morbi iudicationem subeunt, & alii quidem perimunt, alii vero desinunt, aliquæ omnes in aliam formam, & statum transeunt. Et reuera multos ordinario etiam rerum cursu in æquinoctiis, & media potissimum æstate, summoque hyeme repente mori obseruamus.

VIII. Qua de re Medicus, iunctis causarum, & signorum ideis, non admodum difficulter aliquem inopinato moriturum poterit diuinare,

*Probi
aëris in
deteri-
orem
muta-
tio
mortis
causa.*

nare, si illum, fractis viribus, ex diuturno morbo partium maioris vsus, circa prædictas magnas temporum mutationes, deterius affici animaduernerit. Neque profecto aliter iudicet de iis, qui salubre coelum mutant in pestiferum, cum potissimum ipsi valetudine non admodum prospera freti fuerint.

IX. Sed quoniam multa symptomata, quæ ad respirationem pertinere viderentur, radicem omnino morbosam habent in ipso corde, eique appensis vasis; idcirco sequenti capite, acturi de signis, desumendis a corde, & sanguiferis, perstringemus nonnulla etiam indicia, quæ subitanam mortem præsagiunt, læsa etiam respiratione.

*De signis futurae subitaneae mortis a
Corde, Magnis Vasis, &
Sanguine.*

CAPUT XIX.



T latam hanc, confusam-
que materiem certis capi-
tibus distinguamus, placet *Ex cor-
dis &c.
affecti-
onibus,
plura
subita
m rtiis
pralu-
dia.*
huiusmodi notas deducere, primo
ex pulsum vitiiis, secundo ex pal-
pitatione, aut dolore cordis, tertio
ex animi deliquiis, quarto ex hæ-
morrhagia, atque aneurysmate,
quinto ex habitu plethorico, &
obeso, tandem ex quarundam sup-
pressione euacuationum.

II. Illud vero ante omnia hic ad-
uertimus, recensitas passiones tam
cordis, & magnorum vasorum,
quam sanguinis, & omnium flui-
dorum, quæ cum sanguine circum-
feruntur, vel a sanguine separan-
tur, subitaneum interitum vix vn-
quam indicare posse, cum eadem
seorsim, & singulæ ægros diu exa-
uerint.

Signis non seorsim sed collectim sumptis tutius repentina mors pradicatur. uerint. Experimento enim docemur, has notas tunc improviso morituros præmonstrare, cum inter se varie permixtæ fuerint. Unde diligens Medicus, recte diuinaturus, neutiquam celeriter pronuntiabit, sed mature signa coniunget, ut nos cap. xvii. jam ostendimus, id quod pluries in lib. de progn. inculcauit Hippocrates, quando signum aliquod lethale esse decernit, sæpe repetendo, *sed oportet alia signa contemplari.*

III. Et quidem primo quantum spectat ad pulsum vitia, etiamsi apud aliquos inæqualitas, atque intermittentia tanti fiat, ut inde (a) De loc. affect. cap. vlt. & 3. de prælag. expulsi. cap. 4. *Pulsus intermittens non semper funestus* Gal. subitam mortem Antipatro prædixerit. Nos tamen signum hoc non solum in pueris, & senibus, ut idem asseruit Galenus, sed etiam in iuuenibus, & robustis frequenter nullo modo funestum obseruauimus, cum scilicet ex leui connutrito organorum vitio, vel ex hypochondriorum irritatione procedit,

cedit, cuius forsitan indolis extitit
intermittentia pulsus illius. Oeco-
nomi, quem ipse (a) Gal. tanquam ^{(a) De prælag.}
sanum ad consueta negocia inge-^{ad}
nue remisit. Etenim si sola pulsus ^{posth. cap.}
intermittentia hominem, bene cæ-^{ult.}
teroquin valentem, detineat, adeo
optimos Medicos a subitanæ mor-
tis prælagio dehortatur, vt potius
eos in spem adducat, leue illud
malum, antequam grauius euaserit,
opportuna medela fore tollendum.
Huius veritatis ex memet ipso ex-^{Propri- um ex-}
perimentum promam, qui, cum tria ^{peri-}
ante lustra pertinaci, mihi que sen-^{men-}
sibili cordis contractione, indeque ^{tum.}
orta pulsus intermittentia, ex hy-
pochondriorum consensu, per se-
xennium laborauerim, plus aliis,
quam mihi officiosus, & cautus, vsu
tandem rhabarbari, chalybis, & iu-
ris viperati, perfecte conualui. Vt ^{Quan- do peri- culosus.}
igitur intermittentia pulsus impro-
uisæ necis certius omen esse possit,
necesse est, vt iungatur omni inæ-
qualitatum generi, palpitationi, an-

helitui, aliisque similibus pectoris passionibus, de quibus infra.

*Pulsus
tardi-
tas
quando
exitia-
lis.*

*Indici-
um fu-
tura
moris
est
cordis
para-
lysis.*

IV. Pulsus utique tarditas, si eadem, singulis ictibus languide recurrens, alterius pulsationis intermedium tempus fere totum pertinaciter absumat, probabilius exhibet inopinatae mortis indicium; praesertim si patiens debilis, ac senex fuerit, ut saepe nos experti sumus. Etenim quaecunque sit causa, scilicet vel simplex (quod raro euenit) ex defectu animalium spirituum, in praecordia descendentium, vel mixta ex foeculento, minusque mobili, per cordis ventriculos, sanguine, semper talis pulsus integram, firmamque eiusdem cordis paralyfim, aliquando futuram, praemonstrare solet, maxime tempore somni, quo, instrumentis languidius pellentibus, idem sanguis (etiam subobscurè agnoscante (a) Hippocr.) tardius mouetur.

(a) De
flat.
n. 20.

V. Secundo palpitatio cordis, ipsa quo-

quoq; subitæ mortis fit prænuncia, *Cordis palpita-*
 si fuerit frequens, si magna, si cum *tio per-*
 anhelitu, animi deliquiis, omni *niciofa,*
 genere inæqualitatum pulsus, tan- *qua.*
 dem si æger congrua vitæ ratione
 minime vtatur: Etenim, si hæc
 symptomata magna ex parte simul
 conspirauerint, significatur, ma-
 gnum quoque dari vitium in cor-
 de, aut summis vasis, cui acceden-
 te aliqua causa procatartica, nullo
 labore motus ipsius cordis, & san-
 guinis ex tempore lethaliter sisti-
 tur. Quemadmodum verosimile
 est, Galenum, iis admonitum in-
 diciis, toties decantato Antipatro
 improuisam, quam postea subiit,
 mortem prædixisse.

VI. E contrario autem, si pal- *Qua-*
 pitatio oriatur ex causa, cordi ob- *nam*
 stinate nequaquam adiuncta, sed *minus*
 cum fluidis circulante, ut plerum- *pericu-*
 que esse solet acerrimus ichor, vel *losa.*
 quidquid aliud, quod, ad irritan-
 das cordis fibras, plane fugitivum,
 pertingit; raro abrumpendam illi-

In his
Vrina
stran-
guriolæ
salu-
taris.

co vitam minuitur. Multos pro-
pterea nouimus, qui a recurrenti-
bus palpitationibus, euacuata copia
stranguriolæ vrinæ, penitus libera-
ti fuerunt; e quibus Illustrissimus
Præsul Bonauentura, Sanctiss. Do-
mini Nostri intimus Cubicularius,
& Eleemosynarius, splendore gene-
ris, & propriis virtutibus, lauda-
tissimus. Latex porro salino-acer
ab hypochondriis maxime redux,
ita interdum cordis musculos con-
uellit, ut stranguriosum veluti
transitum sanguinis per eiusdem
ventriculos cum palpitatione pro-
ducat.

Diu-
turnus
cordis
dolor
in seni-
bus su-
bitam
mortem
signifi-
cat ex
Hipp.

VII. Dolor similiter cordis,
præsertim in senibus, sæpius recur-
rens, inopinatam necem solet in-
dicare, iuxta illud Hippocratis, in
Coacis, *Cordis dolor, seniori sæpius
consuescens, repentinam mortem signi-
ficat.* Vel enim sumatur hæc
passio pro molesta ipsius cordis, &
orificiorum eius sensatione, vel pro
affectione ventriculi, quæ secum
trahat

trahat ipsum cor, & græcis καρδι-
 ων πόνος vocatur: utroq; sane modo
 res est subitanei periculi plena,
 præsertim apud senes. Inuisimus
 olim Virum, cui, cedente iam po-
 dagra, atrox cordis dolor identi-
 dem recurrebat; is repente,
 oborta suffocatione, circa Æ-
 quinoctium, sublatus est. Simi-
 lem offendimus historiam apud (a)
 Hollerium cuiusdam septuagena-
 rii, cui dolor iste cœpit esse fre-
 quens cum angustia spiritus, & suf-
 focationis periculo, is etiam, do-
 mum rediens, repente obiit.

(a) In
 Comm.
 I lib. 3.
 coac.
 sect. 2.
 coac.
 17.

VIII. Neque dubitandum, quin
 dolor ventriculi, καρδιω γνός di-
 ctus, sæpeque rediens, si ex sum-
 mopere pravis humoribus, in ægro
 delitescentibus, oriatur, inopinata
 mortis vna simul causa, & signum
 esse possit: recte siquidem admo-
 nebat (b) Hippocrates iis verbis,
 Oris ventriculi dolor cum præcordio
 distento, & capitis dolore, malignum,

Idem
 porten-
 dit καρ-
 διω-
 γνός.

(b) Lib.
 I. præ-
 dict.
 n. 9.

Hipp. & quidpiam anbelosum. Nam ii re-
autho- pente moriuntur, velut in Dysode. Si-
ritas, gnificatur enim in eo corpore li-
& rati- quida eo usque acria redundare, ut
ones addu- Veneficam naturam induerint. Et-
cuntur. enim, quemadmodum arsenicum,
 sublimatum, aliaque huius generis
 venena, villos, & fibras erodendo,
 conuellunt ventriculum, & cor, ac
 propterea citam necem inferre so-
 lent; ita multo facilius, ac celeri-
 us ingenita ista venena aliquando
 interimunt; nimirum quia interius
 collecta, & naturalibus fluidis re-
 center admixta, expeditius per ca-
 nales quaquauersum feruntur. Quo-
 rum sane veneficorum succorum
 prænuncia signa existunt dolor ven-
 triculi, ad præcordia propagatus,
 cum distensione, & anhelitu, per-
 tinaciter atque identidem recur-
 rens. Confer huc quæ scripsimus
 cap. v. huius libri versus finem.

IX. Tertio, inter signa futuræ
 mortis improuisæ, illud nostris, ali-
 orumque experimentis magis cer-
 tum,

tum, comprobatumque est præsa-
 gium, quod ^{(a) 2.} Hippocrates in hanc ^{Aph. 4r}
 sententiam exponit. *Qui frequen-* ^{In ani-}
ter, ac fortiter sine causa manifesta ^{mi deli-}
delinquunt animo, repente moriun- ^{quio, &}
tur. Vbi vna est omnium Com- ^{subita}
 mentatorum, ad usque clarissimum ^{mortis}
 Lucam Tozzium, sententia, vt, pro ^{sit præ-}
 veraci huius prognoseos exitu, tria ^{sagium,}
 simul coniungantur; primo, vt fre- ^{triare-}
 quenter; non enim satis est, ali- ^{qui-}
 quem semel duntaxat in anno viri- ^{runtur.}
 bus cecidisse; secundo vt fortiter,
 nempe usque ad syncopis confini-
 um; denique, vt id absque causa
 manifesta, hoc est, obuia & exter-
 na contingat. Ita enim significa-
 tur, magnum, fixumque aut cor-
 di, aut finitimis partibus hære
 malum, quod motum præcordio-
 rum, & sanguinis penitus tollens,
 subitam necem aliquando sit illa-
 turum. Etenim non raro in cor-
 de, quod passim, etiam in reliquis
 muscularibus partibus, accidit, vt
 modo pauciores, & laxæ, modo

(a) 6.
De
cord.
n. 4.
*Cordis
robur,
aut im-
becilli-
tas sæpe
timoris,
aut au-
dacia
causa.*

numero, ac vi maiores fibræ, vasa-
que influentia, & refluentia cum
congrua proportione, aut sine ea
ad suam integrandam structuram
concurrent; profecto in istis casu-
bus, fortissimus musculorum (ut
cor ab (a) Hippocrate appellatur)
ad naturales systoles minori, vel
maiori, quam par est, vi erigitur:
vnde talis orta imbecillitas, vel ex-
traordinarium robur, non solum
tempore contrahit morbos, quibus
ad frequentes, fortesque animi de-
fectiones, subitæ mortis prænunci-
as, deducitur; sed homines vel ni-
mium timidos, vel nimium audaces
potissimum constituit, quorum sane
priores, utpote maxime pusillani-
mes, improuisum, ac vehemens pa-
thema sæpe deiicit, ac prosternit; eo
quidem facilius, quo animi passio
inceptum, occultumque in præcor-
diis malum, veluti pessimam inte-
ritus radicem, inueniat.

X. Quarto cum nulla frequenti-
or sit via, per quam repente de
medio

medio tolluntur homines , quam
 larga profusio sanguinis intro , vel
 extra corpus : idcirco secuta etiam ,
 & certa repentinæ mortis indicia a
 Medico peti poterunt ex signis , qui-
 bus docemur imminere rupturam
 summorum vasorum in thorace , v-
 tero , intestinis , hæmorrhoidibus ,
 aliisque internis sedibus. Sed in-
 ter signa non dubia properæ mortis
 in hæmorrhagiis , illud sane est , *In hæ-*
 quod tradidit (a) Hippocrates in *mor-*
 Coacis ; inquiens ; *Si quibus sanguis* *rhagiis*
effluxit , rigor superveniat , & ulce- *mors*
ra maligna sint , ii , vel loquentes, *inopi-*
inopinanter moriuntur ; *nata*
Hoc passim *quan-*
in vulneribus capitis , in carcino- *do, ex*
matibus sanguifluis , aut malignis *Hipp.*
aliis vlceribus vsu venit , scilicet, *(a) Iux-*
vt , cum ægri , post hæmorrhagias, *ta di-*
rigore corripuntur , (dissipata dul- *uision.*
ciac volatili sanguinis parte , & fer- *Holler.*
mento quodam acri , ac pêne ve- *lib. 4.*
nesico ad præcordia , & cerebrum *sect. 2.*
reassumpto) subito vitam dese- *coac. 3.*
rant.

Fre-
guens
cadaue-
rum se-
ctio
ignotas
aliquot
subita
mortis
causas
detexit.

Interna
aneurys-
mata
Et in-
conti-
nentes
subito,
ita so-
brios
lente
inter-
ficiunt.

XI. Enim vero, postquam frequentiora reddita sunt humanorum corporum extispicia, quibus antiqui, præ horrore, parcius utebantur, nobis clare innotuit, multos, qui ex tempore moriuntur, internis aneurysmatibus, aut varicibus laborasse. Certissimum propterea sollicitæ necis signum deducemus, ex semeiotica varicum, atque aneurysmatum, quæ paulatim ad talem, tantamque exilitatem sanguinea vasa redigunt, ut aliquando, momento temporis, disrumpant. Et quidem hic loci dissimulare non possum, sæpe experimentis comperiisse, aneurysmata illos potissimum ægros inopinato interficere, qui minus continentem, frugalemque vitam ducunt; eos vero, qui parce, sobrie, continenterque viuunt, aliud morbi genus, ac lentus, ut plurimum, subortus hydrops, longo cum agone, solet interimere. Quare Medicus, etiam, iuxta ægrorum mores, ac vivendi

consuetudines, iudicia sua prudenter disponat, & proferat.

XII. Quinto, ex habitu athletico nulli dubium erit, quin repentinæ quoque mortis indicia desumi debeant, quoties athletæ, non solum bonum habitum sine mora, iuxta (a) Hippocratis præceptum, minime soluerint, anticipantes humorum diminutione discrimen; verum etiam lauta mensa, somno, atque otio plenius saginentur, quem sane plenior, & coloratiorem corporis habitum, iure suspectum bonum appellauit (b) Celsus: etenim athletarum plenitudo, cum ad summum deuenierit bonitatis, duplici via citam mortem minatur, tum quia vasa intus, forisque infarcit, ac premit, spatiumque propterea fluidorum motui, ac miscellæ aliquando penitus aufert; tum vel maxime quia eadem sanguinea vasa dirumpit, vbi minor illorum resistentia, vel maior sanguinis impetus occurrit. Vnde ad rem scripsit

Athletis

quando idem eueniat.

(a) p. aph. 3.

(b) Lib. 2. cap. 2 Duplex mali euentus causa.

(a) Lib. de flat. n. 17. pfit (a) Hippocrates *compressus sanguis sua copia, qua maxime compressionem fecerit, venas perrumpit.*

XIII. Ad hoc ipsum genus signorum refertur etiam obesus, ac nimium pinguis habitus, de quo sane idem locutus est (b) Hipp. dum inquit, *qui natura admodum crassi sunt, citius intereunt, quam graciles;* ii enim vasa omnia, propter nimiam pinguedinem, ita habent compressa, atque exilia, sanguinemque, propter volatilium spirituum penuriam, adeo lentescentem, ut eiusdem circulatio, minimo interdum negotio, repente intercipiatur. Quorum exempla nemo medicorum propriis experimentis plura non congeffit, præter innumera, quæ passim a nostris collectoribus referuntur; ut in iis commemorandis tempus terendum non sit. Illud tamen prætereundum nobis minime videtur, in huiusmodi athleticorum, pinguiumque habitu, tunc præcipue subitam mor-

mor-

mortem a sedulo, doctoque Medico diuinari posse, cum apparuerint faciei, & oculorum color mutatus in liuidum, respirationis difficultas, cordis angor, motuumque impotentia, veternus, aut vertigo.

*Hic imminens mors
unde dignoscatur.*

XIV. Tandem non aspernanda venturæ ex abrupto mortis indicia colliguntur ex suppressis criticis euacuationibus, aut decubitibus tum sanguinis, tum fluidorum quorumcunque a sanguine secedentium. Etenim sæpe accidit, vt vitiosa fluida, vel reassumpta, vel non ultra propulsa lethaliter subsistant in cerebro, & præcordiis. Pauca hic sub exemplo sumamus.

*Crisis suppressa
sæpe subita
mortis prænuntiatio.*

XV. Puerperam improuiso decessuram pene tuto poteris pronunciare, si prauis humoribus redundans, interdum præfocetur, lochiaque, odorum olfactu, continuo introrsum reuocentur; ad cor enim subito resiliunt, & ad cerebrum ascendunt; atque vtroque lethiferam stationem inducunt.

*Hæmor-
rhoides
item se-
num
suppres-
sa.*

XVI. Simili prognosi vti poteris in suppressis hæmorrhoidibus apud senes, qui illorum fluxui assueuerunt, si capitis grauitate, ac vertigine, vel cordis oppressione, aut lipothymiis post siccitas mariscas diu tentati fuerint, eoque maxime si vini, lactisque abusus ad necis causam accedat.

*Phyfici
eis qua-
le æqui-
noctium
lethi-
ferum.
(a) 3.*

XVII. Improviso pariter moriuntur phyfici, quoties circa æquinoctium, præsertim (a) autumnale, pus per anacatharsim non amplius excernant.

*aph. 10.
Vario-
larum
retro-
cessio
quando
mor-
talis.*

XVIII. Si variolæ, ac morbilli, cum inter secundum, ac tertium stadium versantur, pertinaciter retrocedant, ægerque in lecto iacetur, illum inexpectato moriturum poteris prædicere. Non absimili quidem præsagio vtere, cum in ægro, cæteroquin languido, & cholera humida laborante, sponte, vel arte excretiones atrabiliaris, vel alterius exoticæ indolis immature subsistunt. Neque a vero deerra-
bis,

bis, improvissam necem solerter di-
 uinans in senibus potissimum, a-
 pud quos ani fistulæ, crurum vlce-
 ra, nares, vel aures, acrisanie ma-
 nare consueta, ab eo opere peni-
 tus vacauerint, præcipue si in cere-
 bro, aut in præcordiis inceptæ iam
 stagnationis, atque irritationis in-
 dicia se proderint.

*Emis-
 riis oc-
 clusis
 unde
 subita
 necis
 pralu-
 dium.*

XIX. Hæc autem satis fore arbi-
 tramur prudenti æque, ac perito
 Medico; ex iis enim in reliquas
 prognoses, a suppressis euacuatio-
 nibus ventriculi, cutis, aliarumque
 partium deducendas, ipse ex se ar-
 gumenta desumet. Illud tamen se-
 dulo, ac semper aduertimus, sup-
 pressas euacuationes aliquando ef-
 se tantum signa, aliquando etiam
 causas improvissæ mortis. Sunt qui-
 dem fere nuda signa, cum ea liqui-
 da, quæ solebant excerni, nec mul-
 ta, nec prauæ admodum indolis
 extiterunt. Exemplum habemus
 cauterii exsiccationem in senibus,
 quæ illorum interitum præcurrit,

*Sup-
 pressæ
 euacu-
 ationes
 modo
 signa,
 modo
 inopi-
 nata
 mortis
 causa.*

eo quia apud eosdem vniuersa iam fluidorum, solidorumque machina, de suo sensim robore remittens, omnia œconomiae animalis, ac potissimum secretionum munera languide exercet, quibus penitus deficientibus, tandem mors ob-

(a) In
suo syn-

tag.

præ-
dict.

part. I.

cap. 6.


parti-
cul. 4.

Inter-
dum
sunt
causa
simul,
& si-
gnum.

repat. Vnde non inepte (a) Roder. Castren. *Clauditur fonticulus, quia homo est morti proximus; non est homo morti proximus, quia fonticulus clauditur.*

XX. Sunt vero causa simul, & signum properæ necis suppressæ illæ euacuationes, quæ non copia tantum, sed deleteria mixtura egerebantur: eæ namque, cum intra corpus subsistunt, in aliquam iam ante debilitatam partem maioris visus decumbunt, ocysimumque exitium plerumque portendunt. Neque interim Lectores tædeat nos adeo inculcare, ne Medici ex tempore præsagia sua effutiant; non enim semper, vbi consuetæ restiterint euacuationes, subitus morbus in-

ingruit; interdum lentus inducitur, qui longo etiam cum agone viam sternit ad interitum.



De signis improuise mortis a cerebro, nervis, & liquido animali.

C A P V T XX.

ETIAM si supra meminimus multorum signorum, quæ ex perperam operantibus instrumentis facultatis animalis improuisam mortem præmonstrant, de iis tamen plura nunc, & apertius dicere constituimus, cum clarius ea doceri, atque intelligi soleant, quæ suo stant ordine distributa, quo confuso, etiam disciplinarum peritura sint omnia.

*Ordo
est ani-
ma di-
scipli-
narum.*

II. Primum itaque capitis, & neruorum affectiones, quæ fortem apoplexiam minantur, clandestinam etiam necem plerumque prænunciant. Hæc tamen præfagia, ut exitu comprobentur, non quibus-

*Adim-
proui-
sam
mortem
ex ce-
rebro
præsa-
gien-
dam si-
gnorum
syndro-
me re-
quiri-
tur.*

*I. Ex
etate.*

(a) 3.

*aph. 31.
& 6.*

aph. 57.

(b) 6.

epid.

sect. 3.

II. Ex

alicu-

ius eua-

cuatio-

nis sup-

pressi-

one.

III. Ex

præuiis

capitis

&c. af-

fectio-

nibus.

libet leuissimis etiam cerebri sym-
ptomatibus niti debent, sed valide
fundari in cumulo , & congestu
causarum, passionum, & circum-
stantiarum, quæ omnia syndromen
signorum constituunt. Aggrega-
tur vero ista syndrome primo ex
ætate ipsius ægri, quæ a quadrage-
simo quinto per totum (a) senium
excipiendis syderationibus aptior
esse solet. Secundo ex suppressa
euacuatione hæmorrhoidum, (b)
fistularum, herpetis, muci narium,
& consimilium, quæ quidem eua-
cuationes, ac decubitus, sicuti cum
vigent, multorum sunt medelæ
morborum, ita cum sponte, vel ar-
te in senibus potissimum sanantur,
facili negotio fortem inducunt a-
poplexiam, quoties in cerebro ta-
lem vasorum, ac fibrarum imbe-
cillitatem inueniant, per quam
plus sanguinis accipiatur, quam re-
mittatur. Tertio ex præuiis capi-
tis, & nervorum affectionibus; ra-
ro enim forti apoplexia quis pre-
hen-

henditur, nisi horum præludia symptomatum præcesserint. Hæc autem sunt dolor, grauitas, atque imbecillitas capitis, memoriæ iactura, in somnum procliuitas, vertigo, cœcitas, membrorum torpor, & præ omnibus, leues, quæ anteuenerint, apoplexiæ : eæ namque in fortem, ac subito interimentem tandem desinunt.

III. Et quoniam Hippocrates *Exitio-
sa apo-
plexia
quo
tempo-
re po-
tissi-
mum
contin-
gant.* vult Medicum adeo in diuinando peritum, vt non solum ipsam mortem, sed illius etiam tempus præ- sagire nouerit : idcirco sciamus, oportet, apoplexias, ocyssime interimentes, non tantum circa æquinoctia, sed etiam circa solstitia frequentissime contingere, vt alias monuimus. Quare per hæc tempora eas diuinare poterimus, vbi signa præcurrent; & constitutio aëris fuerit inæqualis, pluuia, aquilonaris, & australis; aut æger vtatur parum laudabili viuendi norma, ac præcipue insalubrium ciborum,

*Qui-
nam se-
nes fa-
cile
eua-
dant
apople-
ctici.*

& vini sit appetentior. Atque hinc senes utriusque sexus, quoties ex cerebri, neruorumque decubitu cœci euaserint, & post hyemale solstitium inter ipsas noctis tenebras, se ignem, aut splendorem identidem videre videantur; ii quidem facile, cum sol in taurum ingreditur, forti apoplexia correpti, repente decedunt: significatur enim magnum iam tremorem, pressionemque ad thalamos neruorum opticorum, & partem medullæ cerebri post illud solstitium inductos fuisse, quibus ob respondentem quadraturam, longe maior, immo maxima, & violentissima distractio, & pressio succedere solent, quæ, præsertim ad cerebri circumferentiam simul, & centrum in senibus factæ, breuissime necant. Huiusmodi vero prædictiones, ex observationibus medico-astronomicis deductæ, non Artem modo, sed ipsos etiam Artifices illustrant.

*Medico
astro-
nomica
obser-
uatio
ad præ-
sagien-
dum
pro-
ficua.*

IV. Secundo, qui iam diu epi-
lepti-

lepticiis recursibus tentati fuerunt, *Ex epilepticis qui repente*
 indeque immemorem, languidam, *pere-*
 ac melancholicam ducunt vitam, *ant.*
 hanc sane repentina morte claudere solent, rupto plerumque intra
 cranium vase sanguifero, post indu-
 ctam supra cerebrum congestio-
 nem. Quare prudens, & sciens
 Medicus in iis casibus tuto fatalem
 improuiso diem prædicere poterit.

V. Tertio, qui ex capitis vulne- *Capitis*
 ribus, aut contusionibus laborant *vulnera*
 (etiamsi in tuto esse imprudentio- *Ec. in-*
 ribus viderentur) si rigore corrip- *opinato*
 antur, breui tempore decedunt. *enecan-*
 Significatur enim factam fuisse sub *ria, quæ*
 cranio vasculorum rupturam, vnde
 effusa liquida, dissipato per moram
 volatili, eaque ratione euerfa crasi,
 in acerrimam, & veneno similem
 naturam abierunt, quæ tandem
 quaquauersum in neruorum prin-
 cipium, ac fines repente diffundun-
 tur, mortiferamque conuulsionem
 inducunt, in quorum cadaueribus
 fere semper inuenitur abscessus in

hepate, cuius ætiologiam exhibemus in nostro ad Hipp. lib. de vulner. capitis commentario.

VI. Hæc sane, quæ tribus capitibus improuisæ mortis signa perstringimus, cæterorum indiciorum, etiam illorum, quæ ex animo veniunt, exemplar esse possunt, ac

*Medici
prudentia in
ferenda
prognosis.*

documentum, rati oportere Medicum ita prudenter in hoc negotio se gerere, ut, si non semper vere diuinet, saltem non sæpe fallat.

si. Certitudinem namque exactam in
(a) De Medico, ut ait (a) Hipp. *raro videre*
vet. *contingit.* Vnde laudauerim, ut
med. *quis potius a prædicendo se abstin-*
n. 16. *eat, quam imperitiam suam palam*
ostendat. Turpe siquidem est il-
lum, quem improuiso morituum
pronunciauimus, vel euasisse, vel
lento morbo decesisse.

*Agitur in genere de methodo præser-
uandi a subitaneis Mortibus.*

CAPVT XXI.

POST signa proximum cen-
semus de præseruatiua me-
thodo subitaneæ mortis
verba facere. Etenim, vt homo
grauius, ac frequentius brutis ani-
malibus ægrotat, atque idcirco,
pluribus inuentis, excogitatisque
pharmacis, huic infortunio mede-
tur; ita, cum crebrius quoque im-
prouisæ neci, ex internis causis or-
tæ, sit obnoxius, rationi consonum
est, vt subitaneum diem, aut peni-
tus declinare, aut saltem pro viri-
bus studeat retardare.

II. Scio apud ethnicos antiquis-
simum fuisse problema, quodnam
genus mortis, lentæne, an vero
subitæ hominibus fuerit exoptan-
dum? ac proinde (a) Iul. Cæsarem
pridie ante mortem, cum apud
Marcum Lepidum cœnaret, hoc
moto sermone, omnes antiuertisse
excla-

(a)
Apud.
Plut.
in Cæ-
sare.

exclamantem, *inopinatum*. Sed ô fallacia hominum desideria! ô votum inane, & punitum! Ipse siquidem Cæsar proprio didicit experimento, omnium pessimam esse necem inopinatam, quippe quæ neq; ipsi cum indolentia contigit, vt forte putabat, neque sine contumelia.

*Inopinata
Mors a
probo,
& prudenti
firo
haud
exoptanda.
(a) Ex
Gratian. in
eius
vita
lib. 4.
cap.
vlt.*

Nos vero, quorum mentibus in tanta causarum obscuritate Deus Opt. Max. altum, æternumque fidei lumen immisit, illam multo magis mortem, tum optimam opinari, tum salutarem optare debemus, in qua (vt insignis pietate, ac iudicio Vir Cardinalis Commendonus (a) ex D. Augustini Sententia, dicere solebat) animum sensibus integrum morti componere, & Deum nobis per Christianæ disciplinæ sacra, piaculæque possumus propitiare.

III. Quid? quod si de solis humanis foret consulendum, nobis certe nunquam subitum, atque inconsideratum e vita discessum concupiscere oporteret. Quis namque

que adeo ferox inter commercia hominum adoleuit, qui acerbe, penitusque, & suos, & sua oderit, ut ante mortem testamenta conscribere, mutare, obsignare, dicere aliquid, aut reddere, si cui debet, ad patriæ, ad affinium, ad sui denique tranquillitatem pertinaciter nolit? Qui liberis consilia, amicis, ut fecit Socrates, dare oscula negligat? Timeamus itaque, quantum humana, quantum sunt æterna æstimanda, timeamus, inquam, inopinatam subitamque mortem, Deumque propterea vniuersalis Ecclesiæ vocibus enixe precemur, ut nos ab eadem pro immensa sua benignitate tueatur.

IV. At nostri suscepti memores instituti, partem esse putamus, diligenter expendere, qua methodo a causis huiusmodi interitus solenter declinemus.

V. Enim vero daturi methodum præseruandis improuisis mortibus, quæ ab internis causis dependent,
initio

initio admonemus, hanc normam per Medicos vnice deriuandam esse ab hygiene, & therapeia illarum affectionum, quæ in aliquem ex subitaneis morbis possunt transire, vnde ægri repente decedant: propterea quicumque studiose legerit capita superiora de signis, certe non obscurum tenebit principium, a quo huiusmodi præcautionis discrimina desumenda veniunt. At, quoniam innumeræ, vt exposuimus, existunt nostrorum corporum affectiones, quæ subitam mortem inferre valent, idcirco sapiens, oportet, expertusque sit Medicus, vt consilium vnicuique congruum, adhibeat. Sed cum adhuc nonnulla in genere demonstrari possint, ea nunc summatim exponere non omittemus.

*Corporum
ita im-
provisò
fato
subiecta
nunc
tan-
quam*

VI. Corpora, improuisis hisce casibus subiecta, vel sunt aspectu sana, vel euidenter ægra. Ab hac vero vniuersalisima diuisione mihi petenda videtur præcipua partitio me-

methodi præseruatiuæ. Et quidem, ^{sana;}
 vt de vtroque membro diuisionis ^{nunc}
 absque vlla confusione disleramus. ^{selue}
 Sit. ^{agra}
^{confide-}
^{randa.}



*Qua methodo præseruanda sunt cor-
 pora aspectu sana.*

C A P V T XXII.



Corpora, quæ tanquam sa- ^{Corpora}
 na nostros incurrunt in ^{ra a-}
 oculos, & summa nihil- ^{spectu}
 ominus cautione egent, ne inopi- ^{sana}
 nato diem suum obeant, tripliciter ^{triplici-}
 considerari possunt; primo cum ni- ^{citer}
 mia plethora, seu cum athletico ^{expen-}
 habitu; secundo cum nimia obesi- ^{duntur.}
 tate, & corpulentia; tertio cum ni-
 mia animi imbecillitate.

II. Primo corpora athletica,
 cum ad summum bonitatis deuen-
 rint, iuxta (a) Hippocr. effatum, ^{(a) p.}
 statim soluenda sunt, celeri adhi- ^{aph. 3.}
 bita phlebotomia, diætâ, vini ab- ^{Athle-}
 stinencia, atque corporis exercita- ^{tica}
 tione. ^{quomo-}
^{do præ-}
^{seruen-}
^{tur.}

His quando imperanda exercitatio. tione. Etenim athletæ (v̄t Pliniũs aiebat de Luna, quæ orbe pleno repente per eclypsim est nulla) propter nimiam partium foris, intusque canales plenitudinem, repentina interdum morte eclypsantur; ac proinde sola iuuantur diminutione quantitatis sanguinis, ac subtractione molis, qualitatisque alimentorum, & potuum, vt hac ratione, si quid reliquum extremis vasis hæret impactum, motu corporis dissoluatur, remisceatur, atque, in gyrum actum, maiori denique parte transpiret. Neque porro apud istos exercitatio procuranda est, prius quam vasa depleta sint, & diminutum alimentum, ne illud idem, quod in præcautionis auxilium inducitur, improuisam mortem disruptione vasorum accelleret.

III. Sed omnis certe prophylaxis hisce in corporibus inutilis euadet, nisi altior quædam plethoræ radix optime cognoscatur, & pa-
 rumper

rumper debilitetur. Hæc autem *Stomachus validus*
 illa est, qua sani homines tantope-
 re gaudent, stomachi nimirum va-*morbo-*
 liditas; unde non levis apud eos-*se ple-*
 dem peccandi in ratione victus fi-*thora*
 ducia, atque incitatio proficiscitur. *fomes.*
 Ii enim cibos non modo nimios,
 sed absque vlllo delectu ingerunt,
 citoque in chylum conuersos intra
 sanguifera transducunt. Sed, cum
 non æquali proportionem transpi-
 rent, necesse est, vt illorum vasa
 impleantur, dissilitura plerumque,
 cum plus æquo distracta fuerint.
 Sciant igitur qui bono, validoque
 sunt stomacho præsertim si, extra
 adolescentiam positi, studiis incum-
 bant, hostem intra se gerere, qui,
 nisi accurate cauerint, improuisæ
 morti causam aliquando præbebit.
 Etenim ii, quoties se motibus non *Ab ex-*
 exercent, (hoc autem diligenter no-*ercitio,*
 tandum) modico egent cibo, tan-*Et atate*
 to scilicet, quanto duntaxat opus *cibi in-*
 est ad reparanda fluidorum dispen-*digen-*
 dia, quæ non multa impenduntur *tia de-*
finien-
da.

*Qua-
nam
partes,
& cur
minus
perspi-
rent in
sessilem
vitam
ducen-
tibus.*

in illorum transpiratu solidorum, quæ motui aëris, sanguinis, & liquidi neruorum tantummodo inseruiunt: minimum enim est, quod a pene quiescentibus istorum artuum musculis, & succutaneo organo insensibiliter perspirat.

*(a) In
sua sta-
tica
sect. 3.
aph. 35.
Salu-
berri-
mum
Sancto-
rii
præce-
ptum.*

IV. Neque vero in alimentorum, potuumque genere vlla unquam securior, pro tuenda valetudine, inueniri potest via, quam quæ indicatur a (a) Sanctorio, & sequenti aphorismo perstringitur. *Illi cibi quantitas est saluberrima, dum a cibo corpus suis negociis eadem agilitate vacat, ac si esset ieiunum.* Hoc autem consilium opportunum est non pro solis plethoricis, sed pro alio quouis habitu, qui sanus, atque incolumis seruari cupiat. Falso propterea homines de natura sua vulgo queruntur, quod ventriculi languore, atque imbecillitate afficiantur. Iis enim ipsemet morbus tum peccandi, tum sese interficiendi facultatem adimit; cum, si semel horum

*Debili-
ores sto-
macho
cur ple-
runque
longant*

horum quis cibo, siue prauo, siue copiosiori, vsus fuerit, statim erroris admoneatur. Hinc stomacho debiliores plerumque euadunt longæui. Vt præ cæteris insigne, ac vulgatum habemus exemplum in celeberrimo^(a) Ludou. Cornaro, qui solius adminiculo sobrietatis prospera valetudine vixit ultra sæculum. Verum longius fortasse progredimur, fallente nos cupiditate plethoricos habitus præseruandi.

(a) In
eius
vita a
semet-
ipso
descri-
pta.

V. Deinde, obesa nimium, & pingua corpora a repentino mortis periculo tuentur primo ea omnia, quæ tollunt plenitudinem lymphatico-pinguem viscerum, vasorum, & carniū; cuiusmodi sunt epicraticæ purgationes cum pillul. tartar. aloëticis, de ammoniaco, & similibus; secundo, quæ benigne dissolunt residuam mucosam, viscidulamque fluidorum partem, eamque potissimum per vrinam deriuant; nimirum terebenthinata, oximel. scil. acidulæ etiam aluminosæ;

Epicra-
tica
purga-
tio
quam
pleni-
tudi-
nem
adi-
mat.

Plura
Obesis
proficua
reme-
dia.
 (a)cas.
 med.
 lib. 6.
 cas. 3.

dummodo tamen homo ætate sit viginti, ac iuuenili, quem in sensum accipiendus est (a) Timæus, cum in obeso nimium corpore huiusmodi aquam proficua obseruauit; tertio parca victus ratio, quæ partem detrahat ciborum præfertim humidorum, eisque substituat mediocriter exsiccantia, atque aromatica; quarto ea, quæ ab ipsis carnibus perpetuo demulcent ichores viscidulos, vt frictiones, & fonticuli; tandem accurata, & nunquam intermissa corporis exercitatio, per quam fibræ musculares supra vasa, & supra glandulas valide nitentes, humores vrgent, minuunt, volatilizant, aptosque reddunt ad diuresim, ac diaphoresim, quæ quidem sunt viæ, per quas sanis in corporibus ea recrementa secedunt, quibus collectis, præcoces morbi, mortesque sæpe accersuntur.

VI. Denique illi homines, qui quantumuis corpore sani videantur,

tur, animo tamen ægrotant, cuius-
modi sunt extra modum timidi, ac
pulsillanimes, saluberrimum præ-
cautionis consilium inuenient, si
ipsi se, & alii illos tueantur a subi-
tis, atque improuisis gaudii, aut ti-
moris occasionibus. Etenim cum
huiusmodi corpora sortita sint ce-
rebri, & præcordiorum fibras cum
tono minime resistenti, seu maxi-
me languido, idcirco prudenter
fugere debent ea omnia pathema-
ta, quæ improuisam, validamque
in cerebro excitant ideam lætitiæ,
vel timoris, propter quam alteran-
tur diametri vasorum, perturbatur
motus sanguinis, nec non rithmus
vndarum fluidi animalis per ner-
uos, præsertim in præcordia; ac
proinde subuertitur motus cordis,
& totius sanguinis non sine eui-
denti discrimine integræ dissoluti-
onis ipsius vitæ, quæ cum peren-
ni, ac regulari motu istorum præ-
cipue fluidorum per corpus circum-
agitur.

*Timidi
quomo-
do præ-
cauen-
di.*

*De methodo præseruandi a subitaneo
interitu corpora valetudinaria.*

CAPVT XXIII.

NON arbitror in id mihi studium incumbendum, vt sub isto capite exponam singulas præseruandi rationes, petitas ab omnibus singillatim, morbis, qui ægros in subitas neces possunt adducere, immensam enim ac pene infinitam rem imprudens tentarem: cum quilibet Medicus ex particulari vniuscuiusque morbi pathologia, ac therapeia (vt cap. xxi. innuimus) methodum, ac remedia præseruatiua ex se ipso copiose ducere valeat. Quæ enim factum iam morbum tollunt, plerumque antefacta prohibent. Dicemus itaque breuiter, ac veluti per genera, vt, signatis quibusdam quasi sedibus, Practicorum memoriam inuemus.

*Ex va-
letudi-
nariis*

II. Et quidem, vt hic etiam loci congruum ordinem sequamur,
con-

considerabimus ex huiusmodi valetudinariis corporibus alia ^{alii}interius, ^{interi-}us, ^{alii}alia exterius agrotare, iuxta quam ^{exteri-}diuisionem prophylacticas medelas ^{us agro-}apertius inueniemus. ^{tant.}

III. Inchoantes vero ab internis morbis, quanquam isti variis modis inuicem permisceantur; immo raro malum vllum sine complicatione prorogetur; attamen quo clarius, ac firmitus medelarum notiones Curantium animis hæreant, operæ pretium censemus in re præsentī generales tum ipsarum ægritudinum, cum remediorum ideas omnino distinctas tradere, quas Medicus pro sua deinde prudentia in particularibus casibus facile componet.

IV. Præternaturales affectiones ^{Triplex}partium maioris vsus, quæ homi- ^{affecti-}nes valetudinarios detinent, tan- ^{onum}demque repente possunt occidere, ^{genus}ad tria præsertim genera reducun- ^{valetu-}tur; primo ad lentas corrosiones; ^{dinari-}secundo ad pertinaces conuulsio- ^{os ad}nes; ^{subitum} ^{interi-} ^{tum di-} ^{ponit.}

nes; tertio ad congestiones. De singulis seorsim agemus, etiamsi corrosio spasmus, spasmus congestionem, & e contrario, vel perturbato ordine, singulæ singulas inducant.

Pri.

num est
Inter-
orum
sangu-
fero-
rum
lenta
corro-
sio.

V. Lenta corrosio internorum sanguiferorum, siue aneurysma sit, siue varix, vtpote frequens causa inopinatæ mortis, merito omnium prima se nobis offert perpendenda: vtra enim sit, cum alicubi integrum tollit membranarum repagulum, illico transuersam, deterri- mamque sanguini viam intra caui- tates aperit, morteque perimit im- prouisa.

(a) Lib.
I. de
uorb.
n. 10.
Vari-
ces pro
aneu-
rysmat-
ibus

VI. At vero, vt plura simul complectamur, illud, præ omni- bus, hisce in casibus valere cense- mus, quod proponit (a) Hipp. in pe- ctoris, ac pulmonum varicibus, qua- rum sub nomine aneurysmata com- prehendere videtur; inquit sane. *His confert, si circa exordia curandos susceperis, vt manuum venæ relaxen- tur,*

tur, & victus ratione vtatur, ex qua accipit
 siccissimus, & maxime exanguis eua- Hipp.
 dat. Neque certe diuturna praxis Horum
 vllam tutiorem præseruandi me- prophy-
 thodum nos edocuit, quam si hu- laxia ex
 iusmodi ægri, post parcas inter eodem.
 initia phlebotomias, in viuendo
 sint continentes, abstinentesque.
 Plures idcirco nouimus religiosos Autho-
 Viros, qui præcordiorum aneurys- ris ex-
 matibus correpti (a) (vt superius ob- empla.
 scure indicauimus) propter accura- (a)Cap.
 tum vitæ regimen ad vltimum vs- 19.n.4.
 que senium peruenerunt, ac non- Sobrie-
 nisi ex lenta tabe, vel hydrope tas, &
 paulatim decesserunt. Contra ve- mode-
 ro quotquot istiusmodi mali gene- ratum
 re diuexati, genio, & gulæ indul- exerci-
 serunt, vel immoderatis motibus tium
 corpus exercuerunt, omnes repen- iisdem
 tina morte ad sepulcrum festinasse prodest.
 recordamur.

VII. Nostris porro experimen- Experi-
 tis ratio non dubia suffragatur. Et- menta
 enim is, qui varietate vtitur, ac ratione
 multitudine ciborum, potuumque, compro-
 bantur.

(a) De
Fract.
n.29.

neceſſe eſt, vt multum inde ſanguinem, variis etiam acredine pollentibus particulis refertum, ingerat. Is pariter, qui vehementibus tam aëris, quam exercitationum motibus ſeſe obiicit (quoniam ſolida contra fluida, & viciffim fluida contra ſolida maiori niſu impellit, & vrget) neceſſario inceptam iam vaſorum corroſionem, ac diſtractionem promptius auget, ac perrumpit, quam qui recta vtitur, ac moderatiſſima ratione ſex rerum non-naturalium, & præſertim diætæ, quam tantopere laudat (a) Hipp. in vlceribus. Euidens fane, ſi ab animalibus etiam diſcedamus, exemplum præbent flumina, quæ, licet ripam pluribus locis perruptam habeant, tamen extra illam non diffluunt, neque in vicinos campos euagantur, niſi cum noua, magna-que accedat recentium aquarum copia, vel aduerſus ventus profluentibus vndis vehementiſſime obſiſtat, ac renitatur.

VIII. Quod de solis sanguineis vasis hucusque protulimus, ad lymphaticorum quoque texturam debilitatam referri posse non dubitamus. Etenim, si huiusmodi lymphaticorum vitium, in præcordiis, vel cerebro existens, teneat hominem, qui modicum cibum, & parcio-
 rem potum vna cum benignis vulnerariis vsurpet, is plerumque consenes-
 cit, ac lente quoque cum ipsa vasorum ægritudine commo-
 ritur. Contra vero, si homo iste helluo fuerit, & bibax, magna oc-
 cyssimaque suborta feri intra ven-
 tres effusione, aliis etiam concu-
 rentibus causis, interdum occidit
 inopinato.

*Quo-
modo
lymph-
tica in
præcor-
diis vel
cerebro
debili-
tata, ne
breui
disrum-
pantur,
præca-
uenda.*

IX. Pauca nunc addenda puta-
 mus de vulnerariis decoctionibus,
 quæ, cum satis superque apud Me-
 dicos innotescant, longo sermone
 non indigent. Dicemus duntaxat,
 illas, si temperatæ, nec admodum
 resinosæ fuerint, acre, quod in flui-
 dis dominatur, facile absumere, ta-
 lem.

*Ex Vul-
nerariis
decocti-
onibus
quales*

*ad hunc
reuo-
canda.*

lemque sanguini crasim conciliare posse, per quam fibræ discissæ, aut plane coalescunt, aut saltem ab ulteriori plerumque vindicantur erosione. Quinimo quoties impendit periculum effluxuri e vasis magna copia sanguinis, ad fauciatorum, ut aiunt, anchoram erit confugiendum, scilicet ad opium vstum, ad fungum melitensem, ad medicamenta ex vitriolo præparata, aliaque huius generis, quæ, & sanguinis impetum, & vasorum laxitatem coercendo, futuram ex nimia hæmorrhagia improvísam mortem saltem suspendunt.

X. Rationem deinde præservandi a subita nece illos homines, qui pertinacibus convulsionibus detinentur, (quam secundo loco tradendam posuimus) nemo proxime attingere, multo minus complecti poterit, nisi prius loca, & causas convulsionum accurate distinguat. Etenim, si spasmodicæ passiones fuerint in stomacho, hypochond-

pochondriis, vel vtero, pendeant- *Ratio*
 que a succis ad subtile, & sulphu- *præfer-*
 reum acre exaltatis, eo in casu con- *uandi*
 ducunt aquea, subacida, emplasti- *in spaf-*
 ca, balnea, duciæ, serum, & lac. *mis a*
 Quinimo ad antidota etiam recur- *mate-*
 rendum erit, vbi venenorum sit *ria sub-*
 metus; quemadmodum, si dolores *tili pro-*
 vrgeant, ad moderata quoque nar- *ductis.*
 cotica, sulphur vitrioli, ens vene-
 ris, aut bezoarticum iouiale. Si *Ex ma-*
 vero viscidulum sit fermentum, sed *teria*
 absque suppuratione, tunc oleosa *viscida*
 cum fluidis, martialia, amara myr- *aliter*
 rhata, & præsertim rhabarbarum, *tra-*
 & cortex peruianus, cum speci- *standi.*
 ficis anthystericis, & antispasmodi-
 cis, mire conferunt; eoque magis
 si vermes in discriminis causam ve-
 nire cognoscantur; quo in casu et-
 iam ad mercurialia tuto deuenie-
 mus.

XI. Si conuulsiones obseruen- *In pe-*
 tur in pectore, videndum, vtrum *toris*
 in pulmonibus, an etiam in corde, *conuulsi*
 & magnis vasis; & tunc maxime *onibus*
 ad *pars*
 ad *affecteda*

diligen- ter per- quiren- da. ad causas respicere oportebit, & potissimum cognoscere, vtrum de sepulto tuberculo, vel aneurysmate sit dubitandum, ad quorum malorum discrimina prophylaxis quoque erit dirigenda. Porro, si solitarius fuerit, aut cum simplici lymphæ congestione thoracis spasmus, tunc vsurpanda erunt, iudicio Curantis, oleosa, sulphurata, terebinthinata, succinata, camphorata, emulsiones, aliaque multi generis aquea, & diluta. Si, præter spasmodicas contractiones, dolores, & febres vrgeant, laudantur iuxta doloris gradum, ægrique vires, etiam phlebotomiæ, & mitissima pæregorica, de quibus prudens, ac sciens Medicus opportune decerneret.

His phlebotomia quando conueniat.

Cardiaca præscriben- di ratio. XII. In reliquis, vbi malum hæret præcordiis, & erosionis metus longissime fuerit, identidem sunt præscribenda cardiaca atque etiam, si opus fuerit, quæ ex stibio, vipera, mumia, & myrrha conflantur. XIII.

XIII. Deinde si conuulsiones existant epilepticæ, vel ad epilepticam indolem tendentes, perpendendum erit, num affectio sympathica sit, ex inferiorum scilicet viscerum, totiusque corporis consensu, an idiopathica ex peculiari cerebri passione. Etenim iuxta hanc diuisionem præseruatorias curationes inter se admodum diuersas instituemus. Siquidem, si fuerit *Sympathica* vitio stomachi, & succorum intestinalium, omni alio pharmaco *epilepsie* melior est vomitio, & alui deiectionio, per epicrasim instituta. Hinc *emeticus* passim Romæ occurrunt multi, qui, *& epicratica* licet scotomiis, aliisque capitis affectionibus, fortes apoplexias, subitasque neces minitantibus, iamdiu *purgatio proficua.* tentati fuerint, senes adhuc decrepiti, ope Pill. de Succin. Craton. *Hac Romæ præsertim ab apoplexia* de spuma chalybis, vel alterius benigni soluentis, identidem intra *præseruat.* annum repetitorum, seruantur incolumes.

XIV. Si vero huiusmodi affectiones

Phlebotomia quando celebranda. ones a recurrente vasorum sanguineorum plenitudine, aut suppressis hæmorrhagiis dependeant, tunc phlebotomiæ interdum instituendæ, ac fonticuli etiam admouendi erunt.

In epilepsia idiopathica abstinentia a stimulis nomagnum remedium. XV. Quod si tandem eadem mala, ob inductam in cerebro labem, idiopathica etiam euaserint, nullo certius remedio extra limites inferendæ subitæ mortis contineri possunt, quam, si æger abstemius sponte factus, specifica antepileptica, ac laudabile vitæ regimen perpetuo adhibuerit. Nec meditata solum, sed diu etiam experta in præsens referimus; quibus sane observationibus ipsius quoq; (a) Hipocratis consilium accedit; is enim agens de insomniis, comitiales morbum, aut insaniam significantibus, monet, ut ægri cibis paucis utantur; ita namque integram valetudinem sibi tota vita comparabunt.

In congestionibus XVI. Denique circa congestiones nonnulla breuiter differemus; cæ

ex namque, cum nimio, varioque ^{curan-}
inter se discriminentur interuallo, ^{dis Me-}
Medentium ingenia, vſu firmata, ^{dicus ſit}
ad capiendum conſilium in arena
duntaxat mouere poſſunt. Prudens
itaque Medicus in horum morbo-
rum curatione ita ſe exerceat iux-
ta (a) Hippocratis oraculum, *ut pro-* ^{(a) I.}
ſit, aut non noceat. ^{epid.}
^{ſect. 2.}

XVII. Cum vero congeſtiones
modo imo in ventre, modo me-
dio, modo in capite fieri contin-
gat; nunc ab humoribus lentis, &
crassis, nunc a ſalinis, & acribus,
nunc demum a mixtis, & ſulphu-
reis, ſiue cum ſuppuratione, ſiue ſi-
ne ea; equidem arbitror ſummo
Curantium iudicio, atque experi-
mento opus eſſe, vt hiſce in caſi-
bus recta præſeruandi ratio institu-
atur. Illud ſolummodo in genere ^{iuxta}
admonemus, ſcilicet vbi viſcidum, ^{conge-}
ac ſalinum phlegma in aliquo ven- ^{ſta ma-}
tre peccauerit, conducere rhabar- ^{teriei}
barata, aloetica, chalybeata, ſtibia- ^{indolem}
^{propby-}
^{laxis}
^{diri-}
^{ta, genda-}

ta, potum The, vel Coffe, therebinthinata, aliaque gummofa, tenacitatem foluentia: vbi falinum, & acre, iuuare aquea, succos herbarum epiceraufticarum, diluta, lactiginofa, oleofa, & alcalica, partim fixa, vt ftibium diaph. partim benigne volatilia; vbi tandem vitium eft in sulphureis, mixtisque principiis, mixta remedia vtilia fore, præfertim fi de occulta dubitetur fuppuratione, quo in cafu, poft phlebotomiam, initio morbi, fi res poftulat, institutam, ea vfurpanda, quæ pus, ac faniem dulcificare, quæ fphacelum arcere, quæ demum rupto abfceffu, vlcus abftergere, & consolidare valent. Eligat itaque peritus Medicus ex omnibus optima, & vnicuique adhibeat in re tunc præfenti, quæ magis congru-

(a) Lib. unt, illius apud (a) Celfum confilii
 2. c. 17. perpetuo memor, nempe: *nulla re
 Oppor- magis laborantem iuuari, quam tem-
 tunum pestiua abftinentia, femper quærentes
 Celfi non quid Medico liceat, fed quid agro
 confili-
 um. salu-*

salutare sit, cui uehementer nocet, quoties in eius, quod assumitur, vel tempore, vel modo, vel genere peccatur.

XVIII. Sed, stante ea diuisione, quam circa initia huius capitis posuimus, superest, vt agamus etiam de methodo prophylactica dirigenda ad homines externis morbis valetudinarios. Cum vero certum sit apud ista corpora idcirco factam, tectamque internorum viscerum texturam seruari, quia prauis humores ad artus cum podagra, aut quouis tumore, vel ad superficiem corporis cum vlcere, fistula, scabie, vel alio morbo decumbunt; profecto vniuersa ratio præservationis a subitis malis, subitas neces inferre valentibus, versari videtur circa auxilia, quæ primo seruare possunt firmum, validumque fibrosum rete internorum viscerum, & vasorum, vnaque simul congruam fluxilitatem, dulcedinem, & crasim liquidis conciliare; vnde quidquid intus redundat

Externi morbi diuturni valetudinariis potissimum vitales, & cur.

Quomodo tractandi ne subito periant.

incongruum, atque impermiscibile, excitato confestim stimulo, foras vtiliter propellatur, ac veluti despumetur; deinde, quæ simul tollere valent in affectis externis locis ea impedimenta, quæ aliquando obiici possunt ipsis salutaribus fluidorum propulsionibus, remoris, ac secretionibus.

Methodus generalis præservativa.

XIX. In genere itaque iuuabunt alimenta optimi succi, iura interdum viperata, serum cum infusione rad. chinæ, & alia eiusmodi, quæ robur solidis partibus, benignamque volatilitatem, ac fluxilitatem humoribus tribuunt; simulque ea omnia, quæ partes externas ita tuentur, ac disponunt, ut nullo callo, nullaue, etsi minima, constipatione laborent, per quam internis visibus renitantur. Nunc ad Artis Magistros, non ad solos Candidatos scribimus; ea propter non pudet brevia tantum medendi monstrare compendia. Illud tamen docuisse nunquam satis con-

ten-

tenti erimus, frustra nempe præser- Diatæ
cæteris
remedi-
is præ-
stanti-
or.
uandi rationes a subito interitu il-
lum foris quærere ex medicamini-
bus, qui domi spreuerit diætam.

Cætera Medicinæ præsidia inter-
dum fallunt, vnum nullo vnquam
tempore fefellisse comperimus, re-
ctum scilicet vitæ regimen, ac tran-
quillum, infractumque in bene, vel
male valentibus animum: iis enim
duobus veluti axibus vniuersus fere
præseruationis orbis a subitanea
morte circumagitur. Neque pro-
fecto hac super re decipi nos pati-
tur Diuinum illud monitum apud
(a) Marcum, vbi Christus Discipu- (a)c.21.
los admonet, vt sobrie viuant, & a
grauibus temperent Mundi curis,
ne subitis mortibus causas exhibe- Recto
viuendi
ant. *Attendite vobis, ne forte gra-* regimi-
ni ani-
morum
uentur corda vestra in crapula, &
ebrietate, & curis huius vitæ, & su- tran-
perueniat in vos repentina illa dies: quilli-
tanquam laqueus enim superueniet in tas iun-
omnes, qui sedent super faciem omnis genda,
terre. Sileat igitur Medicus, vbi ex diui-
no et-
iam O-
raculo.

Deus ipse loquitur; & quidem sine
parabolis certiores prophylaxis ra-
tiones nos edocet, quas certe an-
nua calamitate docti, vt mox vi-
debimus, viua deinceps me-
moriam retinere debe-
bimus.

Finis Primi Libri.

DE SVBITANEIS MORTIBVS

In particulari
LIBER SECVNDVS.

DE SVBITANEIS MORTIBVS

ILLARVM QVE CAVSIS

Quæ decursu annorum 1705.
& 1706.

ROMÆ CONTIGERVNT

LIBER SECVNDVS.



*Quoniam Libro præcedenti
quæsitum est in genere quid
subita mors? quales sint
eius causa? quæ etiam sî-
gna, quæque ad illam a-
uertendam remedia, vt vi-
res nostræ tulerunt, ostendimus. Iam
hinc superest, vt secundo Libro agamus in
particulari de iis subitaneis interitibus, qui
Romæ per hæc tempora crudeliter desævie-
runt; daturi etiam exempla tum subita-
rum ægritudinum, quæ vagabantur, tum*

non-

nonnullorum , qui eisdem correpti vel eua-
 serint , vel decesserint. Admonentes in-
 terea , vt ad memoriam reuocentur ea,
 que in limine prioris Libri Benigno Le-
 ctori proposuimus circa rationem , propter
 quam de Subitaneis Mortibus scribere de-
 creuimus.

*Queritur, an causa repentinarum
mortium, quæ Romæ per hæc tempora
grassata sunt, fuerit vniuersalis,
& simplex, an vero particu-
laris, & mixta.*

C A P V T I.



Acturi nunc de mor-
tibus, quibus hoc
anno tot Romani
Ciues, atque Inco-
læ repente sublati
sunt; inuestigabi-
mus primo loco, communisne, an
particularis earundem causa latue-
rit in singulis.

*Mors
repen-
tina
quan-
doque
grassat-
ur in
homi-
nes &
bruta
ex cau-
sis vni-
uersa-
libus*

II. Nos minime fugit, libiti-
nam certis annis, annorumue tem-
pestatibus, non modo in homini-
bus, ex pestilenti aëris constitutio-
ne proficiscentem, sed vel in bru-
tis animalibus, pecudibus nempe,
capris, aliisque ex certa aëris labe,
vel aquarum, & pascuorum defe-
ctu, vitioque natam, improuiso de-
bac-

bacchari. Vnde aureis versibus ce-
cinit (a) Fracastorius noster.

(a) In
siphil.

*Interdum pœnas animalia sola dedere,
Aut multa, aut certa ex ipsis: me-
mini ipse malignam
Luxuriam vidisse anni, multoque
madentem.*

*Autumnus, perflatum austro, quo
protinus omne*

*Caprigenum pecus e cunctis ani-
mantibus vnum*

Corruit:

III. In nostra tamen hypothesi
probabilius ducimus, causam im-
prouisarum mortium non vnâ
omnibus absolute communem, sed
singulis morientibus maiori ex par-
te propriam extitisse. Quod sane,
tametsi præ me ratiocinando ex si-
gnis facile fuerim affecutus; tum
vero mihi tandem placui, cum in-
ternum animi sensum externo ipsi-
us rei testimonio, atque certa ex-
perimentorum fide comprobatum
intellexi. Ex sequentibus enim
apparebit, peculiare, suasque
præ-

Repen-
tine
mortis
Romæ
nunc
gras-
santis
causa
non fuit
vniuers-
salis;
sed cui-
cumq;
mori-
enti
parti-
cularis,
& pro-
pria.

(a) I. de
diar.
n. 3.

præcipuas cuique causas, seu immaturæ dissolutionis, vt ita dicam, semina paulatim genita : denique confestim ad actum fuisse reuocata, iuxta illud (a) Hippocratis, *non enim repente morbi hominibus accidunt, sed, paulatim collecti, aceruatim apparent.*

Huius
discriminis
causa
non fuit
vbi
tabaci.
Non ex-
halatio-
nes ex
terra-
moti-
bus.
Non
Chocolata.

IV. Quid enim tabacum incubabimus; cum nonnulli, quorum nares nunquam puluis iste inquinauerat, ex tempore viderint occisum? Quid veneficas ex terræ motibus exhalationes; cum ii præcipue a subitaneis tum morbis, tum mortibus se feliciter vindicauerint, qui diruta ex soli conuulsionibus loca potissimum incoluerunt? Quid chocolatæ abusum; cum qui a triginta iam annis nunquam non semel, sæpe bis in die (quos inter Cl. D. Placentius Med. Urbis Senior, & octogenario maior, vt & ipse ego, cætera cauti, numeramur) hoc potu vsi sunt, nullo, vel minimo per hæc tempora symptomate laborauerint.

uerint. Contra inter eos, qui nunquam illam degustarunt, multi subito interierunt? Quid tandem *Neque Beneficis aëris.* ignotum aëris venenum culpabimus; cum extispicia varias, notissimasque causas rerum naturam diligenter quærentibus apertissime detexerint?

V. Firmant vero sententiam de *Autho- ris ex- peri- menta de cau- sa par- ticulari in sin- gulis mori- entibus.* particulari in singulis causarum concursu præteriti etiam euentus illorum, quos vitam cum impro- uisa morte commutasse nouimus, priusquam a SUMMO PONTIFI- CE imperatum nobis fuisset, ut ana- tomico cultro sepulta veritas erue- retur. Etenim nonnulli sublati fuerunt cum indicîis subito disrup- ti sanguiferi canalis, quem iam varix, aut aneurysma intra thora- cem, vel abdomen debilitauerat. Multi per fortissimam apoplexiam, ob interceptum, effusumque san- guinem intra cerebrum. Alii de- mum ex magno, ac pertinaci præ- cordiorum spasmo, aut paralyti, vel ex

ex obstructione viarum cordis, magnorumque vasorum; unde, impedita sanguinis traiectione a corde tum in pulmones, cum in cerebrum, vitale illud, ac reciprocum istorum viscerum commercium ex tempore interciderit. Hoc vero perpetuo est obseruatum, vltimum nempe diem repente a nemine, quod sciam, visum fuisse, qui labe aliqua fluidorum, viscerum, aut saltem carnalium a multo tempore non laborauerit, quique simul non fuerit stationarius miles in castris Bacchi, aut Veneris. Quibus fit, vt ipse crediderim, repentinos hosce casus non sanorum plerumque mortes, sed quandam veluti humanæ naturæ despumationem, seu malam crisim extitisse apud illos, qui iamdiu palam, vel secreto, infirma, atque ægra valetudine fuerunt: crisis enim apud theoricos definitur, subita mutatio in morbis ad salutem, vel ad mortem.

*Nemo
nisi ba-
letudi-
narius,
& in-
tempe-
rans
repente
periit.*

*Subita
mors
in iis ad
malam
crisim
refe-
renda.*

Demonstratur, inaequalem aëris constitutionem fuisse etiam inter causas vagantium repentinarum mortium.

CAPUT II.

Icet dubitationi non sit locus, quin celeres interitus, Romæ hoc præsertim tempore contingentes, magna ex parte prædispositis vitio aliquo corporibus debeantur: negare tamen non ausim vniuersalem aliquem cœlestium, terrestriumque causarum concursum ad hunc producendum effectum conuenire potuisse, sine quo forsitan, nec adeo numerola, nec adeo subita morientium clades contigisset. Hic autem concursus, (Constitutiones aëris quomodo subitam mortem sollicitauerint. ut mea fert opinio, acceptus potissimum referendus esse videtur præteritarum indoli tempestatum, quas nemo, vel lippus, non vidit excessu quodam intemperierum insidias ægris iam corporibus facile parauisse. Præcessit enim æstas feruida,

da, atque admodum sicca; deinceps Autumnus, austro plerumque comitante, pluuiosus; tandem hyems viguit inæqualiter borealis, & australis. Vnde nil mirum, si tum solida fuerint eneruata, tum sales acres, partesque sulphureæ a præferuida elapsi anni æstate (balsamico-oleosa, aquosaque, & dulcia sanguinis componentia plus iusto dissipante) intra Romanorum corpora prædominium acceperint; indeque propter novos motus, & aculeos, periculum valetudinariis struxerint improuisum. Nihil enim tam prompte subitanæ mortem solet inferre, quam si momentum impetus, adauctum in fluidis, debilitatam alicubi resistantiam solidarum partium maioris vsus constanter urgeat, superetque.

*Impetus
liquidi
auctus
intra
solidum
minus
resistens
sape fumestis-
simus.*

(a) De
morb.
sacr.
n. 15.

II. Quæ autem, & quot sint mala, quæ nobis obueniunt ex austro, & aquilone, clare, ac sapienter edixit (a) Hippocrates per hæc verba. *Cerebrum ab austris quidem solui, &*

hu-

bumectari, & venas laxiores reddi. Auster
Ab Aquilonis vero flatibus, quod sanis- & A-
simum est in cerebro, compingi, quod quilo
vero morbosissimum, ac humidissimum noxii
est, excerni, & forinsecus circum- ex
alluere. Hipp.

III. Cum vero, experiamur fermentatiuas particulas, ex Africa per austrum aduectas, deteriores reddi exoticorum quorundam miscella principiorum, quæ ex Roma *Roma*
 no solo passim eleuantur; exinde *Auster*
 facile est causam inuenire, cur mul- *deterior.*
 tigeni, intra prædisposita ciuium corpora collecti, erodentes humores, certo quodam tempore delitescere, sensimque vires, per aëris pabula captare potuerint; vt denique, accedente nouissima quacunque causa, necem subito intulerint, inducta post nouum, extraneumque motum, sanguinis plerumque *Sanguinis coagulationem*
 coagulatione, quam serositatum *serositatum*
 defluxio, atque exundatio consequitur, & de qua, coacti exemplo lactis, egregie idem locutus *exundantia*
 M est

confe-
quitur.
Hipp. de
lacte
coactio
exem-
plum.
(a) 4.
De
morb.
n. 26.

est (a) Hippocrates , cum modum exponit , quo ea operantur , quæ ex cœlo nobis obueniunt , si ad ea , quæ in corpore genita sunt , corrigenda inepta fiant. Sales enim acres , ab autumnii pluuiis in fluorem nostris in corporibus euecti , nunc per aquilonares ventos perspirare impediuntur , nunc vero ab austro vltcrius fusi , transuersim aguntur.

IV. Interim , si cupis modum , qua aër extraneis , atque humanæ naturæ infensis particulis imbuitur , & quomodo interdum per ventos huc illucque transferatur , plene id habebis a (b) Franc. de la Boe Syllu.

(b) In
ap-
pend.
ad
prax.
tract.
IO. n.
124. &
seq.

*Adducuntur quadam argumenta ad
confirmandum non ex vniuersali solum
causa tot hominum discrimina Roma
contigisse, sed ob morbosas eorum-
dem corporum dispositiones, ac
potissimum intemperan-
tiam.*

CAPVT III.

TRia hic obseruatione digna
ulterius occurrunt, quæ ve-
ris, obscurisque detegen-
dis subitaneorum interituum huius
anni causis nouam lucem afferre
possunt. Primum illud esse vide-
tur, quod nemo forte Nobilium,
aut eorum, qui frugi vita vtuntur,
vtcumque subitaneis morbis corre-
ptus, vitam subito deseruerit: cer-
tissimo quidem argumento, non a
solo aëris vitio vagantes Romæ
morbos, mortesque ortum habuif-
se; cum affectus olim apud Leiden-
ses epidemicus, quem tanta sedu-
litate describit (a) Syluius, & cuius
omnem causam ex aëre, tunc plu-

*Nobi-
les, &
tempe-
rati
repen-
tinam
mortem
non su-
bie-
runt.*

(a) Loc.
sup. cit.

Contra rimum a statu naturali recedente,
rium deriuandam putat, prius & grauius
accidit in opulentiores, ac deliciores,
ubi ex ferius, & quodammodo leuius in
causa plebem sauiet.

Eniuer- II. Et quanquam hisce tempori-
sali, te- bus nonnulli ex diuitibus apople-
stante xia tentati fuerint, adhibita tamen
Syluio. oportuna medela, vel ipsi utcum-
Diuites que re-
Et cum- oportuna medela, vel ipsi utcum-
que re- que conualuerunt, vel syderationes
pentinis in paralyses concesserunt. Scilicet
morbis quia illi, qui euchymis cibis nutri-
corrupti untur, qui ab aëris inclementia se-
præ se tueri magis valent, quique tan-
paupe- dem, quoties morborum prodro-
ribus mis pulsantur, statim ad remedia
felicius confugiunt, vel certe cautius dein-
liberati cepti in viuendo se gerunt, talem
sunt, & vitiosorum fluidorum cumulum in
cur. se minime congerunt, qui subitam
 necem afferre possit. Contra ve-
 ro pauperes, quemadmodum facul-
 tate destituuntur deligendi cibum,
 & potum, cæteraque ad valetudi-
 nis tutelam necessaria, ita passim ad
 vulgaria, minusque plerumque sa-
 lubria,

lubria, sunt incontinentiores diu-
tibus; quinimo, quoties alicuius
morbi præludiis tentari incipiunt,
curationes, vel nullas suscipere, vel
propogare solent; idcirco in iis tum
solida, præcordia præsertim, ac ce-
rebrum, sensim labefactantur, tum
fluida ad morbos inferendos, ac
prædictis in partibus manifestandos,
magis exacuuntur.

III. Alterum deinde, quod ac-
curate pariter, diligenterque con-
siderandum venit, versatur circa
sexum, in quem istarum decursu
tempestatum mors furere visa est;
hæc enim, ut contra masculinum
hostiliter agere, ita sequiorem se-
xum fere intactum relinquere con-
suevit; ut vix paucas fœminas subi-
to mortuas ad hunc usque diem
numerare potuerimus. Conditio
fanè morbosæ constitutionis, persi-
milis alteri, quæ Iustiniani tempo-
re obseruata fuit Constantinopolis,
ubi popularis quidam morbus ma-
res magis, quam fœminas absume-

*Letha-
lis hæc
labes
Mares
potius
inuasisit
quam
fœmi-
nas.*

*Apud
Sigoni-
um de
occi-
dent.
imper.
lib. 20.*

*Vnde
hoc.*

bat. An quia mulieres, catamienis repurgatæ, morbificum apparatus ad irritatiuam, ac suffocatiuam plenitudinem colligere, ut plurimum prohibentur? An satius quia foeminæ, etiam plebeia, temperantius vitam plerumque ducentes, minus prauorum succorum solent congerere?

IV. At illud certe ex duabus hisce obseruationibus præcipue constare videtur, continentiores in cibo, potu, ac venere a subitaneis mortibus se huc usque opportune vindicasse; incautos vero, luxuriosos, vinososque improuisis facile mortibus concidisse.

*Non s.
nicum
signo-
rum ge-
nus im-
proviso
morien-
tibus
pra-
iuit.*

V. Postremum sedulo animaduertendum illud sane est, quod morbi, unde subitæ mortes ortæ sunt, non semper iisdem signis, ac symptomatibus stipabantur. Et enim aliquibus, per aliquot ante mortem dies, efflorescentia ad cutem apparuit, qua repulsa fortissima superuenit apoplexia: ut conti-

git in primo casu illorum, quos post
repentinam mortem dissecuimus.
Nonnulli vero, diu ante necem, an-
helitu, palpitatione, vertigine, atque
animi deliquio sæpius correpti mor-
te tandem occubuerunt, vt in V. casu
obseruatum. Vidimus etiam non
paucos, qui, præcurrente thoracis,
totiusque corporis conuulsione,
sublati fuerunt, quorum numero
quartus casus accensendus. Nec
defuerunt qui, ex affectione fere
scorbutica diu valetudinarii degen-
tes, propter improuisam tandem
choleram, subito conciderunt:
quemadmodum accidit cuidam Sa-
cerdoti Societ. Iesu. Denique, vt
paucis concludamus, non eadem
omnibus communia signa mortem
præcesserunt, & comitata sunt: vt
iure merito fateri possimus, libiti-
nam ex peculiari vnius cuiusque
corporis dispositione magna ex par-
te in Romanos grassatam fuisse.
Contra vero fit, cum ex principio

*Si ab
vniuer-
sali*

*eadem
conti-
nuo si-
gna ad
sunt.*

*(a) Loc.
sup. cit.
n. 4. &
seq.*

*(b) in
Siphil,*

ritus in genus aliquod animalium debacchantur ; tunc enim eadem semper indicia, actionumque læsiones, mortem præcurrunt. Hinc legitur apud (a) Syllu. anxietates, nauseam, ac vomitum suos in primis ægros inuasisse, & apud (b) Fracast. de caprigena clade canentem, signa futuræ mortis tussiculam semper præcessisse.

VI. Accedit etiam, morbos, qui elapsis mensibus ad mortem iter fecerunt, nulla contagione in affines, necessarios, aut in cadauerum sectores migrare obseruatos fuisse; indicio sane non obscuro, nullum in iis viguisse virus, per quod de vlllo epidemico, aut pestilenti morbo fuerit metuendum.

VII. Nouum sane non est per interualla, incertis reditibus, hic illic subitaneas mortes ex sporadicis morbis in terris apparere. Et enim non solum Venetiis, sed & Romæ, aliisque Italiæ Ciuitatibus id contigit circa initium præteriti sæculi,

*Plures
Italiæ
Vrbes
hac pe-
ste alias
corre-
ptæ.*

sæculi, ut narrat ^(a) Dom. Tirillus ^(a) De
 in tractatu, quem de hoc eodem ^{caus.}
 argumento illa occasione satis dili- ^{sub.}
 genter conscripsit. Pariter Romæ ^{mort.}
 sub Alexandro VII. cadauera quam- ^{cap. I.}
 plurima repente mortuorum ada-
 perta fuerunt a Ioh. Trullio Chi-
 rurgo Pontificio, qui, fere in o-
 mnibus, vasorum vel intra pectus,
 vel intra cranium rupturas, com-
 periit. Nouimus etiam ante mul-
 tos annos in Hetruria crebro ho-
 mines ex tempore mortuos, quo-
 rum causæ modo in cerebro, mo-
 do in thorace deprehendebantur,
 de quorum sane casibus locutum
 fuisse arbitramur doctissimum Ca-
 rolum ^(b) Fracassati. Ut proinde ^(b) In
 serio quidem de ipsa morte cogita- ^{dissert.}
 re, sed mirari minime debeamus, ^{epist.}
 eandem non raro clanculum, ac ^{de ce-}
 festinanter ad nos venire. ^{reb.}

Numerus morientium in Vrbe forsitan hoc tempore minor extitit, licet maior visus sit, ex quo consueti, & exitiales Romæ morbi nequam vagati sunt.

CAPVT IV.

*Gras-
santi-
bus re-
pentinis
morti-
bus ca-
teri
morbi,
& mor-
tes
Romæ
minus
fre-
quentes.
(a) I.
epid.
const. 3.*

IN admirationem certe nul-
lam peritiores Medici hoc
anno duci deberent ex
paulo frequentiori subito morien-
tium numero in Vrbe, si aduerte-
rint decursu superiorum tempesta-
tum, æstatis nempe, autumnii, atque
hyemis, in quibus crebro repenti-
ni hominum interitus contigerunt,
morbos Romæ consuetos, mali-
gnas nimirum febres, pectoris in-
flammationes, aut prauas dysente-
rias, ex quibus multi solent dece-
dere, rarissime inualuisse; ita vt in
hanc nostram temporis constitutio-
nem illud apte quadrare videatur,
quod (a) Hippocrates ætate sua ob-
seruauit. *Resolutiones*, nimirum,
cœpisse ex syderatione, & quidem mul-

multos ex ipsis subito mortuos fuisse, cum morbus esset satis popularis. Cætera incolumes degebant. Vnde, si subitanæ huius anni mortes, quæ fere solæ contigerunt, conferantur cum vulgaribus mortibus singulorum ex superioribus annis, credimus, hosce interitus longe minores inuentum iri. Quid igitur erit causæ, cur nunc miremur, ploremusque, (animarum excepto periculo) forte non adeo magnum numerum acutissimorum morborum, repente interimentium, cum plures mortes ex aliis, ac potissimum acutis ægritudinibus, elapsis annis, impauidi siccisque oculis spectauerimus? Ille siquidem prauorum humorum apparatus, qui alias ex æstate pluuiæ, ac prauitate fructuum nostris in corporibus paulatim colligi, & vi cuiusdam fermentationis, ac pene putrescentis liquidi, ægros longiori via de medio tollere consuevit; hoc anno in se ipso magis existens;

Ratio
addu-
citur.

(a) De
vet.
Med.

vt (a) Hipp. dicto vtar, promptior ad motum, & potentior hic ad solida irritandum, scindendumque, illic vero ad fluida coagulandum, aut dissoluendum, redditus fuit, proindeque adeo præcipientes mortes valuit inducere. Exinde animos ad spem ereximus, transacto verno æquinoctio currentis anni 1706. per nouam aeris, ac terraquei orbis re-fermentationem, perque ventorum permutationem, morbosum istum particularum concursum, & commixtionem variatum iri: vnde lethalis, ac mortifera constitutio, de sua remitteret sæuitie, Deoque omnium bonorum largitori debitas laudes sospites, hilaresque redderemus. Quod sane præsagium exitu maxime comprobatum nunc cer-nimus, cum opus hoc, in lucem edituri, expolimus. Sed quoniam nullum in terris bonum absque mixtura mali hominibus accidit, inde fit, vt, dum de felici, fausta-que repentinæ cessatione mortium

Cessatis
repen-
tinis

iure

iure gaudemus, & gratulamur, sub
 fœnore beneficium nos accepisse
 præsentiamus. Nunc enim, vel de-
 cursu æstatis, acutas febres, letha-
 lesque peripneumonias sæuire pas-
 sim intuemur, dolemusque.

morti-
 bus con-
 sueti
 morbi,
 & le-
 thales
 recru-
 duere.



*Quæ remedia hoc anno iis maxime
 profuerint, qui a subitaneis mor-
 bis, repentinis mortes minitan-
 tibus euaserunt.*

CAPUT V.



Um satis pateat ex antedi-
 ctis, Nobiles, ac diuites,
 immo, ut postea rescui-
 mus, nonnullos etiam pauperes,
 subitaneis morbis tentatos, hoc an-
 no conualuisse, non dubitamus,
 quin pius, utilisque noster futurus
 sit labor in iis diligenter recen-
 sendis, quibus iidem ex repentinis
 mortibus euaserunt. Ita Medici,
 recurrentibus aliquando consimili-
 bus anni constitutionibus, firmata
 no-

nouis experimentis inuenient præfidia, quorum ministerio ægri vel a morte penitus vindicari, vel saltem tantum temporis lucrari valeant, ut anteactæ crimina vitæ (quod cardo rei est) sacra exomologesi expiare, seque Numini commendare possint.

II. Et quoniam ægri, qui morbi vim superarunt, quantum nobis innotuit, apoplexiis cum epilepticis, vel syncopalibus affectionibus, absque vlla tamen vasorum scissione, aut ruptura, potissimum tentati fuerunt; idcirco rationi consonum ducimus, ea nunc remedia indicare, quæ in hac temporis constitutione plerumque vtiliaprehendimus.

III. Inter ea vero, quæ maxime proficere visa sunt, primas tenuit sanguinis missio ab iis, vel illis venis, iuxta ægrorum vires, consuetudines, aut suppressas euacuationes celebrata, & præsertim in Viris plethoricis, nunc ex brachio, nunc ex pede. Vbi aduertimus in

*Sanguinis missio
suo
varie ad
mini-
strata
est
fuit.*

affe-

affectionibus apoplecticis, cum re-^{Eadem}
 solutione alterius cruris, nos pro-^{in syde-}
 ficuam expertos fuisse venæ se-^{rata}
 ctionem ex syderato talo institu-^{parte}
 tam; fluente enim ex affecto mem-^{profi-}
 bro sanguine (quemadmodum in
 coxendicis doloribus aperta sub eo-
 dem poplite, vel in crure, quam
 ischiadem vocant, vena, feliciter
 contingere obseruamus) facilius, ac
 fortius dimoueri possunt obstacula
 conuulsionum, & obstructionum,
 quæ in vasis læsæ partis spinalis me-
 dullæ, vel cerebri basis pertinaci-
 ter hærent. Quibus autem hæmor-
 rhoides, aut menstrua restitissent,
 iuuat ex pede, atque ex podice.
 Tandem iis, in quos, vel ob pro-
 uectiorem ætatem nulla inferiorum
 venarum sectio cadebat, vel post
 alias phlebotomias contumax ad-
 huc strangulatio arteriarum caro-
 tidum, & sinuum duræ matris per-
 seuerabat, miram opem tulit ape-
 rire venas frontis, nasi, & præser-
 tim iugulares, ex quarum profecto
 sectio-

*Iugula-
res, nasi
&c.
bene
quando
aperi-
ende.* sectione, quanquam sero, & citra
præuias dispositiones tentata, ali-
quam tamen vtilitatem reportauit
Illustrissimus Præsul Rota, qui, cum
acuta feбри, & suffocatiua pulmo-
num plenitudine correptus esset,
indicatæ missioni sanguinis ex cu-
biti flexura (dolente nobiscum D.
D. Bernabeo diligenti eiusdem
Physico) omnino repugnauit: per-
peram enim hac de re astra sibi fa-
miliaria consuluerat: facta postmo-
dum ad cerebrum metastasi, in apo-
plexiam incidit, & cum minus spe-
raretur, vt resiperet, incisa iugula-
ri, statim ad sensuum officia rediit,
& suæ compos mentis multas ho-
ras pro salute animæ consecutus
fuit; licet eadem pulmonum affe-
ctione redeunte, tandem deces-
ferit.

*Quare
stile sit
per hac
fassa
sanguini-
nem
mittere.* IV. Rationes vero, ob quas
phlebotomia venarum frontis, nasi,
ac potissimum iugularium in cali-
dis, & sanguineis cerebri affectio-
nibus iuuare plurimum solet, pe-
tendæ

tendæ forent ex prodromo nostro, quem Antepraxim morborum cerebri inscribimus; ubi solide agimus de peculiari sanguinis itu, redituque per cerebri vasa, ac de sublimi artificio, quo instrumenta respirationis, iuxta indigentias œconomix animalis, augment, vel minuunt impetum, ac proinde motum eiusdem sanguinis, tum propellendi per arterias carotides, quæ non recta, sed obliqua, atque inflexa via cranium perforant, cum reducendi a iugularibus, quæ non sparguntur per cerebri superficiem, sed mediis duræ matris sinubus sanguinem hauriunt. At enim vero, cum hic versemur intra limites propositi thematis, satis erit indicare, prædictas venas, cum per lanceolam scinduntur, affatim illum, vel illi proximum sanguinem profundere, quo intercepto, sinus tument, cerebrum, ac nervi irritantur, ac premuntur; & quo expedite recirculante, cor, & pulmo ultro graventur.

Iugularium incisio cerebri, & præcordiorum levamen.

N uaren-

uarentur. Vnde nil mirum, si, hoc particulari detracto cruore, liberior redditur sanguinis fluxus in cerebro, & præcordiis, ac pro ratione virium causæ morbificæ, atque ægrorum tolerantia, istorum viscerum conuulsiones, ac sanguinis quoque moræ impediuntur.

Sublingualium in aphonis. Etilis.

V. Similiter incisio venarum sublingualium in aphonis, detrahens ex affecta parte sanguinem, ea vasorum tollit impedimenta, quæ nervos, inducta pressione, aut conuulsione, suo priuabant officio.

Bene nutrita corpora feliciorem sanguinis missionem sunt experta; & cur.

VI. Sed, redeundo ad hypothesim, contulit porro mea sententia in constitutione ista repentinorum morborum sanguinis missio, quia ægri, quorum mala inducias pro tentandis remediis Medico præbuerunt, inter illos numerabantur, qui ut plurimum probis alimentis, vino, & chocolata vsi fuerunt. Deinde vero, quia illorum non aspernanda, inter externas, causa fuit præferuida, & sicca æstatis constitutio, qua

qua sales sulphurei, maximeque acres intra optime saginatam sanguinis massam exaltari solent, qui sales, cum solito maiori momento motus quaquauersum per corpus ferantur, minimo negotio intra tendineo-musculares membranas sinuum duræ matris, ac magnorum vasorum cerebri, aut præcordiorum impingunt, easque rigidas faciunt, & crispant; exinde, angustatis sanguiferorum finibus, & caudicibus, libera tollitur, apud huiusmodi viscera, ipsius sanguinis circulatio, quam, vasorum interceptionem, vocauit Hippocrates, qui sane primus hisce in casibus phlebotomiam laudauit. Et quidem huiusmodi affectiones si ruptura vasis caruerint, remittunt misso sanguine, quia nempe scissa vena simul cum ipso cruore, qua data porta, illud effluit acro-volatile, quo detracto, statim eneruatur, ac debilitatur excessus momenti eiusdem sanguinis contra vasa, quæ

*Hippocraticæ
vasorum
interceptionis
modus
exponitur.*

propterea excessu tensionis, & crispaturæ contra sanguinem nitebantur. Insuper, inducto per phlebotomiam nouo in sanguiferis spatio, fluidorum motus, & remixtio liberior redditur, indeque, si quæ alibi vrget canalium conuulsio, vel obstructio, rapiditate introfluentis liquidi remittit, ac cedit.

*Hanc
phlebo-
tomia
tollit
teste
Hippo-
crate.*

*Sanguis
nis mis-
sio Ro-
mæ non
semper
proficua*

VII. Hic serio aduertendum putamus, nos missionem sanguinis non semper in epilepticis, apoplecticis, ac suffocatiuis affectionibus Romæ proficuum expertos fuisse; idcirco, cum in subitis casibus nostræ confusio mentis pronum faciat iter ad errorem, caueant Medici, ne ad huiusmodi, quod tantopere apud aliquos laudatum, expeditumque est remedium, inconsulto descendant; cupientes enim sanare ægrum, vt Celsi dicto vtamur, ex tempore iugulabunt. Sedulo itaque videant, quæ scripsit (a) Hippocrates, circa indicationes, ac signa pro mittendo in iis casibus sanguine;

(a) De
viâ.
rat. in
morb.

ne; & de tempore quoque, in quo acut. n. 37. & seq. (a) Lib. 2. con- fil. in com. ad histor. I
 conuenit, (quod circa mali princi- (b) In com. ad suprad. Hip. tex. tum.
 pia esse solet) consulant doctissimos
 Viros (a) Ballonium, & (b) Martia-
 num.

VIII. Quid? quod Romæ rarius, In male nutritis corporibus sanguinis mis- sio cur perniciosa.
 quam in montanis regionibus ve-
 nas incidere conuenit, præsertim
 cum vel corpora ingluuiei multi-
 genæ, & impuræ sunt assueta, vel
 æstas viget pluuiæ, fructusque ad
 perfectam maturitatem non perue-
 nerint; quibus de causis incolæ, ac
 Ciues apparatus cumulant humo-
 rum, ex quibus plus impuri, quam
 balsamici sulphuris, plus fixorum,
 quam volatiliū salium redundat,
 & proinde laxata fluidorum com-
 pages ad eam prona fit crasim,
 quam scholæ satis barbære putredi-
 nosam, ac malignam appellant, in
 qua quidem, propter volatiliū
 partium penuriam, instar toxici es-
 se solet Phlebotomi lanceola. E
 contrario, cum optima præcesit
 victus ratio, atque æstas pertinaci-

ter feruet, ac sicca permanet, fructusque abundant maturi, Romanorum in corporibus sulphur, falesque, etiamsi acres, volatiles tamen, vt superius monuimus, euehuntur, & subseruiunt vtilitati, ex ipsa sanguinis missione capiendæ; quemadmodum contigit hoc anno, quo etiam in senibus bene nutritis mirum, vel ipsa docente natura, habuimus experimentum. Domini-
cus Vecchiottus septuagenario minor, habitus plethorici, ac pinguis, fessili vitæ deditus, & carniuor-
us, cum per mensem circiter capitis grauitate, ac somnolentia adeo premeretur, ut in ipso telonio, pecunias numerando, cedulasque scribendo, dormitaret; vnde iam in limine apparens timebatur apoplexia; nocte quadam improuiso larga e naribus correptus fuit hæmorrhagia vndecim librarum pondere, qua sane non modo nullam ipse passus est sensibilem virium iacturam, sed ab illo capitis veterno, se

*In bene
pastis
quam-
uis seni-
bus ea-
dem sa-
lutaris,
Mira
ad hanc
rem
histo-
ria.*

valde leuatum sensit ; immo post 15. dies , aliis quatuor libris effluentibus , omnino vindicatum. Magnum profecto docilibus Erasistratis lumen , atque exemplum ; ita vt Clarissimus , parique doctrina , & facundia præditus , Iacobus Sinibaldus in consilium vocatus , visa integra iudicatione , nihil innouandum censuerit , sola admonitione contentus in diætæ regimine , & præmatura deinceps phlebotomia , cum primum turgentia signa fuerint apparitura.

IX. Secundo , ea pariter omnia in corporibus bene nutritis iuamen attulerunt , quæ ad superficiem , atque ad extremas corporis partes illam reuellere potuerunt irritationem , quam in præcordiis , aut cerebro , sub forma strangulationis canalium , tanto cum ægrorum discrimine incuneatus subtilis ichor moliebatur. Immo hoc remedii genus eo securius opem tulit , quo magis irritatio euacuatio-

*Lau-
dantur
Reuel-
lentia.*

ni ferositatum salino-acrium tanquam causæ morbificæ iungebatur. Idcirco ex usu fuerunt non solum frictiones, & cucurbitulæ, sed phœnygmi quoque, & vesicantia plantis pedum, artubus, & occipiti, statim admota.

*Vesicantia
opportuna si
vasorum ruptura
non adsit.*

X. Neque porro dubitamus, quin vesicantibus opus sit in curatione huiusmodi subitaneorum morborum, dummodo a vasorum rupturis non proficiantur. Etenim, cum istorum plerumque causæ maiorum sint succi, ex omnino præternaturalibus particulis coalescentes, motuque penitus inordinato præditi, qui non continuo congruunt cum secerniculis naturalibus, ad naturales, & consuetos recrementitios humores excipiendos comparatis; necesse profecto est in repentinis hisce affectionibus ad artificialia, & morbosa emissaria recurrere; ut ægri, aperta per artem via, statim id assequantur, quod vix sero, & difficulter naturæ beneficio

Eadem sunt emissaria artificialia ad supplementum

cio impetrarent, quæ & ipsa, vbi ^{natura,}
 viribus magis valet, nixu suo, non-^{Et imi-}
 nisi nouis patefactis viis, nempe ^{tatio-}
 per abscessus, laboranti succurrit. ^{nem.}

XI. Silentio deinde minime præ-
 tereundum videtur, quod a D. Do-
 ctore Mistichello non aspernan-
 dum accepimus, nimirum a se ob-
 seruatum fuisse in Xenodochio In-
 sulæ Tyberinæ, vbi curandis ægro-
 tis præpositus est, aliquos de plebe, ^{Ignita}
 quos nullum quantumuis validum, ^{ferra-}
 atroxque remedium a fortibus apo-^{menta}
 plexiis excitauerat, per admota ^{plantis}
 plantis pedum ignita ferramenta ^{pedum}
 ad vitæ officia subito reuocatos. ^{admota}
 Scilicet, quemadmodum (a) Clau-^{(a) Em-}
 dinus consulit in apoplexia, & syn-^{pyric.}
 cope punctiones volis manuum, & ^{Ration.}
 post (b) Fort. Fidel. (c) Henricus ab ^{lib. 3.}
 Heers narrat, se aciculam prælon-^{cap. 17.}
 gam inter pollicem pedis sub vn-^{Puncti-}
 gue cuiusdam apoplecticæ, nullum ^{ones}
 vitæ signum præbentis, adegisse, il-^{item}
 lamque momento citius excitasse; ^{solis}
 ita certo credimus multo efficacius ^{manu-}
 (b) De ^{um.}
 relat, ^{(b) De}
 Med. ^{lib. 4.}
 cap. I. ^{(c) Obs.}

*Acicu-
la sub
pollice
pedis
adacta.
Ignis
sis
quando
a cere-
bro, ner-
uisque
impa-
ctum
excuti-
at.*

præsentem ignem, validissime ir-
ritando fines neruorum, maximum
in iisdem tremorem, & subtilissi-
marum partium excursum per eo-
rundem filamenta inducere posse,
qui, ad usque principium propa-
gatus, fortiter etiam excutiat quid-
quid cerebro, & neruorum ostiolis
pertinaciter hæret, & per talem
duntaxat maximam neruorum suc-
cussionem, & particularum ignea-
rum penetrationem amoueri po-
test. Quo fit, vt omnes fere Pra-
ctici in curatione fortis apoplexiæ
meminerint, non tantum fonticu-
lorum occipiti, sed etiam lamina-
rum ignitarum, ipsis futuris admo-
uendarum. Ac propterea anilem
censemus metum nonnullorum,
qui, ne morbi causam, forsitan
igneam, exacuant, a vesicantium,
ignisque usu, in huiusmodi malis,
omnino abhorrent. Aliud enim est
methodicas, regulares, aut præser-
uatiuas, aliud coactas ac repentinas
morborum curationes instituere.

*Lamia
ignita
in forti
apople-
xia
com-
menda-
ta.*

*In cu-
ratione
coacta
salida
non da-
mnan-
dare.
media.*

XII. Tertio, leuamen pariter non leue porrexerunt iis, qui, post sanguinis missionem, vel sine illa, deglutiendi potestatem recuperarunt, ea, quæ aluum laxare, ac mox validius mouere potuerunt. Atque hinc, si quando infimi tensio, ac renixus ventris (quod sæpe accidit) ^{In abdominis tensione emollientia} occurrebat, statim exhibuimus oleum amygd. dulcium, & in- ^{irritantibus} iicienda curauimus clysmata emol- ^{miscenda} lientia, simulque irritantia. Vbi ^{da.} vero ventris durities aut minime deprehendebatur, aut mox per oleosa cedebat, maxime etiam profuit pul. Cornacchini, vel aliud validissimum soluens, cum superhaustu copiosi diluti ex iure, vel aqua hordei, ad tollendam scilicet siccitatem, ac stimulum, qui a forti cathartico induci solet. Neque sane de huius quoque pharmaci utilitate ambigendum nobis fuisse, visum est per hæc tempora, in quibus non massa duntaxat sanguinis, sed ipsa quoque hypochondria

apud

Vomi-
tus ali-
quibus
profi-
cuis.

apud 'ægros' multitudine' bilioso-
acrium particularum redundabant.
Quinimo profecit etiam vomitus
apud illos, qui vel huic assueti fue-
runt egestionem, vel ex crudioris
adhuc cœnæ pondere laborabant.

XIII. Quarto, non leuiter iu-
uarunt in curationum progressu ea
omnia, quæ aquoso fluido laxante,
ac temperato redundant, cuius ge-
neris extiterunt potus aquæ, iura
simplicia, distillata magistralia, suc-
ci herbarum epicerausticarum, e-
mulsiones amygd. dulc. gelat. C. C.
& similia, quæ nimirum tum sales
acres, & sulphureos temperare, di-
luere, atque irretire, tum vel ma-
xime conuulsas alicubi vasorum fi-
bras laxare valent. Hæc quidem
apprime congruunt cum iis, quæ
tanquam salutaria experta proponit

(a) 7.
epid.

n. 83.

Diluen-
tia tem-
perata

&c. ab

(a) Hippocrates in curatione An-
drothali, qui cum aphonia, rerum
obliuione, ac delirio per interualla
detineretur, leuabat post sanguinis
missionem aquæ potus, & aqua mulsa;

ni-

nimirum quia causa morbi erat humor biliosus, & atrabilarius, qui temperantibus mitescit, ut exponit (a) Vallesius. Qua sane in re laudarem, ut Clinici sæpe manibus tenerent notationes Prosperi Martiani ad Hipp. textum 2. de (c) morbis, ubi per hæc verba aduersus eos, qui in apoplexiæ curatione calefacientibus utuntur, exclamat. *Videant posteriores, quantum a Preceptoris doctrina, & ex consequenti a veritate recedant, dum cuiuslibet apoplexiæ causam, aut saltem pro maiori parte in pituitam frigidam, & humidam referentes, curationem perpetuo calefacientibus, & exsiccantibus instituunt; quandoquidem, facta totius corporis purgatione, si morbus præbet inducias, ad vulgata sua decocta ex guaiaco, sassafra, aliisque similibus, tanquam ad columnas Herculis, confugiunt; cum animaduertere deberent ex tribus apoplexiæ speciebus unicam tantum, & de raro contingentem, in frigidos succos,*

Hipp. etiam laudata.
 (a) Incom. præd. hist.
 (c) Martiani præceptum in apoplecticis curandis.
 (b) Vers. 64.
 Apoplexia in frigidos succos raro referenda
 Hipp.

ex Hippocrate Hippocratis consilio, referendam esse.

Multi generis volatilia, & cordialia in sum. Vocanda. XIV. Tandem non tenuem opem tulerunt ea, quæ benigne discutiant, mitesque spiritus refocillant, & expediunt, cuius ordinis sunt tincturæ ex confect. de Hyac. & Alchermes; guttulæ aliquot spiritus ceras. nigr. vel mannæ, quem vitæ appellant; itidem tinctura auri absque menstruo corrosiuo parata; ut etiam sales volatiles cornu cerui, cranii humani, succini, & similium, quæ sane largo semper haustu fluidi aquei miscebantur. Profuerunt pariter theriaca, castor. & spirit. salis armoniac. naribus, ac temporibus admota; ita tamen, ut perpetuo cauerimus a volatilibus vinosis aliisque sincere, hoc est, absque copiosi fluidi admixtione, per os exhibitis.


Non tamen singula.

OBSERVATIONES

Physico-Medicæ

NONNULLORVM,

Qui, cum primum istiusmodi
 di repentinis morbis tentati
 fuerint, feliciter eua-
 serunt.

ED iam observationes ali-
 quot adiiciamus, & sum-
 matim describamus histo-
 rias nonnullorum, qui Me-
 dicæ Artis ministerio a grauissimis hu-
 iusmodi morbis vindicati fuerunt,
 quorum curationibus vna cum præ-
 stantissimis Urbis Physicis interfui-
 mus, & ex quibus ad consimiles casus
 exempla, & documenta petantur.

OBSERVATIO I.

*Apoplexia cum aphonía, & paralyſi
dexteræ corporis medietatis, phle-
botomia, catharticis, ac diapho-
reticis ſoluta.*

Primus, vel certe dignior,
maximeque ſuſcipiendus,
qui inter Nobiles, elapſo
anno, vim mortis euasit, fuit Illu-
ſtriſſimus, ac Reuerendiſſimus Ar-
chiepiſcopus Bottinus, Vir octoge-
nario maior, probitate, ac doctri-
na inſignis, habitus ſanguineo-
carnofi, miræque morum ſuauita-
tis. Hic, poſt grauia animi pathe-
mata, quæ in ſublimioribus inge-
niis non raro efferueſcunt, media
æſtate anni 1705. ſubiit intenſiora
quædam ſtudia. indeque paſſus fuit
capitis excalefactionem, & ſuppreſ-
ſionem conſuetæ per os matutinæ
euacuationis viſcidulæ lymphæ.

II. Tandem circa initium Augu-
ſti, poſt capitis grauitatem cum leui
ma-

manuum tremore, apoplexia correptus fuit, a qua euasit, succedente paralyfi totius dexteræ medietatis, ac persistente aponia, quam sane, cum iniecti clysteres, exhibiti sales volatiles, admotaque femoribus, brachiis, & nuchæ ve- *Aphonie*
 ficantia tollere nequirent, profecto *sublingualium*
 mirabiliter, quod repente accide- *a bena-*
 rit, vna soluere potuit missio san- *rum in-*
 guinis ex sublingualibus venis. Et *cissione*
 quoniam superuenit ab initio fe- *curati.*
 bris, plura exhibita fuerunt phar-
 maca partim aluum mouentia, par-
 tim diluentia, ac benigne dissoluen-
 tia, inter quæ postrema primas te-
 nuerunt stibium diaphoreticum, ad
 viginti dies continuatum cum iure
 ex herbis alchalicis; nec non gut- *Oris*
 tulæ spiritus, quem vocant vitæ, ex *colluti-*
 manna sublimatum; & quædam o- *ones in*
 ris ablutiones actu calidæ ex deco- *apha-*
 cto emollienti, & cephalico, addi- *nis.*
 tis nunc sale prunellæ, nunc spiri-
 tu salis armoniaci. Quibus reme-
 diis, & multa per aluum biliosa
 O recre-

*Muris
monta-
ni a-
dips ad
paraly-
sim.*

recrementa, & copiosi sudores eruperunt. Sed, quod maximi interfuit, antiqua reuocata est tenacis lymphæ per os excretio; sicque Æger, qui nunc sextum supra octogesium implet annum, simplici falsæ infusione tractatus, eousque melius paulatim processit, ut spatio quinquaginta dierum e lecto surrexerit, illo etiam crure, quod syderatum ab initio fuerat, ad ambulandum soluto. Deinceps vero, cum affectum brachium fricari coepisset manibus, inunctis adipe muris montani, quem Matthiolus italiane vocat *marmontana*, tantum profecit, ut modo epistolas sua manu subscribere, & Missæ Sacrificium rite possit celebrare.

III. Simile commodum per hæc tempora ex eodem montani muris adipe (quantum ex aliorum relatione nouimus) reportauit Diues etiam in Vrbe Senex, qui post præteritam apoplexiam, atque aphoni-
am, contumacissima paralyti deti-
neba-


nebatur. Hic enim adeps mire valet ad soluendum quidquid extremis tubulis, ac villorum poris hæret impactum, simulque ad emolliendas musculares artuum fibras.

IV. In hac vero Præsulis medella, quanquam in ultimo senio fuisset constitutus, diligenter observauimus vtilitatem ex phlebotomia, & prodigio similis nobis occurrit linguæ ad loquendum solutio, eo fere momento temporis contingens, quo sanguis ex venis raninis affatim fluebat; indicio certe admodum euidenti, morbum ex interceptione vasorum sanguinis ad cerebri potissimum basim, & ad linguæ radicem, adglutinante muco, ortum habuisse, qua soluta interceptione, contiguorum, & continuorum neruorum libertas emicuit, quam ex earundem sectione venarum videtur spondere (a) Simon Pauli in quodam consilio ad aphoniam.

*Raninis
intisis
cur stan-
tim lo-
quela
redie-
rit.*

(a) Ad-
nex. ad
calcem
tract. de
febma-
ling.

V. Huic vero curationi interfuerunt Viri Clarissimi DD. DD. Placentius, Manfredus, Bernardini, & ipse ego, iussu CLEMENTISSIMI PONTIFICIS, qui egregii huius Præsulis iacturam grauissime ferebat.



OBSERVATIO II.

*Fortis Apoplexia cum relicta paralyfi
feliciter curata in Matrona
sexagenaria.*

Matrona quædam nomine Cherubina Leopardi, corpore subpingui, sexaginta annos nata, ob suorum probitatem morum, eximiasque virtutes, annis profecto digna nestoreis. Hæc diu spasmodicis circa collum, & pectus doloribus, leuique vertigine diuexata, melius interdum se habebat, cum sanguis flueret ex hæmorrhoidibus, quibus restitantes, & præcurrentibus alui torminibus, ac flu-

xu, deinde vero sinistrorum artu-
um contractionibus, pridie Kalen-
das Decembris 1705. in subitam in-
currit apoplexiam, quæ externos,
internosque sensus proprio usu,
partesque omnes motu priuauit;
sed, adhibitis illico cucurbitulis,
vstione, suppositoriis, vesicantibus
dexteris artubus, & ceruici, admo-
toque naribus spiritu salis armoni-
aci, balbutiens resipuit Matrona,
quæ sequenti mane, hausto syrupo
persico, laudabiliter purgata est.
At vero, cum adhuc graui sopore
detineretur, etiam post paralyseos
decubitus ad sinistras corporis
partes, accersor ipse, & facti con-
scius, non dubitavi cum solertibus
Physicis curantibus D. D. Pierleo-
no, & de Rubeis, quin ex hæmor-
rhoidali restitante hæmorrhagia, at-
que ex acri, sulphureaque hypo-
chondriorum saburra atrox malum
magna ex parte penderet. Quo-
niam vero sales volatiles viper. suc-
cin. cornu cerui, cranii humani,

*Suppres-
sis hæ-
mor-
rhoidi-
bus for-
tis apo-
plexia.*

*Iisdem
artere-
uocatis
morbi
dimi-
nutio.*

*Vesi-
canti-
um Sti-
litas.*

*Salsæ
infusio.*

aliaque cephalica calida minime
conducerent, propterea mariscas
aperiri iussimus, quæ phlebotomia
vtilitatem attulit, cum inde, amo-
tis imi ventris repagulis, sanguis
liberius per vasa moueri cœperit,
vnde febris non sine magno leua-
mine excitata fuit. Ægra enim,
quæ prius fere muta, obtusa, inerf-
que sensibus fuerat, loquacissima
euasit: sed cum facile in soporem
recideret, idcirco syderatis etiam
artubus, noua admota sunt vesican-
tia, quæ affluenter, & commode
viscidula lymphæ per octiduum ma-
narunt. Interea temporis, cum
nondum cerebrum integre extra-
nea sibi fluida remisisset, iuuat præ-
bere pillulas de succino Cratonis,
atque adiicere frequentes clysteres:
cumque sitis vrgeret, largas potio-
nes hausit ex iure cornuceruino, &
aquis cephalicis. Demum trans-
acta trigesima die, & repetitis pil-
lulis de succino cum flor. cas-
siæ, tantum sola infusione eboris,
& salsæ procescit, vt mitiori super-
ue-

ueniente veris tempestate, ac proinde, liberiore succedente transpiratione, ad consuetum ciuilem vitæ usum, propriis innixa pedibus, redierit.

II. In hac profecto Matrona vim humoris pene furentis, quem Prisci vocant melancholicum, atque atrabilarium, aperte obseruauimus; acre enim, ac sulphureum fermentum, ab hypochondriis per venas ad præcordia, & cerebrum exaltatum, loca omnia, per quæ gradiebatur, & in quæ decumbebat, miris modis, doloribus videlicet, vertigine, conuulsionibus, apoplexia, sopore, & febribus affecit; vt nullum fuerit dubium, quin Oraculum (a) Hippocratis nouam semper veritatis lucem ab experimentis mutuetur, *morborum nempe omnium vnum, eundemque modum esse, ipsum vero locum illorum differentiam facere.* Etenim, quanquam colli, & pectoris dolores, vertigines, alui fluxus, motus conuulsiui, apoplexia,

(a) Lib. de flat.

n. 4.

Morbi

ex loco

tantum

differe-

runt

iuxta

Hipp.


xia, & paralyſis, propter locorum diuerſitatem, nihil inter ſe ſimile habere videantur, vna tamen ſæpe, eademque eſt, vt idem ſubdit Hippocrates, illorum ſpecies, & cauſa.

III. Illud inſuper circa veſicantia ad memoriam hic reuocandum cenſemus, quod poſtremo huius lib. cap. monuimus, ſcilicet magnam ex iis vtilitatem euacuatione viſcidulæ acerrimæque lymphæ in huiusmodi caſibus præſtari poſſe; quia nimirum validius eſt remedium, ad omnino præternaturalem humorem extrahendum, morboſa emiſſaria ſubito artificio aperire, quam inani ſpe illius concedere euacuationem ordinariis ſecerniculis, quæ, cum conſueta ſint nonniſi ſenſim congruere cum fluidis, mixtura, ac motu naturali gaudentibus, nec ſubito, nec tuto præternaturalibus excipiendis liquidis aptari poſſunt: parcendumque propterea eſt iis Cl. Viris, qui, in ſcilitanda medicina nunquam veſi-

*Veſican-
tia ſe-
cernicu-
lum ex-
citant
liquido
præter-
natura-
li ex-
purgan-
do iuo-
neum.
Solis ſe-
cerni-
culis
natu-
ralibus
cur non
ſemper
morboſi*

can-

cantibus vrentes , illorum vim ex-^{liquidi}
periri , ac suscipere non possunt.^{repur-}
Vnde in subitaneis morbis sæpe ac-^{gatio}
cidit, vt, dum Medici solius con-^{concre-}
sopitæ naturalis œconomix mune-^{denda.}
ra formidolose promouere student,
æгри properent ad interitum.



OBSERVATIO III.

*Subita capitis occupatio cum aphonia
ex affectione cerebri partim idiopa-
thica, partim sympathica, pro-
spere cedens.*

Reverendissimus Pater Alde-
ranus Malaspina, Abbas S.
Pauli ex Benedictina fami-
lia, sexagenario maior, corporis
habitus mediocris, ingenio con-
stanti, serioque, cum ex variis per
Italiam itineribus, curisque animi,
malignam febrim Cæsena, ni fal-
lor, ante annum contraxisset; in-
deque valetudinarius de hypochon-
driorum plenitudine, de stomachi

cruditatibus, deque capitis dolore, Mutinam profectus, quereretur. Tandem summa hyeme anni 1706. Romam venit, vbi, cum forte paulo largiori vteretur victus ratione (quæ, tametsi plerisque Flaminia, & Gallia Cispina incolis ita sit innoxia, vt, propter subtilissimum illius cœli temperamentum, potius sit necessaria, in Vrbe tamen, potissimum apud illos, qui sessilem vitam in studiis plerunque ducunt, semper est periculosa) accedentibus etiam principio sui ministerii pluribus, tædioque plenis laboribus, incidit in comatis speciem cum aponia, ad quam curandam accitus eruditissimus Ioh. Trullus, vna cum aliis Cœnobii Physicis, statim catharticum, variaque cephalica, prudenter exhibuit. Cumque postridie, ob mali momentum, ipse quoque in consilium adhibitus fuero, non dubitavi, quin morbus partim esset sympathicus ex stomacho, & hypochondriis,

*Victus
plenus
Romæ
quibus
præfer-
tim no-
xiis.*

par-

partim idiopathicus ex languidiori reddito membranarum, vasorumque capitis tono, hærenteque crassiori lymp̃ha ad cerebri præsertim basim. Vnde tria potissimum, pro *Cura-*
abigenda ægritudine, omnium *tio Co-*
consensu, decreta fuerunt remedia, *matis*
scilicet primo citissima phœnyg- *ex con-*
morum admotio femoribus, brachi- *sensu*
is, & cervici: secundo epicratica *stoma-*
purgatio cum pillul. ex rhab. pulu. *chi, &*
stomach. Quercet. & granis scam. *capitis.*
sulphur. succini, & casto: tertio
omnimoda vini subductio; quibus
sane auxiliis, intra triginta dies
conualuit. Sed, cum post verum
æquinoc̃tium ad Monasterii curas
propere, atque adhuc impotens
rediisset, improuiso in aphoniam
recidit, quæ, licet comati non iun-
geretur, adhuc tamen futuræ apo-
plexiæ metum assidentibus incussit.
Sed propinato statim puluere Cor-
nacchini, nouisque admotis femo-
ribus, & occipiti vesicantibus feli-
citer, citiusque reualuit. Et quo-
niam

Ad stomachi languorem minus appropriatum. niam languor stomachi pertinacius urgebat, idcirco plus viginti dies hausit magno cum fructu ius pipionis turratil. in cuius ventre parum lignorum sassafraſas, & Visci Quercini, cum rad. & herbis deobstruentibus, stomachicis, & cephalicis inclusam fuerat.

Phlebotomia cur omiſſa fuerit.

II. In hoc sane Præsule cum subitus capitis morbus vitio tum primæ digestionis, cum collectæ in vniuerso corpore, sed in cerebro præsertim lentæ, ac viscidulæ lymphæ ortum habuerit, nulla mentio de mittendo sanguine facta fuit, ac solerter vtilitatem, ex aluum soluentibus, atque ex vesicantibus reportandam, loco phlebotomiæ, constituimus, vt de ægro nobis pollicebamur. Et quoniam religiosissimus Vir, congrua deinceps corporis exercitatione, diætâ, atque purgatione per epicrasim vsus fuit; idcirco firmitus sanatus est.

OBSERVATIO IV.

*Apoplexia cum affectione epileptica,
& syncopali in paralyfim dexteræ
medietatis corporis, salua tunc
Aegri vita, concedens.*

Illustrissimus, & Reueren-
dissimus Bartholomæus
Spada, Cam. Apost. Cleri-
cus, & Basilicæ Vaticanæ Vicarius,
annorum 50. staturæ procera, ha-
bitus ad gracilem tendentis, mori-
bus feriis, ac religiosis, lingua ab
infantia paululum tardus, sterno
admodum depresso, conuulsiuoq;
asthmatis per interualla obnoxius,
cui fluida semper profuerunt, cum
fere ante annum ex duabus sibi diu
consuetis euacuationibus, sangui-
nis nimirum hæmorrhoidalis, nec
non acris narium muci, illam ha-
beret, si non valde diminutam,
saltem non large fluentem, hanc
vero penitus suppressam (forsitan
ob inspirata recentis effluuia calcis,
ex

Suppres- ex nouo, iuxta quem incaute dor-
sion na- miuit, muro) paulatim, præterito
rium autumno, fluxionem rheumaticam,
muci ex- erraticamque febrim incurrit; in-
recentis deque, collectis apud hypocon-
calcis dria, & præsertim læuum, tensiuis
effluui- obstructionibus, res eo deuenit, vt
is. febris, ac dolores contumacissime redierint. Sed Medici antiquæ memores utilitatis, ex fluidis reportatæ, illum variis temperantibus curarunt; quinimo vsu etiam chinæ tum febris, cum dolores penitus exularunt. At, cum Æger pietate, ac lege sui muneris impulsus, integram Sanctissimi Natalis noctem anni 1705. in Basilicâ Diui Petri, frigore, atque inedia tortus, peruigilasset, postero die graui feбри, cum acutissimo in colli flexura dolore corripitur, cui licet oleum amygdalinum, externaque fomenta, & clysteres opportune profuissent; attamen vix hebdomada morbus quieuit, qua transacta, atrox sub poplite dolor subi-

to inuasit, qui pariter laxantibus
cescit. Post hæc, secundo Februa-
rii 1706. dum, flante borea, Vale-
tudinarius publice Sacris adesset,
ob inopinatum animi deliquium,
domum reducitur, & sequenti no-
cte immuni tentatur dolore circum
dexteræ mandibulæ articulationem
cum faucium phlogosi, a quo ma-
lo exemptus fuit cucurbitulis sca-
rificatis, fomentis anodynis, inie-
ctisque clysteribus.

II. Sed, cum Æger fortasse nun-
quam se melius, quam die 18. eius-
dem mensis, habuisse videretur,
proxime cœnaturus, apoplexia re-
pente corripitur, post irregularem
totius corporis motum, cui dexte-
ri brachii syderatio, oris tortura,
auctaque linguæ hæsitatio illico suc-
cesserunt. Accurrunt Medici, &
prætumidam, ac subrubram illius
faciem, consuetumque hæmorrhoi-
dum fluxum perpendentes, iubent
mitti sanguinem ex talo; cumque
constaret fluidum acre, olim per
nares

*Vagi ex
terna-
rum
parti-
um do-
lores
tandem
in apo-
plexi-
am ce-
dentes.*

*Hypo-
chondrio-
rum
tensio
sublata.*

*Synco-
pis, &
conuul-
sionum
recur-
sus
inde.*

nares excerni solitum, hac illac per-
errasse, consulto admouerunt ve-
ficantia femoribus, & cruribus, ni-
hilque omiserunt, quod succorum
acredinem mulcere, tonumque ce-
rebri firmare potuisset. Neque
vero ullum de exhibendo statim
cathartico consilium fuit, hypo-
chondria subtenfa, atque irritata,
benignam laxantis pharmaci facul-
tatem subito postularent. Hinc
exhibitum oleum amygdalinum
cum syrupo violato, indeque inie-
ctis fortibus clysteribus, copiose
fluxit aluus. Sed cum omnia fe-
liciter progredi videbantur, postri-
die prætumida, ac subrubra recur-
rit facies, turbatur mens, conuel-
luntur labia, atque artus; mox in
syncopem recidit Ægrotus quem
propterea sine pulsu, respiratione,
ac voce, lugent ut mortuum. Re-
cens hoc mali augmentum docuit
ex hypochondriis, per albas, rubras-
que venas, liquida fibras irritare, &
conuellere apta, in præcordia, at-
que

que in cerebrum, indeque per nervos in vniuersum corpus erroneo motu transduci : vnde , excitato prius Ægro a paroxysmo cum spiritu salis armoniaci, & oleo Matthioli, omnium consensu Curantium propinatum fuit pharmacum ex infusione sennæ, & tartari cum syrupo violato, præmisso bolo ex stybio diaphor. cui accesserunt antepileptica, ex cinnabari natiua , & succino, atque, ob gracilem Præfulis habitum, copiosa, ac temperata diluta.

*Horum
Curatio
extra-
paxa-
roxys-
mum.*

III. Cum vero in hac morbi recrudescencia oculi subtensi, ipsaque taciturnitas satis admonerent, cerebrum minus per venas refudisse, quam accepisse per arterias; idcirco nouum occipiti vesicans ad-mouendum iudicauimus, quibus remediis Æger circa mentis operationes melius se habuit, vrinis red-ditis circa septimum copiosis, atque interdum etiam stranguriosis.

IV, Sed, quanquam serositates
P acres,

Morbi acres, ex vesicantibus large fluen-
*ad ex-*tes, vna cum rubicundis quibus-
*teriora*dam herpetibus sub affecta scapu-
*conuer-*la, & circa dexteram dorſi partem
sio. ſponte obortis, multum de præ-
cordiorum, & cerebri infarctu ex-
tra corpus deriuaffe viſæ fuerint;
nihilominus tamen recurrentes
pulsus inæqualitates, urinæ ſtran-
guriſæ, rubor faciei, circumten-
ſius capitis dolor, oculorum im-
mobilitas, ſplendor, ac ſtrabiſmus,
denique taciturnitas, ac ſubobſcu-
ræ motiones mentis non medio-
crem incutiebant metum, ne acer-
rimi ſucci, qui in cerebro, & hy-
pochondriis pertinaciter adhuc in-
tercipiebantur, mortiferas ſynco-
pes, & epilepſias aliquando reno-
uarent. Qua de re ad iſtam cau-
ſam magis diminuendam purgans
benignum, duodecima die, repeti-
tum fuit, & hirudines marſcis,
præter ſolitum tumidioribus, ante
14. admotæ ſunt; non omiſſis fri-
ctioni-

Synco-
pis, &
epile-
pſia pe-
riculum
detra-
ctum.

ctionibus, pediluviis, & laxantibus, subtenso abdomini adhibitis.

V. At vero, licet omnia sensibili fructu ad usum venerint, nondum tamen sæuitia morbi pelli omnino potuit; etenim a die 13. usque ad 20. non semel syncopes, vaniloquia, & conuulsiui motus redierunt; quorum sane potior malorum causa, superatis tandem præcordiorum anfractibus, cerebrique flexibus, per nervos extra cranium fuit paulatim detrusa, atque in femore, & crure dextero intercepta, quibus in locis paralyfim, tanquam opportunum decubitum, induxit.

*Ab hac
opportu-
nus
transi-
tus in
para-
lysim.*

VI. Interea temporis nulli non Curantium perspicuum erat, mixtum hunc morbum exapoplectica, epileptica, & syncopali affectione in Viro graui, & melancholico, a sanguine, miscella salium lixiui-
alium, & impuri sulphuris imbuto, atque infecto potissimum produci, ideoque locum habere illud (a)

(a) Lib.

*Hirudi-
nes na-
ribus
appli-
cita
salu-
tares.*

Tralliani, quo monitos vult Medicos, ne in curatione paralyseos decipiantur, sumentes (loquitur enim iuxta vulgarem sui temporis hypothefim) calidam causam pro frigida. Idcirco vnice studuerunt diluere huiusmodi pene igneos sales, exhibita aqua Nucer. nunc simplici, nunc in speciem iuris, aut emulsionis, nec non tentatis Balneis aquæ dulcis. Sed profectus non nisi incerti, ac diarii vsque ad 27. extiterunt. Quapropter ad deplenda cerebri vasa, quæ splendidis, rubentibusque ex oculis tumentia perspiciebantur, applicitæ fuerunt hirudines ad venas narium; indeque vaniloquium, atque insomnium magna parte remisit. Cumque persistens capitis grauitas, dolor, ac taciturnitas arguerent hærentem in membranis, & intra cerebrum acerrimam lympham, qua olim illius nares manabant, ea ratione tunc noua dedimus antepileptica, partim ex crySTALL. mont. corall.

corall. & rad. valer. partim ex pane, & croco metallor. iuxta Quercet. normam, parata; & præcipue setonem ceruici admouimus, cuius ex vlceribus crassa, copiosa, & acris fluere cœpit sanies, vt breui, depleto cerebro, grauiora eiusdem symptomata mirabiliter cesserint.

*Seto
Ceruici
Stiliter
admo-
tu.*

VII. His certe auxiliis, & omnimoda vini abstinentia compe-
sci, non plane profligari morbus passus est. Cum enim fluida iunguntur solidis ad maleficia, oportet Medicum permutare posse totum hominem, vt prudenter scripsit Aretæus, quod nec Diis suis facile fore putauit. Itum igitur nunc arescentibus, nunc reuirescentibus symptomatibus vsque ad 50. diem, quo tempore præcordiorum, & cerebri mala, aperto etiam sponte in coccyge tuberculo maiori parte sedata sunt.

*Medici
labor
in soli-
dorum
morbus.*

VIII. At enim vero, post factas cum morbo multorum mensium inducias, vrgebant tamen Ægrum, cum morbo multorum mensium inducias, vrgebant tamen Ægrum, pri-

*Super-
stes in
Ægro
sympto-*

*matum
cumu-
lus.*

primo inuincibilis paralyſis dexterae corporis medietatis ; ſecundo ſumma gracilitas cum lenta feбри, & pulſu frequenter inæquali , ad tabem feſtinans ; tertio animi angor , in vna præſertim cogitatione reaſſumendi publica ſua officia deſixus ; quarto alui ſtypticitas ; quinto recurrentes interdum præcordiorum contractiones cum anhelitu ; ſexto voracitas , & impatientia ciborum , quibus , etiamſi affatim deuoratis , Ægrotus nihil proficiebat : Alimenta enim , etſi copioſa , quæ ab ore in ventriculum acris irritatione fermenti iucunde deſcendebant , a ventriculo tamen , atque inteſtinis minus defæcata , immo vitiata mixtura , minori , quam par eſt , mole per galaxiam , ad maraſmum auertendum , aſcendebant. Tandem ea etiam vlcerofa laſſitudo , viriumque imbecillitas vexabat , quæ nullum corporis motum , nullam vel minimum actuoſam

medi-

medicamentorum facultatem sustinere poterat.

IX. Quare, cum mecum optimi Romæ Medici rursus in consilium vocati fuerint, DD. DD. Placentius, Sinibaldus, Saxus, & Gattucius, quorum vnanimi consensu, omnia etiam initio morbi decreta fuerunt, statuimus, medicam artem vehementes istius mali impetus obtundere potuisse, morbum tamen prorsus tollere nequiuisse; atque idcirco Nobilem Virum iis adscripsimus, qui morbo succubuerunt, quorum integram curationem nemo sciens, ac prudens citra immaturum Ægri periculum, artisque dedecus tentare audeat; Propitio interim Numini tribuentes, subitaneum, semperque atrocius recurrens malum, quod Romæ tot, tantosque repente sustulerat, nostro adhuc Præsuli pepercisse.

AETIOLOGIA.

Nemo inuoluti huius morbi ætiologiam apprime poterit intelligere, quin attente perpenderit, apud (a) Hipp. morbos in iis corporis partibus statui, atque firmari, quæ antea laborauerint, simulque aduerterit eiusdem (b) Hippocratis monitum, occasiones nimirum, vnde quis ægrotare cœpit, considerandas esse. Etenim cum illustrissimus Præsul ab incubulis lingua parumper hæsitauerit, sternoque depressus, conuulsiuo asthmatis fuerit obnoxius, procul dubio cerebri simul, & præcordiorum insito, atque innato structuræ vitio ipsum laborare necesse fuit. Nil igitur mirum, si prædictis visceribus, iisque appensis vasculis nouissime incubuerint morbi, quorum sane causa petenda maxime videtur ab occasione suppressionis narium fluoris, qui, cum copia, atque acredine sua (c) cerebrum,

(a) ex
aph. 33.
lib. 4.

(b) 2.
de
morb.
popul.
sect. I.
Morbo-
rum oc-
casiones
perpen-
denda
ex Hipp.
Ingeni-
um or-
gano-
rum
bitium
in æ-
grotan-
te.

(c) Huc
confer

brum, & massam sanguineam perpetuo defæcaret, statim atque ob haustos recentis calcis vapores substitit, easdem partes coepit inquinare. Et quoniam ab initio quodcumque vigeat robur in vasculari, ac muscolari textura præcordiorum, & cerebri, simulque morbi da fluida nondum ad summam plenitudinem, summamque acedinem euecta erant, decubitus ad artus, atque ad imi viscera ventris solummodo cōntigerunt. Sed postquam præcordia, ac nervorum principium paulatim languidiora reddita, fluida vero copiosiora, & vitiosa magis fuerunt, repente epilepsia, atque apoplexia, deinde etiam syncope subortæ sunt, quarum certe affectionum geneseos modos is digito quasi tetigerit, qui magni textum Hippocratis lib. de (a) flatibus, tacita circulationis lege ibidem vtentis, diligenter expenderit; dummodo quod ipse aëri, tanquam istorum causæ morbo-

quæ
scribit
D. Val.
salua de
forami-
nibus
expel-
lenti-
bus
morbo
sa flui-
da ex
cranii
cauita-
te per
aures,
nares,
& os, in
lib. de
Aur.
part.
vsu
cap. 5.
Vigen-
tibus
Cere-
bro &
præcor-
diis
morbi
ad ar-
tus &
abdo-
men de-
trahit.
(a) n.

*Iisdem languentibus morbo-
sa materia retro-
cessio.* rum, adscribit, acribus liquidis
tribuendum didicerit. Sanguis enim,
acerrimorum miscella salium
foedatus, natiuam volatilitatem, su-
amque dulcedinem amittit, & con-
sistentia, ac superficie euadit inæ-
qualis, ut demum vasa ipsa irrita-
re, & corrugare sit potens; atque
ita duabus de causis sua nempe, ac
vasorum, in præaffectis partibus si-
bi cursum perturbat. Vnde *alio
quidem loco* (sunt verba Hippocra-
tis) *sanguis consistit, alio lentius pe-
netrat, alicubi autem citius.* Qua
sane facta inæqualitate transitus
sanguinis per cerebrum, & præ-
cordia, omnigenæ inæqualitates, &
ægritudines artuum, pulsuum, re-
spirationis, atque animorum in ho-
minibus contingunt.

II. Verum, ubi contumax est
*Quomodo pa-
ralysis in his
contin-
gat.* inæqualitas motus sanguinis in ce-
rebro, ac medulla oblongata, sæpe
partes aliquæ fluidorum minoris
motus intra, & iuxta horum, aut
illorum neruorum texturam, aut
mo-

motricium fibrarum vtriculos , atque intermedia spatia , vel vrgentur , vel subsident , & impingunt , & tanquam capita mortua fere indissolubiliter figuntur ; inde , iuxta neruorum discrimina , varias paralysis species inducunt , quæ , in nostro casu , primum brachii dexteri , deinde etiam femoris , & cruris eiusdem lateris extiterunt.

III. Sed , dum hæc scribebamus , quasi gratulantes , metum dissimulare minime potuimus , ne aliquando syncopis , vel epilepsiæ simul , atque apoplexiæ insultu correptus Æger , diem suum obiit ex tempore. Quod sane prognosticum impletum vidimus die VII. Kal. Octob. 1706. Etenim *Ægr. huius interitum quædam præcesserint.* Patiens post crescentem ulcerosam lassitudinem , ac sæpe recurrentem syncopem , vehementissima vexatus sinistra medietatis epilepsia , non sine Amicorum lacrymis decessit. Vbi notandum , per octiduum

duum ante mortem intenso crurum frigore, ab aliquali œdemate tumidorum, fuisse detentum; quo tempore lotium turbidum, crassiusculum, nec magna copia reddebatur; aderat inappetentia; & spirandi quædam difficultas identidem vexabat cum laryngis, & præcordiorum sensibili strangulatione. Quare, ne ad plenam istius ægritudinis cognitionem quidquam desiderari possit, ea, quæ in cadauere observatu digniora comperimus, breuiter subnectemus.

DISSECTIO CADAVERIS

Sub die 26. Septembris

1706.

Coram Excellentissimis DD. Doctori-
bus Sinibaldo, & Saxo, me quo-
que prasente, ac omnia dili-
genter adnotante.

Inchoata itaque sectione
a capite, quod malo-
rum potissimum thea-
trum habebatur, vidi-
mus duram matrem albam, con-
tractam, atque in anteriori parte
corrugatam, qua deinde amota,
occurrit pia solito crassior, flauo-
que hic illic mucro foedata, cuius e-
vasis plus iusto dilatatis, subobscu-
rus magna copia exundauerat san-
guis, qui, in grumos concretus,
haerebat sulcis dexteri praesertim
cerebri hemisphaerii usque ad cor-
pus callosum. Sinus interim durae
matris omnino vacui, multisque
sparsim racemis glandularum mili-
arium

*Morbo-
sa dura
matris
contra-
ctio.*

*Glan-
dula-
rum ra-
cemi ad
eiusdem
sinum.*

*Dexte-
rum
corticis
cerebri
hemi-
sphari-
um fini-
stro mi-
nus &
flacci-
dius.*

arium referti conspiciebantur. Substantia tam corticis, quam medullæ cerebri fluidior, & dextera præfertim, atque anteriori parte minor, ac depressior erat. Diametri ventriculorum anteriorum aliquanto naturali statu maiores occurrerunt. In dextero ventriculorum cruenta ferositas continebatur. Nerui optici paulo graciliores. Cerebellum mollius pariter, ac flaccidius, in cuius, atque in cerebri basi venulas aliquot varicosas offendimus.

II. Ad ventres mox inferiores descendentes animaduertimus vniuersum corpus insigni tabo consumptum cum pedibus œdemate affectis, &, reſerata per cultrum intra abdomen via, gracilem, ac nigram quandam membranam omenti vicem gerere; stomachum, atque intestina optimi coloris, & substantiæ. Hepar neque mole, neque consistentia, aut colore a naturæ lege admodum deuium; bilis ta-
men

men cystica fluidissima, & subuirdis occurrit. Pancreatis glandula mole maior, ac durior. Lien parte, qua maxime lymphatica excurrunt, duobus cinereis steatomatibus erat induratum, cætera sanus. Renes omnium iudicio incolumes, excepto cortice, qui subobscuri coloris euaserat.

III. Denique, secto, atque eleuato sterno, vtraque thoracis cavitates cruento latice redundabat. Pulmones quædam subnigræ maculæ variegabant, quas, cum attentius obseruaremus, figura serpentina præditas aspeximus; ac proinde non dubitauimus, quin illæ extrema essent vasa sanguinea, quæ in exiguas varices abierant. Pericardium breuius vndequaque superficiei cordis adhæserat, omni penitus lymphâ exinanitum; in cuius sane interna facie, a corde per vim auulsa, inæqualia, atque alicui nostrum duriuscula etiam corpora, obstructarum glandularum speciem refe-

*Pulmonum
varices.*

*Cordis
sarco-
mata
in semi-
lunari-
bus val-
vulis.*

referentia, visa sunt. Cor, quan-
quam exterius nihil spectabile pa-
tefaceret præter aridiusculas, & sul-
cis quibusdam per longum exara-
tas fibras; interius tamen, (etiamsi
sanguine, ac polypis omnino vacu-
um) raram certe, ac memoria ho-
minum æternum duraturam rem
nobis exhibuit; scilicet ad ostium
arteriæ magnæ in singulis valuulis
semilunaribus aderant inæqualia
quædam, ac exigua sarcomata, quæ
in fimbrias, ac lacinias, instar con-
dylomatium protensa, intra aortam
inclinabant; neque interim a val-
vulis, citra scissuram se auelli pati-
ebantur; vt nullum propterea fue-
rit dubium, quin ex productis val-
vularum fibris, vasisque nata, non
vero per simplicem adhæSIONem
compacta, corpora illa penderent.
Denique intra aortam descenden-
tem substantia inæqualis, ac rotun-
da, naturæ vero polypeæ, cauita-
tem fere totam opplens inuenta
fuit.

IV. Hæc sane omnia clare nos docuerunt, sedes, & causas atrocium tum præcordiorum, cum cerebri malorum, quæ Nobilem Ægrum lento tabo ad tumulum perduxerunt, omni humana ope fuisse maiores.

SCHOLIUM.

Rorro, si quis diligenter recuperet per singulas præternaturales res, quæ in hoc extispicio observatæ fuerunt, provinciam sane longe grauissimam, & simplici commentario maiorem susciperet. Attamen, ut specimen aliquod nostrarum tradamus annotationum, censemus, non omnia, ut plerumque contingit, quæ hic rara, & præter naturæ ordinem detecta sunt, ab initio morbi extitisse; sed alia præcessisse, alia sensim, alia tandem excitata, præuisæ huius mortis causam habenda esse.

Non
omne
morbo-
sum in
cadaue-
re re-
pertum
morbo
synchro
non
fuit.

*Vitia
morbo
præ-
suntia.*

II. Vitia, quæ præcesserunt epilepticam, apoplecticam, & paralyticam affectionem, nonnulla existimamus latuisse in fluidis, nonnulla in solidis. Fluidorum præexistens labes in lymphâ certe constituenda præ cæteris videbatur, quæ scilicet salsa, & acris, ex lixiviali plus iusto bilis mixtura orta, per nares olim vtiliter excernebatur, quæque sanguini admixta, fere menstruum hæmorrhoidum fluxum promouebat.

Cognata.

III. Nonnulla pariter solidorum vitia cognata, indeque adulta fuisse arbitramur. Hæc autem extiterunt sterni depressio, pericardium minus, quam par est, amplum, extremorum vasorum in corde, pulmone, ac cerebro talis laxitas, per quam in varices facile dilatari potuerunt.

Succedentia.

IV. Vitia vero, quæ decursu morbi accesserunt, putamus fuisse in fluidis crasim, seu mixturam longe magis acrem, pungentem,

ac

ac fere veneficam, ex ipsa suppressione mucinarium, simulque ex influxu particularum recentis calcis inductam, quæ fieri non potuit, quin cum liquido etiam nervorum, aliisque fluidis secundariis paulatim communicaretur. Etenim posthac febres, dolores, & vigiliæ, tandem epilepsia, paralytis, ac syncope ingruerunt. Hæc autem fluidorum labes in præaffectis potissimum structura locis, cerebro nimirum, & præcordiis, morbosos tandem decubitus induxit: intercepta enim, ob recurrentes identidem conuulsiones, circulatione sanguinis, necessario ichores erosiui, ut pote perniciores, subterfugiendi tempus, ac modum ipsa ex mora huc illuc inuenerunt; ita ut minima vasa, villorumq; extremitates eliminare potuerint. Vnde postmodum cætera intercurrentia liquida, pro varietate suorum motuum, & mixturarum, alteri parti aliquid affinxerunt, de altera vero aliquid

*Ichorum
Bile
penetrati-
onem*

semper detraxerunt ; affixerunt quidem lien , valuulis semilunaribus , pericardio , renum cortici , pedum intercapedinibus , aliisque membris , in quibus , vel propter pororum angustias , vel propter exilitatem impetus , semel interclusa viscidula fluida pertinaciter adhæserunt. Detraxerunt vero de dextero cerebri cortice , de omento , de vniuerso corporis habitu , deque aliis locis , a quibus intercurrentes corrosiui ichores , non modo nouam non addidere , immo compactam iam pinguedinem eliquare , atque abradere , corpusque tabidum reddere potuerunt.

V. Tandem eo ventum fuit , ut sanguinea tum piæ matris , tum pulmonum vasa , ad extremum exilitatis attenuata , propter diuturnam introfluentis liquidi acredinem , distrahentemque vim , ob circuli interceptionem , ex conuulsionibus ortam , postrema excitata epilepsia dissilirent , sanguinemque supra , & intra cerebrum , nec non cruentum serum

serum intra thoracem effuderint.

Vnde subita mors; ad quam tamen *Vnde*
 inferendam suspicor vna simul con- *subita*
 spirasse interruptam sanguinis con- *mors*
 tinuationem per ipsa vasa cordis; *in hoc*
 inuenta quippe ventriculorum exi- *Ægro-*
 nanitio certe arguit a violentissi- *tante.*
 mis præcordiorum strangulationi-
 bus præcisum fuisse vitæ tramitem,
 qui cum sanguine per cor in pul-
 mones, & a pulmonibus per cor in
 arterias, ac venas circumducitur.

VI. Quod vero spectat ad duplex
 cordis vitium, adhæSIONEM nempe
 pericardii, & sarcomata valuula-
 rum, non admodum in prioris
 examine immorabor; vt enim il- *Peri-*
 lud frequentius est malum apud *cardii*
 tabidos, ac præsertim asthmate ve- *cum*
 xatos; ita longa disquisitione non *corde*
 indiget; nam satis est notare, ob- *adhesio*
 structis ostiolis, vnde intra pericar- *cur ta-*
 dium liquor depluit, ac deficiente *bidis, &*
 prorsus omni humiditate, quæ am- *asthma-*
 bas cordis, eiusque capsulæ super- *ticis*
 fices ab adhæSIONE disiungit, illas *fami-*
liaris.

inter se necessario cohærere, atque coniungi; præcipue si pericardium breuiori orbe (natura, vel sæpiusculis contractionibus factum) contineatur, ex quo fiat, vt sit cordi propinquius.

*Valu-
larum
cordis
sarco-
mata a
nemine
indi-
cata.*

VII. Igitur, ad posterioris animaduersionem transeuntes, ingenue fatemur, hoc sarcomatum vitium in tot obseruatis cadaueribus nunquam alias nobis fuisse compertum, nec adhuc ex aliorum lectione cognitum; vtcumque viderimus huiusmodi valuulas cartilagineas, osseas, exesas, phlogosi affectas, aut cum sanguiferis varicosis.

VIII. Nota pluribus est illa per

(a) Ex-
erc. 52.
de gen.
anima-
lium.
(b) A-
pud
Miscell.
n.e. de-
cad. 2.
obs.
204.
(c)
Meth.

(a) Harueum memorata obseruatio de carne fungosa, externo cordis cono accreta. Nec ignoramus aliam Ioh. Iacob. (b) Martini de exciscato corde, quod centum tuberculis tota externa superficie obsitum erat. Similiter notatu dignam censemus eam, quam refert Ioh. Conrad. (c) Peyer. de corde, cuius inæ-

inæqualem superficiem carnei vel-
uti lemnisci externe cingebant. Sed
qualis huiusmodi interna nulla,
quod sciam, refertur ; ex quo sane
euenit, vt aperte doceamur, quid-
quid in physicis possibile est , ali-
quando contingere. Atque in hoc
(a) Plinius erroris non temere re-
darguitur, cum scriptum relique-
rit : *solum cor vitis non macerari, nec
supplicia vitæ trahere, lesumque mor-
tem illico afferre.*

histor.
Anat.
Med. in
schol.
cap. 6.

(a) Lib.
II. c.
42.

IX. Excitata vero iuxta cor putamus
sarcomata ista ex eadem causa , eo-
demq; modo, quo ea fiunt, quæ exte-
rius, ac præcipue in podice apparent;
scilicet ab inductis omnium primo
leuibus vlcusculis, aut rhagadibus,
paulatim discissa valuularum vasa
ob viscidulorum liquidorum inter-
ceptionem elongari, ac luxuriare
cœpisse, varieque inuicem compli-
cata in morbosa tubera adoleuisse.
Neque forsitan ambigendum de
tempore, quo ulcuscula, ac rhaga-
des excitari eo loco potuerint, cum

Horum
sarco-
matum
gene-
seos
modus.

principio morbi cor, diu humili-
ter, atque inæqualiter, pulsans, fa-
cultatem facile dederit sanguini,
erodentibus particulis referto, vt
mora sua labia valuularum exede-
ret. Quid? quod ipsæ quoque vi-
scerum, artuumque conuulsiones,
decursu morbi sæpe recurrentes,
liberum sanguinis fluxum a sinistro
cordis ventriculo per aortam (præ-
cipue descendentem, polypo fere
obstructam) in singulas partes adeo
interturbare potuerunt, vt, validius
repercussis cruoris undis contra
prædictas valuulas, forte suapte na-
tura graciliores, istæ tandem alicu-
bi findi coactæ fuerint.

*Duran-
tibus
valuu-
larum
sarco-
matibus
cur pul-
sus ple-
rumque
aqua-
les
persi-
terint.*

X. Quod vero pulsus, vel cum
enormi vitio prædictarum valuula-
rum, vt plurimum in Ægro æqua-
les obseruati fuerint, hoc factum
puto, quia istiusmodi sarcomata,
utpote mollia, tunc facile locum
sanguini cedebant, cum pleno im-
petu a corde propellebatur: vnde
minus resistentes mediam viam

omnino

omnino liberam aperiebant in aorta. Secus atque accidit, vbi cartilagineæ, & multo magis vbi osseæ occurrunt valuulæ, quæ, cum ordinariis impetibus sanguinis valide plerumque renitantur (non enim semper, scilicet cum maior viget in sanguine vis, vt in acuta feбри, non renitantur) illius per arteriam cursum cum pulsus inæqualitate retardant.

XI. Illud vtique huiusmodi spongiosocarnei valuularum lemniſci, mole aucti, patrare in Ægroto forsitan potuerunt, vt postremis vitæ diebus, dum propter expostam strangulationem præcordia contrahebantur, mutuo admoti, atque implicati, quasi aggerem excitarent contra cominus locata orificia arteriarum coronalium, sanguinemque ad cordis fibras per id temporis deriuari prohibuerint. Vnde lipothymias, ac syncopes, si non primum, ac principaliter inducere, saltem eousque producere

*Quomodo
do sar-
comata
produ-
cenda
syncopi
conspi-
raue-
rint.*

Qs

va.

valuerunt, donec, cessante spasmo recenter excussa sarcomata, ad factum spatium, proprio potissimum pondere a prædictis orificiis recederent, liberumque sanguini iter per cordis substantiam rursus permetterent, atque ad syncopis cessationem contraria prorsus ratione conferrent.

XII. Neque hic tacebimus, polypeam substantiam, quæ intra descendens aortæ cavitatem ex sæpisculis illius tubi contractionibus, & mora sanguinis concreuerat, pedum frigiditatem, atque œdemata, diminuto sanguinis ad extremas partes influxu, peperisse.

XIII. Dicendum aliquid superesset de dextero cerebri cortice, qui flaccidior, depressior, ac, sanguine etiam exundante, & concreto, gravatus occurrit; nimirum epilepticæ, an paralyticæ medietati corporis responderet? Et quanquam res, sub caluaria latens, summam obscuritatem, ac difficultatem inuoluat;

uoluat; tamen, cum, præter Hippocratis, Ballonii, Martiani, Malpighii, Valsalvæ, aliorumque eximiorum Virorum auctoritatem, ^{Dexterum cerebri hemisphærium} nostra quoque succurrant experientia, meam sententiam interponam; ^{sphærum sinistram, & sinistrum} probabile scilicet fuisse, dexterum cerebri hemisphærium sinistræ corporis medietati, & sinistrum dexteræ respondisse: ita ut ea corticis ^{dexteræ corporis medietati} pars, quæ gracilior, quæque, effuso pressa sanguine, inuenta fuit, ^{respondit} commercium habuerit cum sinistris artubus, motu, sensuque præditis; altera vero, quæ pene nullam, oculorum iudicio, labem in se continere videbatur, cum paralyti iam tentatis.

XIV. Ad huius vero asserti probabilitatem duo præcipue argumenta nos adducunt. Prius est, quod passim experimento docemur, percussos, nempe, vulneratos, vel abscessu aliquo tentatos in dextero, aut sinistro cerebri cortice, plerumque convulsionem; aut para-

*Huius
experi-
mento
agri
confer-
matur,*

paralyfim in oppositis artubus per-
peti. Posterius vero ex hac eadem-
met hypothefi deduci poffe vide-
tur. Etenim, cum Æger diu laffi-
tudine quadam vlcerofa, ac postre-
mo epilepticis quoque artuum me-
dietatis finiftræ fuccuffionibus af-
fectus fuerit, verofimile eft, illam
cerebri partem, quæ principium,
ac fons erat iftorum neruorum,
tempore mortis, magis in eodem
laceffitam fuiſſe, quam alteram, a
qua nerui pene mortui propagaban-
tur in dexteram, paralyfi detentam.
Atqui dexterum cerebri hemifphæ-
rium peſſime affectum, ac lacesfi-
tum, finiftrum vero nudis oculis
fere incolume inuentum eft. Id-
circo dexterum cerebri hemifphæ-
rium dolentibus, & conuulſis, fini-
ſtrum vero paralyſi tentatis artubus
conueniſſe, ac reſpondiſſe, dicen-
dum eft.

XV. Nec mouet, quod dexte-
rum cerebri hemifphærium, tabo
conſumptum, cum dextera medie-
tate,

tate, paralyſi affecta, congruere magis videretur, quam cum ſiniſtra, alioquin ſenſu, motuque prædita. Etenim, præterquam quod in præſenti caſu (vtrumque ab initio diſcrimen aliquod gracilitatis dexteros inter, ac ſiniſtros artus interſuerit) membra omnia pari tabo paulatim aruerant; illud maxime aduertendum in glandulis, ad quarum ordinem cerebrum refertur, eas graciliores euadere, atque inueniri ſolere, per quas fluida vberius ſecernuntur; eas e contrario pleniores, ſaturatioresque ſeruari, quæ diu a ſecretionis officio vacauerint. Exemplo ſint (præter thymum, & hepar in fœtu) mammæ, & renes, quarum ſane adenarum, ſi altera ab uſu defecerit, maior, & craſſior non minor, & gracilior deprehenditur. Cum igitur dexterum cerebri hemiſphærium ſiniſtro magis depreſſum, ſeu gracilius offenderimus, perſpicuum nobis præbuit indicium ad probandum, illi-

Glandule ſerius liqui- dum ſecernentes cur euadant graciliores, & conuerſo.

illius glandulas semel admissam
secretionem liquidi neruorum ali-
oquin acris, vsque ad extremum
vitæ diem, qua sinistrum longo
iam tempore caruerat, con-
stanter retinuisse.

26 (o) 26

OBSERVATIONES

Physico-Anatomicae

NONNVLLO RVM,

Qui primo impetu morbi repente per hæc tempora perierunt.

POST capita præliminaria de improuisis mortibus, eiusque causis, quæ istorum potissimum decursu annorum nobiscum adeo sæuiter egerunt, & post descriptos casus aliquorum, qui subitaneis cerebri, ac præcordiorum morbis tentati, per hæc tempora euaserunt; opportunum certe erit, ut descendamus ad observationes illorum, qui primo impetu morbi vitam repente cum morte commutarunt.

In iis autem commemorandis, illud in primis studebimus, ut historie medicæ singulorum, qui decesserunt, ea lege præfigantur extispiciis, ut non solum

Quo morbo
repente
dece-
dens
labo-
rauerit
maxi-
me sci-
endum.
(a) De
relat.
Med.
lib. 4.
cap. 7.

solum naturalis , sed præternaturalis quoque illorum hominum status legentibus praluceat. Mala enim , quæ mortem præcesserunt , manum quasi porrigunt ad illam inueniendam in cadaueribus causam , quæ , disrupto vitæ filo , animam diuulsit e corpore. Quo fit , vt merito (a) Fortunat. Fidel. scripserit illud etiam præstat nouisse , cum quisquam repente moritur , quam scilicet ægritudine ille correptus fuerit.

Deinde vero dabit spero veniam ingenuus Lector , si , quanquam ex defunctorum Medicis , Amicis , ac Necessariis integras tum naturalis , cum præternaturalis eorundem status historias haurire studuerimus , adhuc tamen alicubi mancas inuenerit , præsertim circa pulsuum anomalias ; ad eos enim , qui improuiso de medio tolluntur , neque Medici accersiri , neque , si accersiti fuerint , tempestiue solent accur-
rere.

Supereſt , vt aliquid circa scholiorum methodum admoneamus. In iis
ita-

itaque, quemadmodum curabimus, ut particularis cuiusque subitanea mortis causa extricetur, atque reluceat; ita non omnium symptomatum, quae singulos morientes vexarunt, rationes reddemus in singulis; ne scilicet, cum eadem ipsissima phaenomena in pluribus aegris observata fuerint, recoctam cum nausea crambem Lectoribus exhibeamus. Symptomatum idcirco Aetiologias hac illac nostris adspargemus in scholiis, ut, quae de industria deficiunt in singulis, desiderari vix possint in omnibus.

OBSERVATIO I.

*Repentina mors ex apoplexia synco-
pali in Viro obeso, & caccho-
chymo.*

HISTORIA.



Antonius Maria Brilli Ro-
manus, quinquagenario
maior, famulorum Emi-
nentiss. Cardinalis Sacripantis deca-
nus, obesi admodum habitus, vini, &
coniugalis veneris intemperans;
cum ante annum vagis circa pectus,
ac diaphragma doloribus tentare-
tur, graui anhelitu, & omnigena
pulsus inæqualitate vrgeri cœpit.
Deinde vero vrinarum sensim in-
opia, ac pedum tumore laborans,
futuræ speciem hydropis exhibuit;
variis propterea pharmacis, & præ-
sertim oxymellite scillit. ac stoma-
chicis refermentantibus curatus,
rursus lotii copiam obtinuit, aper-
toque in crure fonticulo, melius
se habuit.

II. Sed quanquam ad Aulæ officia, post multos menses rediisset, prauo tamen colore foedatus per accliuia anhelabat, atque iisdem pulsum anomaliis perpetuo detinebatur. Tandem die 15. Ianuarii 1706. nocte media, expergefactus, purpurinam quandam totius corporis efflorescentiam, instar morbi, qui a Medicis appellatur, *effere*, ingenti cum pruritu, & calore, *Fune-
stissima
effera-
rum ad
interio-
ra re-
pulsio.* summopere molestim persensit, a qua, vt alleuiaretur, e lecto surgens, fenestram, sese frigidissimo expositurus aëri, imprudenter aperuit; exinde decubitus, qui vtiliter exterius factus erat, pessimo fato interius repulsus, e vestigio brachii sinistri torporem induxit. Neque interim æger, iis auscultans morbi vocibus, vllam sibi medellam adhiberi curauit; sed postridie Aulam adiuit, & Eminentissimi Purpurati currum pedibus cum cætero famulatu sequutus fuit, vt tandem viribus fractus, hora 23. cum

mortuus fuerit in via, quæ Parionis dicitur.

CADAVERIS DISSECTIO.

TRansactis viginti quatuor horis, cadauer in Theatro Romani Archilycei, coram Excellentissimis Viris, ac Doctoribus Luca Tomasino Protomedico Generali, tribus Consiliariis, scilicet Iacobo Sinibaldo, Antonio Placentio, & Ioh. Trullo, duobus Medicis Sacri Palatii Apostolici Michaeli Angelo Pauli, & Casparo Reali, & publico Anatomes Professore Alexandro Pascolo, vna cum Physico, & Chirurgo Carcerum Ioh. Latino, & Bartholomæo Simoncello, qui publicus alioquin est Anatomes Minister, a quo, adstantibus etiam Curix Iudicibus, & Scribis, multoque concurrente Studiosorum numero, dissectum fuit.

*Ex ca-
daue-
rum fa-
cie*

II. Et quoniam externa quoque Cadauerum facies nos aliquando
eru-

erudire solet; idcirco in primis ad-^{quan-}
uertimus, vniuersum corpus mire^{doque}
obesum, & pallidum, vultum au-^{Medi-}
tem obscure adhuc ingenti cum tu-^{cus eru-}
miditate rubentem occurrisse; ex
quo factum est, vt, antequam, de-
tracta caluaria, ipsius cerebri status
nobis innotesceret, rumoris nescio
quid afflauerit in Theatro, aliqui-^{Effusus}
bus sanguinem, e vasis large effu-^{sub}
sum, sub cranio inuentum iri au-^{Cranio}
gurantibus. Sed o vana, & incer-^{sanguis}
ta iudicia hominum, quorum lin-^{pro}
gua oculos, mentemque præcur-^{mortis}
rit! ^{causa}
^{perpe-}
^{ram}
^{hic ac-}
^{cusatur}

III. At vero, vt rem consueto
perficeremus ordine, abdomen
principio secuimus, quod multo
adipe refertum erat. Zirbus, ob-
structis suis glandulis, crassiuscu-
lus. Intestina tenuia, venis sangui-
ne tumentibus aliquantulum ru-
bentia. Ventriculus prægrandis, &
laxus. Lien naturali mole maior.
Hepar paulo auctius, sed colore
prope naturali, cuius inte-

*Puo, &
Ulcer
in Cysti
fellea
depre-
hensa.*

rim Cystis, cum forinsecus albicans obseruaretur, exactiori locum fecit examini; postquam vero illam aperuimus, non bilem, sed verum pus continere, atque interna sui superficie variis vlcusculis laceram, raro quidem exemplo, deprehendimus.

*Summa
cordis
ampli-
tudo.*

IV. Ab ipso deinde abdomine in thoracem per amorum sternum reſerata via, ſtatim multa circa pericardium flauſcentis adipis copia, (qua cordis quoque baſis grauabatur) ſe obtulit. Pulmo ſolito depreſſior. Cor vero prægrande inuentum eſt. Dexterâ auricula cum appenſa vena cava, quæ modicam nigri ſanguinis quantitatem continebat, duplo certe naturali diametro amplior apparuit.

V. In ſiniſtro ventriculo maxima picei cruoris moles claudebatur. Arteriæ pulmonica, & aorta, finitimæque cordi tracheales partes multo adipe reſertæ, glandulisque quibusdam obſeſſæ, mutuum niſum,

sum, & compressionem ostendebant.

VI. Tandem, cum ad Cranii sectionem Chirurgus accederet, scissis, diductisque tegumentis, super dexterum latus ossis sincipitis offendit in Cranio foramen, per quod, (cum pericranium duntaxat aditum intercluderet) maius specillum ad usque duram Meningem, alioquin laxam, facile intulit; atque, eleuata caluaria, cuniculum illum intra ossis lamellas a generationis forte primordiis fuisse refferatum, inde iudicauimus, quod orbiculus non asper, sed læuigatus inuentus fuit. Cæterum in superficie cerebri subobscura vasorum sanguineorum turgescencia, & modica quantitas turbidi seri in ventriculis spectabatur. Sinus longitudinalis, & laterales, atque ii etiam, qui ad cerebri basim positi sunt, nigro sanguine tuebant, vt non fuerit dubitandum, quin solito maior cruoris

*Dura
Meningis
laxitas.
Cranii
foramen
for
san
inna-
tum.*

dimidia diei 17. Ianuarii , repente
quantitas intra cranium intercepta
fuiſſet.

SCHOLIUM.



N huius vestibulo ſcholia
opportune occurrit confi-
lium, vere ſapiens , ac re-
ctum, quo Guilielmus ^(a) Ballonius
Medicos admonet, vt caueant præ-
dicere, ſe deprehenſuros aliquid in
capitibus illorum , qui ex cerebri
morbis interierunt. Etenim, cum
vna, eademque affectio a variis, at-
que inter ſe non diuerſis modo, ſed
ſæpe contrariis, diuerſeque operan-
tibus cauſis oriri poſſit, raro fit, vt
Medicus illam, quam incaute præ-
cecinerat cauſam, in diſſectione ca-
daveris inueniat. Quod ſane ex-
tiſpicii huius teſtimonio omnium
cum admiratione comprobatum
fuit; nullum enim effuſum in cere-
bro ſanguinem offendimus , quem
aliqui adeo confidenter prædixe-
rant. Igitur, vt nos cauti fuimus
in prænunciando, ſimiliter in hu-
iufce

(a) In
com-
ment.
& an-
not. ad
hiſtor. I
l. 2.
conſil.
Medico
cur.
multa
opus ſit
cautela
in præ-
dican-
dis in-
teriori-
bus ca-
dave-
rum læ-
ſioni-
bus.

iufce fubitanæ mortis caufis euoluendis ab erroris periculo longius abeamus, e re arbitramur annua
 iſtius Ægri mala diligenter inueſti- *Mala, que mortem præcedunt, diligenter inueſtiganda.*
 gare: quo namque remotiores ab
 obſervantium oculis repentinorum
 mortium cauſæ in diſſectis cadaue-
 ribus eſſe videntur; ita curioſiorem
 diligentiam poſtulant, vt eruantur,
 & pateſiant. Porro nonnulla in-
 uenta, etſi non raro in extiſpiciis
 nihili fiant, ex quo apud minus
 verſatos in rebus anatomicis mini-
 ma putantur; ea tamen magni
 æſtimanda ſunt, quoties cum lan-
 guidulis viſcerum fibris luſtari, mi-
 nimisque vaſorum anguſtiis inter-
 cipi potuerunt.

II. Primo itaque extra omnem *Series morborum ſubitam necem præcedentium.*
 dubitationis aleam poſitum per hi-
 ſtoriam cenſeo, hominem hunc ab
 anno ex cachexia valetudinariam
 vitam duxiſſe, cum labefactato fi-
 brarum tono, & cum degeneribus
 a naturali craſi fluidis, quæ ad vi-
 ſcido-acrem naturam euecta erant.

III. Secundo ex cadaueris dissectione constitit, Ægrum loco cysticæ bilis, quæ balsamico-amari-cans esse debet, acro-putridum pus multo prius, quam diem suum obiret, fouisse; non enim vlcera momento temporis ab erodente liquido visceribus insculpuntur. Hoc autem pus facere non poterat, quin, euerso naturæ ordine, chylum non modo non defæcaret, sed exoticis particulis imbueret, nouamque labem sanguini iugiter communicaret.

IV. Tertio his addamus ex historia, Ægrum eo tandem peruenisse, vt acria corpuscula, iisque commixtam sulphuream lympham (erat enim vinosus) plene cumula-uerit, quæ profecto corpuscula ab vniuerso suorum vasorum, ac vlcerum fibroso genere, inducta irritatione, ad externa corporis sub forma esserarum propulsa fuerunt; cui sane propulsioni, nisi Ægrotus intempestæ noctis frigore imprudens fuisset

fuiſſet obnixus, procul dubio inde *Ex re-*
 leuamen accepiffet. Sed, cum iſtiſus *pulſis*
 critici decubitus materies intra va- *efferis*
 ſa repulſa, atque in cerebro, & ſpi- *brachii*
 nalis medullæ principio intercepta *torpor.*
 fuerit, ſiniſtri torporem brachii
 produxit, qui, ex tempore ſolutus,
 indicium præbuit, ignem non ex-
 tinctum, ſed doſo in cinere latu-
 iſſe ſepultum; cauſam nempe mor-
 bificam e corpore nequaquam edu-
 ctam, ſed partim ſanguini confu-
 ſam, partim viſcerum folliculis in-
 terceptam delituiſſe.

V. His vero poſitis, facile eſt
 coniicere, cauſam ſubitanæ huius
 mortis fuiſſe copiam craſſeſcentis
 ſanguinis, & ſeroſitatis, quæ qui-
 dem fluida oleoſo-volatilibus parti-
 bus deſtituta, & fixis ſalibus redun-
 dantia, propriæ fluxilitatis inopia
 per meningum arteriolas, per ſi-
 nus, ac per reliqua cerebri vaſa hæ-
 rere cœperunt: vbi, debilitatis, ob
 ſpirituum paucitatem in violento
 etiam corporis motu erogatorum,
 fibris

*Vnde-
nam
syncope
morti-
fera in
hoc Æ-
grota-
nte.*

fibris muscularibus duræ matris, ac villis omnibus corticem cerebri, ac cerebelli intertextentibus; & induc-
ta ob sanguinis remoram tam pres-
sione supra fibras, & glandulas eiuf-
dem corticis, quam obstructione
intra oscilla secretoria liquidi ner-
uorum, repentina suborta est syde-
ratio liquidorum, & solidorum in
cerebro, quam fortissimam dicimus
apoplexiam cum mortifera synco-
pe, quæ nostro in casu corripuit,
non solum propter deficientem de-
scensum spirituum a cerebro, & ce-
rebello in cor; sed propter con-
currentem renitentiam ad motum
crassi, & resinosi sanguinis, per ca-
uitates cordis tunc temporis deuo-
luti.

*In hoc
excita-
ta fe-
bris*

VI. Hoc autem inde arguitur,
quod isto in homine lymphæ visci-
dulo-acris, quæ per duos dies ante
obitum *efferas* produxit, cum a suc-
cutaneo organo intempestive repul-
sa fuerit, nullam excitauerit febrim,
qua aut cum cæteris massæ princi-
piis

piis exacte , atque impune rursus *subitam*
 commisceri , aut per alia secernicu- *mortem*
 la vtiliter trudi potuisset. Factum *forſan*
 proinde eſſe videtur, vt fluida, dis- *auer-*
 sipatis poſtridie per laborioſum pe- *tiſſet.*
 deſtre iter volatilibus particulis,
 quibus vtcumque, in cerebro præ-
 fertim, fluxilia reddebantur, ex tem-
 pore ſubſtiterint, inductaque para- *Para-*
 lyſi in meningibus, ac tota cerebri *lyſis*
 ſuperficie, inuincibilem , quam *n. em-*
 fortiſſimam dicunt apoplexiam, (a) *brana-*
 Senibus alioqui familiarem, pepe- *rum, &*
 rerint. *corticis*
cerebri,
ac cere-
belli.

VII. Firmant deinde noſtras a *(a) 6.*
 priori coniecturas ea, quæ in ca- *aph. 57.*
 dauere palam occurrerunt. Quid
 enim aliud tumida, & ſubruſa vul-
 tus, & meningum ſpecies? Quid
 ſanguineorum vaſorum in vniuerſa
 cerebri ſuperficie turgelcentia?
 Quid ſinus omnes, nigro ſanguine
 oppleti, demonſtrauerunt, niſi ma-
 ximam fuiſſe aucteri, minusque mo-
 bilis humoris quantitatem, quæ in-
 tra cranium intercepta, tum cir-
 cum.

cumpellentium fibrarum tonum eneruare, cum vel maxime secretrices cerebri glandulas oppido premere, ac valide obstruere potuit; vnde lethalis spirituum animalium inopia inducta fuit; præsertim cum apertissime constiterit, plus acrium serositatum, & viscidorum humorum, quam oleoso-volatilium particularum diu ægro in corpore redundauisse?

Cranii foramen an duræ matri infirmamanderit. VIII. Hoc tandem breuiter admonemus, non frustra aliquem suspicari posse, num repertum in cranio foramen, ad infirmandum robur duræ matris conferre aliquid potuerit. Etenim apud hominem, qui fere semper pro suo munere ad obsequia, nudato capite, incedebat, cuniculus iste aëri, aërique innatantibus corporibus forte minus, quam natura postulat, obnitebatur. Si quis enim ab Ægro, dum adhuc erat inter viuos, sciscitatus fuisset, an aliquam sub perforato cranio in magnis temporum mutationi-


tionibus molestiam persensisset, *Cranio*
 eam probabiliter falsum fuisse, in- *ob si-*
 de arbitramur, quod, qui ex siphil- *philly-*
 lyde cranii desquamationem passi *dem de-*
 sunt, fere semper de læsione ab ex- *squa-*
 terno frigore conqueruntur, cere- *mato,*
 brique mala facillime subeunt. *Cere-*
brum

IX. De cætero viderint alii quæ- *facile*
affici-
tur.

nam extiterit origo raræ illius exul-
 cerationis, quæ in cysti fellea in-
 uenta est. Nos enim, qui huius
 primordia ægritudinis penitus igno-
 ramus, illud hic pro coronide tan-
 tummodo adiicimus, sæpe detexis-
 se morbidam quasi radicem, vel sal-
 tem coniunctam propaginem earum
 spirandi difficultatum, quæ, ex hy-
 pochondriis ortæ, ad hydropem
 tendunt, in ipso fellis folliculo al-
 te implantatam; modo nimirum in *Cystis*
 lixiuiali, fluidaque nimis, modo in *fellea*
 tenaciori, atque in lapides conuer- *Sitia*
 sa bile, ut non sit dubitandum, quin *multo-*
 ritium tam enorme ipsius cystis *rum*
 felleæ ad morbos istius Ægri maxi- *peccoris*
 me conspirauerit. *morbo-*
rum ra-
dix.

X. Ne-

X. Neque similiter immoramur in persequendo impedimenta præcordiorum, ac præsertim arteriarum pulmonicæ, & aortæ, partiumque trachealium, multo adipe, auctisque glandulis obfessarum: non enim causas inquirimus annui anhelitus, pulsusque inæqualitatis, quæ a præternaturali, mutuoque vasorum nisu pendere potuerunt.



OBSERVATIO II.

Subita Mors ex syncope ob cordis magnitudinem, prolapsum, atque aneurysma.

HISTORIA.

FAmulus olim cursor Illustrissimi Marchionis Spadæ junioris, nomine Philippus Turci Romanus, annorum circiter viginti quinque, habitus gracilis, staturæ mediocris, pallidi coloris, anhelitu in leuibus etiam corporis motibus detineri solitus, ante annum

num laboravit suffocatiua angina,
a qua, ter misso intra dici spatium
sanguine, liberatus fuit, superstiti-
bus tamen maiori semper spirandi
difficultate, & recurrente interdum
cordis palpitatione, præsertim cum
citato gressu ambularet, vna cum
sepulto præcordiorum angore, &
quodam pulsatili pondere supra di-
aphragmatis centrum. Quæ qui-
dem mala eousque adaugebantur,
vt illum, vel inter comedendum,
atque ab assumpto potissimum cibo,
deterius haberent. Hic, die 4.
Februarii ineuntis huius anni 1706.
tamen si mane faucium phlogosi, &
quibusdam ad usque collum, & iu-
gulum exporrectis contractionibus
detineretur, pedibus nihilominus
Herum suum per quingentos circi-
ter passus prosequutus fuit. Domi-
no vero alicubi diutius forte mo-
rante, ipse cum socio in caupona
large, ac sine delectu comedit, ac
bibit; deinde domum reuersus post
horam, cum frigore corriperetur,
S apud

*Series
sympto-
matum,
qua
cordis
magni-
tudini-
nem, &
prola-
psum
osten-
dit.*

apud foeminam se recepit, calefaciendi causa ad ignem, qui semi accensis carbonibus medio ardebat in cubiculo, vbi paulo post (forte an etiam ex œstro venereo?) leuissimum capitis debilitate, deinde frontis, totiusque corporis madore cum vehementissimo anhelitu, cordisque angore, tandem syncope, in mortem statim desinente, correptus fuit.

CADAVERIS DISSECTIO.



Perto abdomine, intestina tenuia aliquantulum subrufta; cætera vero naturalia viscera a nativo statu parum recessisse, præterquam paulo turgidiora, ac veluti murice subincta visa fuerunt.

II. Morborum, & ipsius necis sedes apparuit potissimum in thorace, quo referato, pulmones subalbidi, & dexter eorum costis legitimis tenaciter adhærescens, oculis adstantium sese obiecerunt.

III.

III. Fauces rubore perfusas, asperam arteriam substantia gelatinæ non absimili, fuligineo tamen, ac subnigro interius colore refertam, cernimus. Rami bronchiales phlogosi pariter, ac veluti asperitate quadam laborabant.

IV. Cor mole triplo naturali maius, vaccinum certe superabat, cum, ablato pericardio, & expresso omni cruore, pependerit in lance libras duas & semis. Hoc sane viscus supra diaphragma ceciderat, ac proinde œsophagum, aortam, ac ventriculum facile premebat.

V. Deinde, etiamsi externa facie naturalem servare videretur figuram; sectum tamen novam philosophandi materiem solertioribus naturæ Vestigatoribus præbuit; auricula enim, & ventriculus dexter, sanguine varui, sed ordinariæ diametri, contra vero sinistræ cavitates nigro plene cruore, & duplo dexteris latiores

*Cordis
mole
aucta,
& pro
lapsus
in dia
phra
gma.*

*Sinister
cordis
sinus
duplo
maior
dextero*

occurrerunt. Arteria magna iuxta cor pariter perampla.

VI. Secto cranio , pia mater cum vasis solito tumidioribus se nobis præbuit. Cortex cerebri in superficie vtriusque hemisphærii versus posticam partem calloso quodam glutine tenaciter duræ matri adhærebat. Plexus denique constabant ex vasis sanguine plenioribus.

SCHOLIUM.

NE prolixitas morosa, neue breuitas in hac attingenda ætiologia euadat obscura; sedulus Lector primo distincte, mox vero promiscue animaduertat, primo natium Ægri temperamentum, & gravissimos morbos, quibus miser homo per annum ante mortem torquebatur; secundo proximas necis occasiones; tertio ea omnia, quæ in illius cadauere obseruata fuerunt. Hæc enim, spero, satis luminis accendent, vt claras subiti

subiti huius interitus rationes videre possit.

II. Quanquam vero singulæ affectiones, & causæ, quæ Ægrotum hunc detinuerunt, diuisis suarum virium momentis præcocem, subitamque necem afferre vix potuissent; vniuersæ tamen, momento composito, eandem facillime induxerunt. Quod sane minime arduum videbitur, si quot, & quomodo istiusmodi causæ ad supremam, atque inopinatam Ægri perniciem conspirauerint, diligenter expendamus. Non enim vna, eaque *Multiplex huius* simplex, aut interna solum causa, *impro-* sed multiplex, & tum externa, cum *uise* interna, vetus, ac recens ad *necis* improvisum illius interitum coniu- *causa.* ravit.

III. Hoc sane euidenter constabit, si duo ante omnia, quippe quæ *Ipsarum* admodum probabilia, aduersam *enumeratio.* istius valetudinem præcessisse intelligamus; alterum natiuum eiusdem temperamentum acrobiliosum,

*Præcor-
dia in
Curso-
ribus
curfa-
cile la-
befa-
ctan-
tur.*

vna cum solito grandiori corde, ac paulo debiliori textura sinistri ventriculi, atque aortæ, quæ fane res hominibus, præ cæteris animalibus, non raro contingunt; alterum vero aduentitium, nimirum intemperans, atque intempestive exagitatum Cursorum vitæ genus, per quod non tantum fluida ad acro-volatilem naturam in gracilibus præsertim corporibus euehuntur; sed aëris quoque viæ, & pendulum intra thoracem cor perpetua concussione, ac diuulsione labefactantur. Ita certe clara habebimus principia, vnde causas deriuemus non modo suffocatiuæ anginæ, sed, quod caput rei est, lethalis prolapsus, & aneurysmatis cordis. Cum enim præcordia per arterias clauiculis, axillis, & collo, perque reliqua vasa pulmonibus alligentur; cumque pulmones per asperam arteriam, ac per laryngem, veluti per funem, a iugulo, & faucibus propendeant; facile est concipere, in-

fir-

firmiora ex angina, & magis adhuc ex fluidorum acredine, & cursorio vitæ genere reddita huiusmodi suspensoria, ægrius postmodum valuisse ad renitendum descensui præcordiorum, quæ, solito magis ex mole grauitantia, suis etiam relaxatis, ex eisque proximioribus membranarum funiculis, necessario ex lege grauium supra diaphragma lapsarunt.

*Mechanicus
cordis
prola-
bentis
modus.*

IV. Cum vero multarum officia partium apud animalia regantur, aut offendantur mutuo contactu, ac nisu, vel diuisione, ac dissociatione; vtique fieri non potuit, quin, grauitante corde præter naturæ ordinem supra diaphragma, & diaphragmate supra stomachum, inde non solummodo respiratio læsa, sed, tumente ex cibis ventriculo, arteria magna descendens (quæ septum transuersum sub corde perforat, & stomacho substernitur) valide compressa fuerit. Hinc fiebat, vt sanguis, impedita libera sua traiectione,

*Cur
maxi-
me ab
assum-
pto cibo
respira-
tio, &
cordis
palpi-
tatio in-
grau-
scent.*

ne, ac deuolutione per inferiores arterias, necessario quoquo modo alterne repelleretur versus superiores arterias, atque in eundem finistrum cordis ventriculum, a quo vicissim fuerat extrusus: ibique arietatio quædam nixus trudendi, ac renixus trusi iam cruoris ab assumpto potissimum cibo (quo sane tempore ventriculus aortam valentius premit) sub angoris, ac palpitationis specie proficiscebatur.

V. Et quoniam ex hac vna radice præpediti motus liberi sanguinis per descendentes arterias sexcenti malorum frutices germinare potuerunt; mirum sane haud erit, si nos inde principium deriuemus dilatationis tum arteriæ magnæ, tum vel maxime sinistri cordis ventriculi (quas quidem partes natiua debiliori texturâ laborare posuimus) nec non adhæSIONUM pulmonis, congestionis lymphæ in cerebri superficie, tandemque, concurr-

renti-

rentibus externis causis , etiam subitæ mortis.

VI. Etenim , cum clare constet *Morbo-*
ex hydrometricis principiis , impe- *le præ-*
dito , vel diminuto ex communi a- *cordio-*
liquo alueo per vnam , vel alteram *rum*
fistulam aquarum excursu , illico *dilata-*
in proximos canales lymphas ma- *tione*
iori copia deriuari , atque conflue- *origo*
re ; immo easdem lymphas , ad ra- *princi-*
tionem impediti liberi excursus , ad *piæ hy-*
ipsum quoque alueum reflecti ; vt , *drome-*
quæ successiue fluxuræ essent , in *triciæ*
eodem parumper subsistant ; satis *illustra-*
dilucide apparet , cur in homine *tus.*
isto cruoris excursus , per inferiores
arterias ob expositas compressi-
ones alterne diminutus , alterne
pariter maiori copia , & vi versus
cor , & in superiores arterias fuerit
deriuatus ; facileque propterea non
solum faucium phlogoses , & capitis
congestionem induxerit ; sed etiam
in sinistro cordis alueo dilatatio-
nem , si non primum producere ,
saltem adaugere potuerit.

*Sanguis
Intra
compressam ar-
teriam
Violen-
ter tru-
sus, cu-
nes po-
tentiam
induit,*

VII. Porro cum fluida, præsertim incompressilia fere induant naturam solidi, quotiescunque in angustum alicubi tubum violenter, ac pertinaciter vrgentur: idcirco planum est intelligere, sanguinem, cum a corde violenter intra compressam arteriam truditur, vectis, cuneique potentiam induere, tanto quidem maiorem, quanto magis locali eiusdem motui acutæ durorum salium figuræ copulantur. Nihil igitur mirum, si apud hunc Ægrum, ex impulso sanguine intra impeditam aortam, eoque reuerberato versus semilunares valuulas, idem truncus, & sinister cordis ventriculus (textura alioqui debiles) dilatati fuerint; distractiux namq; percussione, ac repercussione vi adiuncta fuit in sanguine energia cunei erodentium salium, qui fibrosum earundem cauitatum contextum, repetita toties extrusione vltius debilitatum, paulatim diloricare potuerunt; quibus factum puto, vt,

viscus

viscus hoc, (remorante etiam sanguine in minimis coronariis, proximisque distendarum fibrarum spatiosis) grauius semper, ac maius euaserit, sui que idcirco prolapsus, & septi transuersi, aortæque compressionis causam longe magis adauerit.

VIII. At vero, cum ex hydro-
metricis sectiones inæquales vasorum, per quæ fluida mouentur, eorundem fluidorum velocitatibus sint reciprocæ, sequitur, vt, eneruatis fibris impellentibus, si læuæ cordis cavitates duplo maiores dexteris detectæ fuerunt, duplo etiam tardior extiterit motus sanguinis in sinistris, quam in dexteris; eoque magis, quo distracta, & ampliata sinistri ventriculi latera in qualibet systole ad mutuum peruenire contactum, omnemque a se cruorem in aortam expellere, atque elutriare nequiuerint, quo, sane copiose subsistente liberis tum ipsius cordis motibus, tum influentium a pul-

(a) Be-
ned.
Castell.
in de-
monst.
mens.
aquar.
current
prop. 3.
Conie-
ctura
de tar-
diori
sanguis-
nis mo-
tu per
aneurys-
mati-
cum la-
uum
cordis
sinuum.

*Exposita
con-
iectura
novis
ratio-
nibus
confir-
matur.*

pulmone liquidorum vndis, noua
semper augebatur renitentia. Ex-
inde maxima eruitur causa tum se-
pultæ præcordiorum angustia, &
grauitatis, qua postremo æger
decessit, cum inuentæ in cadauere
stagnationis sanguinis intra sini-
strum duntaxat ventriculum. Et-
enim cum eo res in Course isto
deuenit, vt simul conspirauerint
minor animalium virium potentia
ad constringendum cor, & maior
cordis ob adauctum suum pondus
renitentia ad motum, tunc hercle
vires circumpulsuæ in cordis ven-
triculis ad eam rationem, & inter
se, & cum contentis cruoris moli-
bus peruenire debuerunt, quam in-
uicem habebant sectiones cauita-
tum, & resistentiæ vasorum. Sed
quoniam dexter ventriculus natu-
rali diametro donabatur, & pulmo-
num vasa nullo apparenti vitio af-
ficiebantur: sinister vero sinus du-
pla diametro laborabat, & arteria
magna perampla ab ipso corde, &
stoma-

Stomacho valide premebatur. Idcirco apud Ægrum superstes maior vis in dextero cordis ventriculo minorem sanguinis quantitatem libere, maioriq[ue] velocitatis gradu in pulmonica vasa impellere potuit. Contra vero sinister ventriculus propter minorem ex dilatatione vim maiorem sanguinis molem in præpeditam aortam expedite trudere prohibebatur ; quæ certe cruoris remora præcordiorum angustiam, tandemque mortiferam suffocationem, ac syncopem induxit.

IX. Neque vero hic animus est longius persequi rationes diuersarum lymphæ concretionum, quæ a salino-acrium cum oleosis miscella particularum in locis minoris motus, aut maioris impedimenti apud valetudinaria corpora, & nostrum præsertim Ægrum, tum in pulmone dextero, cum in supremo cerebri cortice contigerunt. Etenim satis ex Chymicis tentaminibus innotescit, acria, sulphureis admixta, inui-

*Lym-
phæ con-
cretio-
num
causa
ex chy-
micis.*

inuicem coalescere, præsertim apud vinosos: vnde spiritum vini cum vrinæ spiritu in tenax corpus facillime abire videmus.

X. Cæterum, vt omnes huius necis causas breuiter perstringamus, repetere cogimur ex cerebri vitio minus spirituum, quam naturalis huius hominis postulabat œconomia, aliquanto prius tempore mortis secretum fuisse; vnde virium debilitas, ex præcordiis orta, maior adhuc reddebatur ex diminuta per cerebri corticem liquidi animalis separatione, quæ ob callosum inuentum eiusdem glutinem vltro se nobis obtulit. Factum proinde fuit, vt ad repentinum interitum Ægri simul conspirauerint primo noua partium salino-acrium in fluidis exaltatio, quæ ex postrema faucium phlogosi apertissime innotuit; secundo motus corporis, dum quiete indigebat; tertio ingluuies, & vini abusus, cum diætâ opus erat; quarto suffocatiua bronchiorum ir-
ritatio

*Causarum ad hanc subitam necem conspirantium epi-
logus.*

ritatio ex carbonum fumo, qui in ^{Fuligi-}
cadauere per fuligineum trachea ^{nus}
colorem in apertum se dedit; tan- ^{trachea}
dem (si forte accesserit) veneris æ- ^{color ex}
strum, quod spiritus maximopere ^{fumo}
impuros, ac perturbatos in nouum, ^{carbo-}
atque omnino improporcionatum ^{num.}

motum circa præcordia agere po-
tuit. Vnde cor ipsum, suapte na-
tura magnum, &, sanguine sub-
stante, grauius redditum, ob exi-
guas animalium spirituum vires ab
omni penitus motu constantissime
defecit.


XI. Sed, ne hic longe de scholii
cancellis abire vererer; profecto
exemplis etiam ostendere possem,
quam facilis via sit ad præcocem, in-
opinatamque mortem nimis aucta
cordis moles, eiusque prolapsus.
Vnum tamen casum, nostro quippe
simillimum, a ^(a) P. Marchetto de- ^{(a) Ob-}
scriptum, coronidis loco afferre li- ^{ser. 49.}
ceat. Venetus quadragenarius, cra-
pulæ deditus, anhelitu, & hypo-
chondriorum angustia detentus,
multis

multis frustra adhibitis remediis, Patauium petiit, vbi postera nocte repente obiit, in cuius cadauere nihil præter naturam intra abdomen se prodidit; verum in thorace cor adeo amplum obseruatum fuit, vt tria naturalis magnitudinis æquaret; ventriculis itidem amplissimis, cuius capsulæ vbique pressius adhærebat; superioribus, ac lateralibus partibus pleuræ etiam adnexum; inferiori vero eidem diaphragmati. Scilicet, vt minime sit hæsitandum, adauctam cordis molem, situmque ex prolapsu vitiatum, ad repentinam denique mortem conducere.

*Cordis
prola-
psus
quando
que hy-
dropis
speciem
induit.*

XII. Quod si vero malum hoc corripiat hominem, in victu, ac motu satis temperatum, tandem hydropis speciem induit, pedum oedemate, nocturna ortophnæa, carotidum palpitatione, vrinarum paucitate, atque angore paulatim inductis. Nec interim deerunt forte Medici, qui, huius ignorata morbi radice, non hydragogis modo, sed


sed multis vesicantium, vitionum-
que tormentis Ægros extorqueant.
Verum de iis fuse in nostro de A-
neurysmatibus Tractatu.



OBSERVATIO III.

*Cita mors ob interceptum motum aë-
ris, & sanguinis in præcordiis,
una cum cerebri consensu.*

HISTORIA.

 Ohannes Baptista Auan-
zius, octodecim annos na-
tus, D. Cæcilæ de Nobili-
bus tamulus ex ora maritima Ro-
manæ ditionis malam circa præte-
ritum autumnum reportavit vale-
tudinem; hinc prauo vultus colo-
re cum anhelitu laboriosam vitam
Romæ ducebat, improbaque victus
ratione vsus, cum plane imbecil-
lis esset, tamen adhuc seruiebat;
præcedenti suum interitum vesperi
larga castanearum copia se ingur-
T gita-

gitavit, noctemque proinde valde molestam ex spirandi præsertim difficultate transegit; & in ea quidem, post vomitum viscidorum humorum cum melius habere crederetur, mane tamen , quæ fuit 3. Febr. 1706. mortuus repertus est, e cuius ore spumosa lymphæ , ut ex naribus filamenta sanguinis pende-
bant.

CADAVERIS DISSECTIO.



Adaver post 24. horas inventum est cum latice sanguineo , ex sinistra nare profluente, & cum thorace solito elatiori, ac tumidiori. Sectis tegumentis, occurrerunt intestina tenuia aliquantulum rubicunda , & intra abdomen modica quantitas feri sanguinei. Lien prægrandis, ac plumbeus , ponderis exacte librarum quatuor cum dimidia. Hepar sanum dixisses, si bilem subviridem sua in cystide contentam excipias;

ciplas; cætera naturalia viscera vix cum notabili labe inuenta.

II. Eleuato sternò, serum in vtraque pectoris cauitate magna copia offendimus, & pulmones, costis colligatos, non ordinaria quidem superficierum cohæsi-
Tendineæ fibræ pulmones costis colligantes.
 one, sed per albas quasdam, teretes, ac vere nerueas fibras, quas, oculo iudice, tendines putauisses. E cordis vasis, & cauitatibus sanguis nigerimus extractus est, grumis non in vnum tenaciter coagulatis, sed atra cum tinctura diffluentibus. Dexterum cordis sinum insignes poly-
 pi, certe plus vncia pendentes, fere vniuersum opplebant; sinistrum vero exiguus occupabat. Cordis, pulmonumque parenchymata summo-
 pere flaccida tractabantur.

III. Digni quoque animaduersione fuerunt pulmones, qui, manu pressi, vt a colligatione cum
*Latex a compressa pul-
 monis superficie manans.*
 costis diuellerentur, cruento latice per dehiscentes quosdam in superficiei meatus facile manabant.

IV. Circumsecto cranio , & dura matre, pia occurrit , solito rubentior , turgidis sanguine vasis. Quinimo cerebri superficies, diductis duobus hemisphæriis, vsque ad corpus callosum eadem tincturalaborabat. Apertis ventriculis anterioribus, serum limpidum effluxit, & plexus, qui intus serpunt, ex vasis solito tumentioribus constabant. Transuersales quoque duræ matris sinus nigro sanguine opplebantur.

SCHOLIVM.

Dubium sane in primis oriri posset , an mors ista pure subitanea dicenda fuerit, quippe quam longus integræ fere noctis agon præcessit; sed, cum dissectum cadauer quædam animaduersione nostra ostenderit non indigna ; idcirco promiscue citum hunc cum aliis improuisis interitibus vsurpabimus.

II. Illud utique non dubium est, huius mortis causam fuisse interclusam penitus circulationem sanguinis in præcordiis, & cerebro, quam magnus Hippocrates sub genere fortis apoplexiæ comprehensam quoque voluit, ut optime philosophatur egregius ille Hippocraticæ doctrinæ assertor (a) Martianus, ubi (a) In ostendit, aliquando apoplexiam fieri interceptis vasis in Thorace; ^{com.ad} quia scilicet animaduertit iis in par- ^{tex. 2.} mor-
tibus maxime apparere effectus interclusionis, difficultatem scilicet respirationis, & angustiam. Hinc ^{Apople-} alias citatus eruditissimus Fracassa- ^{xia ob}
tus apoplexiam, impedito motu ^{baso-}
sanguinis in pectore, sæpius per a- ^{rum}
natomen ostendit. In casu siqui- ^{thorac-}
dem nostro mortem præcessit anhe- ^{cis in-}
litus, & non minus intra cerebrum, ^{terce-}
quam intra pectus clara indicia mo- ^{ptionem}
ræ sanguinis, quam Hippocratis In- ^{ex Mar-}
terpretes *stationem* vertunt, detecta ^{tiano,}
fuerunt. Quid enim cordis poly- ^{& Fra-}
pi? Quid sanguis effusus per inte- ^{castato.}

stinorum substantiam, & remoratus in Meningum vasis? Quid tandem exundans cum intra pectus, tum intra cerebrum serositas ostendit, nisi, oppilatis, conuulsisque pulmonum, cordis, ac cerebri tubulis, lymphatica præsertim vasa hac illac disiliisse, & ipsa quoque sanguiferorum extrema eousque diducta fuisse, vt secernendo sero vitiose dehiscerent?

*Morbi,
& mortis
huius
ætiologia.*

III. Quoniam vero res quærimus, non verba, breuem idcirco, dilucidamque ætiologiam tum morbi, cum mortis exponi posse arbitramur, si nobis proponamus Adolescentem, qui ex mala victus ratione, & maxime ex diutina mora autumnali tempestate in huius maris littore (vbi autumnali tempestate summopere noxius est aër) vitia fermentorum, ac sanguinis abunde contraxit, indeque labefactato viscerum, vasorumque tono illud

(a) De merced con- duct.

(a) Luciani scommata aduersus Romanos tanto iustius promeruit, quod

quod non solum Æger ambulauerit, sed quod Æger sanis, & valentibus famularetur: eo propterea deuenit, vt, contumacioribus semper redditus in liene obstructionibus, inductaque sensim polyporum congestione in cavitatibus cordis, ille non asthmate duntaxat detentus fuerit, sed ad pectoris hydropem properauerit. In hoc autem rerum statu constitutus, cum die ante sui interitus noctem insalubri castanearum cibo largius usus esset, facile inde, acida contracta stomachi cruditate, excitatoque vomitu, hypochondriorum subiit conuulsionem, quæ acres eodem tempore ichores, diu intra prægrandis lienis loculos, aliarumque glandularum folliculos forte detentos, valide per sanguifluas, lymphaticasque venas, perinde quasi per totidem syphones, versus cor, & pulmones, (diu iam semi obstructa, atque eneruata) circumpulit, & iniecit. Hi autem acerrimi ichores

*Præcordiorum
labes a
liene
communicata.*

*Circu-
latio in
iisdem
duplici
ex cau-
sa inter-
cepta.*

duplici ratione circulationem sanguinis apud præcordia intercipere potuerunt, scilicet tum contentum fluidum coagulando, cum continentes canales conuellendo. Et enim primo loco fermenta ista salino-acria, ex hypochondriis repente sanguini affusa, eiusdem compagem, ac mixtionem maxime perturbarunt; unde, variatis cohæsionibus particularum fluida componentium, earundem æquilibrium, atque inde fluxilitas, quæ vbique fere æqualis esse debet, vitata fuerunt; coactisque proinde mutuo sanguinis fibris, hic grumi occurrerunt, & polypi; illic vero serositas intra cauitates copiosius exundauit. Deinde vero huiusmodi etiam acerrimi ichores moram iniicere sanguini cœperunt, inquantum scilicet canalium conuulsionem, quam Hippocrates interceptionem definiuit, induxerunt. Cum enim sanguineorum textura ductuum tota fibrosa sit, ac muscularis,

laris, quoties particulæ præter natura-^{Vas-}
 turam fluxiliores, & acutæ, a san-^{rum}
 guinis miscella secedentes, intra fi-^{conuul-}
 brosum rete magnorum vasorum^{sio quo-}
 penetrant, necessario tanquam ex^{modo}
 tranei cunei eorundem crispatu-^{contin-}
 ram producant, & conuulsionem,^{gat.}
 per quam, minoribus factis vaso-
 rum diametris, fluxus necessariæ
 molis sanguinis, deuoluendi tum a
 corde in cerebrum, cum a cerebro
 in cor, impeditur; vnde idem san-
 guis ob crassiorem fibrosarum par-
 tium acquisitam consistentiam, at-
 que ob viarum interceptionem
 tandem circuire desistit. Et quo-
 niam ex eodem (a) Hippocr. cum (a) 2. de
sanguis non mouetur, fieri non potest, morb.
quin vniuersum corpus quiescat. In
 hoc sane vera syncopis, atque apo-
 plexiæ, quinimo celeris huius inte-
 ritus ratio elucescit.

IV. In exposito vero casu, vt
 concretio fibrosarum sanguinis par-
 tium ex polypis euidenter innotuit;
 ita ipsam interceptionem vasorum

Cruentæ ex naribus filamenta basorum in terceptionis indicium. cruenta filamenta, quæ de naribus, dum æger interiit, pendebant, clare demonstrarunt; nimirum venas iugulares, & superiorem cauam ita fuisse conuulsas, vt sanguinem, quem a supernis venis exhaurire minime potuerunt, per exiliores venarum nasi extremitates transuersim erumpere coegerint.

Hydrops ex Cauæ ligatura. V. Quod si simplex cauæ ligatura, docentibus primum LoWero, ac Willisio, nascitem sex horarum spatio in cane, alioquin sano, inducere potest; quanto sane celerius in nostro casu tot complicatæ causæ hydropem producere, atque hominem diu ægotantem perdere valuerunt; vna enim coniurarunt fusæ, atque exuberantes ex coacto sanguine serositates, pulmonum tunicæ dehiscentes, & sanguifera vasa partim obstructa, partim strangulata, ita vt hæc simul omnia inchoatum iam pectoris hydropem (quem sane euentum sæpe vidimus) momento temporis compleuerint: hinc

hinc serum præ sui copia thoracis machinam extrudendo, solito elatiorem reddidit, intusque pulmones premendo spatium ademit, in quod iidem, cum nihil renititur, ob vim incumbentis per tracheam aëris dilatari solent; cuiusmodi sane inspirationis renixum mechanice, exemplo phialæ, demonstravit

(a) Hippocrates.

(a) 4. de
Morb.
n. 33.

VI. Patet igitur, præpedita in præcordiis libera ipsius sanguinis traiectione, atque etiam prohibita respiratione, Ægrum hunc cito fuisse peremptum; & quidem conspirantibus præfocatione, syncope, ac nervorum syderatione. Neque enim a sensu causarum celeris huius interitus excludendus venit defectus motus sanguinis, & separatio spirituum in cerebro, ubi adeo clara indicia coacti sanguinis intra meningum vasa apparuerunt. Et enim, cum ichores malefici apud miserrimum Iuuenem ex hypo-

Ab hy-
pochon-
driis ad
ponan-

cere-
brum
citissi-
ma in-
sensili-
quoris
deriva-
tio.

ponantur transducti, dubitari non potest, quin iuxta citissimæ circulationis legem aliqua eorundem portio etiam ex præcordiis in caput, agonis principio, ocysime deriuata fuerit. Vnde patet, quomodo ipsa quoque cerebri apoplexia in Ægri perniciem denique conspirauerit.

VII. Hæc profecto satis nobis esse videntur ad morbi, mortisque causam rimandam; nisi pro coronide velimus addere nonnullas annotationes ab ipso extispicio deducendas, &

VIII. Primo quidem perpendenda venit singularis illa per albas, teretesque fibras pulmonum cum costis colligatio, quam sane nobis raro obleruare contigit. Adglutinationis liquidem pulmonum cum costis, quæ fit a valida, & vbique æquali superficie pulmonum, & pleuræ cohæsiōe, frequenter occurrit; illa vero, quam in cadauere isto offendimus, forte maiori ex parte

Pulmo-
num
cum
pleura
per li-
gamen-
ta

parte congenita, non tota per morbum inducta aliquibus videbitur. *cohesio aliquibus forte congenita.* Egregie porro hac de re Malpighius in oper. posthum. in respons. ad D. Placit. vbi istorum nativorum meminit vinculorum, quippe quos, sicubi inveniuntur, inspirationi admodum famulari arbitratur.

IX. Secundo rarum quoque se nobis præbuit curiositatis argumentum, quod, compressis pulmonibus, serositates veluti ex imbibita spongia per dilatatos poros fuerint extrusæ. Hoc sane nequaquam contigisset, nisi duo in pulmonibus mala, colluies nempe serosa, atque extremorum vasorum hiatus, ex salinis ichoribus, tanquam ex cuneis ampliores redditi, simul concurrissent. Hinc claro experimento doceri possumus, in quem laxitatis statum veniant vasorum *Vasorum dehiscencia in ascite.* tunicæ, cum in obscuris, abditisque abdominis locis ad ascitis productionem dehiscunt.

X. Ter-

*Morbo-
sa san-
guinis
in corde
fluxili-
tas, & n-
de.*

X. Tertio negligi certe a doctis Viris non poterit examen causæ, cur sanguis in cordis ventriculis non quidem consueta tenaci densitate, sed friabili, ac diffluente consistentia inuentus fuerit. Hoc sane phænomenon ex defectu mixtionis rubræ cum fibrosa, & alba sanguinis parte, quæ intra cordis sinus in polypos coaluerat deduci posse censemus: reliquum enim sanguinis facile diffluit fibrarum retinaculo solutum; vt passim contingere videmus etiam in extracto per venæ sectionem cruore, in quo, cum superior pars in albam concrescit gelatinam, inferior, quæ nigra apparet, semper solito fluidior occurrit.

*Polypi
acidis,
non al-
chalicis
dissol-
uuntur.*

XI. Differendum aliquid superesset de causis, ac modo, quibus polypi intra cordis, & sanguiferorum cavitates concrescunt, deque menstruo acido, quo extra corpus dissolui solent, quando alchalicis fixis, aut volatilibus nequaquam supe-


superantur; sed opus hoc, studio, experimentisque plenum, reiicimus ad tractatum longe maioris laboris, atque utilitatis, quem de Corde, & Aneurysmatibus adornamus.



OBSERVATIO IV.

Repentina mors ex convulsione thoracis, præcordiorum, meningum, ac totius corporis, in fortissimam apoplexiam ocysissime desinente.

HISTORIA.

oseph Sali Pistoriensis ann. 54. habitus mediocris, olim hæmorrhoidibus, & biliosis diarrhæis vexabatur, quibus tempore deficientibus, sepulti in pectore dolores, ac recurrens incertis diebus spirandi difficultas absque vlla quidem anacatharsi, sed cum faciei squallore, rigentique artuum

tuum frigore illum vrgere cœperunt. Ante mensem identidem in asthmatis paroxyfmis pene animo linquebatur, atque ob graua quædam pathemata misere, & cum mœrore viuebat. Tandem pridie ante mortem a Monialibus B. M. Assumptionis ad famulatum vocatus, laboriosam, sedulamque operam, huc illuc festinando, proprias vltra vires locauit. Denique, suffocatio correptus anhelitu, aphonus repente factus est, & vniuerso corpore conuulsus; animam efflauit, facie admodum tumida, oculis intra orbitam retractis, & spuma ad os, ac nares confluente. Obiit autem die 13. Martii 1706. hora 23. in publica via, quæ ducit ad Templum S. Mariæ in Porticu.

CAD AVERIS DISSECTIO.



Niuerſa corporis ſuperfici-
es excolor, facies vero ru-
bicundoliueſcens apparuit
vna cum ſpuma intra os, & nares,
quæ,

quæ, amoto sterno, alioquin valde depresso, per solam pulmonum compressionem copiosius redundabat. Virga, elaplis viginti quatuor horis ab interitu, adhuc subrigida cernebatur.

*Virga
subrigi-
da in
cadaue-
re.*

II. Vniuersalia integumenta, cum primum cultro inciderentur, statim fluidissimo, sed atrii coloris sanguine, perinde quasi adhuc intervivos versaretur æger, affluenter manabant.

*Summa
sanguini-
s flui-
ditas
in eo-
dem.*

III. Reserato abdomine, omentum, intestina gracilia, & mesenterium rubebant, diffuso, ac remorato per minima illarum spatia sanguine.

IV. Pancreas ob morbidam substantiæ molliem fere ductile deprehensum fuit.

*Pancre-
atis
molli-
es exce-
dens.*

V. Hepar, quanquam neque mole, neque colore, aut substantiæ ratione a naturali statu recedere videretur, in cystide tamen
u bilem

bilem fluidissimam, ac subobscuri coloris continebat. Cætera in abdomine viscera prorsus illæsa, & integra inuenimus.


*Fortis pulmo-
num ad
singulas
in tho-
race
partes
adhesio.
Eorun-
dem ri-
giditas.* VI. Aperto thorace, lerna ma-
lorum venit in conspectum: et-
enim pulmones utroque in latere
pleuræ, diaphragmati, & pericar-
dio ita adhærebant, ut nec digitis
euelli, nec cultro æqualiter ab imo
ad summum separari potuerint. Et
quanquam in pulmonibus neque
pus, neque serum occurrisset, con-
tractio tamen quædam, & reniten-
tia, seu diminuta flexibilitas obser-
uabatur.

*Ita &
Cordis.* VII. Cor, licet mole non ma-
gnum, adeo tamen tumidum, ten-
sum, & orbiculatum deprehendi-
mus, ut in systole adhuc positum
dixisses. Vena caua, & auricula
dextera naturali diametro aliquan-
tulum ampliores, fluidoque San-
guine tumebant; quo sane cruore,
& quidem multo fluidiori, scate-
bant

bant sinistrae cordis cauitates , in quibus nullus polypus , aut grumus latitabat.

VIII. Secto cranio , dura mater *Valida*
excolor, & supra cerebri corticem *dura*
admodum contracta; pia vero, suis *matris*
tumentibus ex fluido sanguine va- *Contra-*
sis, occurrit. Cumque amputare- *ctio.*
mus portionem corticalis , & me-
dullaris cerebri partium , vidimus
(vt apud strangulatos) puncta san-
guinea spisso agmine candidam me-
dullae substantiam variegare. Palli- *Serum*
dam serositatem non apertis solum *a cere-*
ventriculis profiliisse, sed ad vsque *bri ven-*
spinalem medullam redundasse, de- *triculo*
prehensum fuit. *ad usq;*
spina-
lem me-
dullam
effusum.

SCHOLIUM.

 Nicam nascendi, innume-
ras vero moriendi homini-
bus esse vias, nihil est, quod
nos doceat apertius , quam ipsa ca-
daverum sectio, quæ occultas necis
causas ad Solis lucem euidenter ex-
ponit. Vidimus in præcedentibus

extispiciis , quam variæ moriendi rationes fuerint detectæ : nunc rara interitus causa se offert in descripto Ægro , eiusque dissecto cadauere. Etenim , quanquam morbus , quo decessit , vulgaris , ac notissimus videri possit alicui , qui solidarum vitia partium considerare solummodo velit , fuit siquidem vehemens , atque contumax conuulsio præcordiorum , quæ , cerebro , & vniuerso corpori communicata , æris , sanguinis , & liquidi neruei alternum fluxum , ac refluxum lethalliter præpediuit ; vnde fortissima tandem apoplexiæ species exorta est ; attamen si sedulo aduertamus per dissectionem cadaueris singularem sanguinis crasim innotuisse , vberiore certe materiem admirandi simul , ac philosophandi offendemus : inuentus quippe fuit post integrum a morte diem cruor adeo solutus , & fluens , vt , si homo iste funeri superstes fuisset , fluidior esse non potuerit. Hæc profecto sangu

*Morbi
huius
natura
qualis.*

guinis in cadaueribus conditio ita ^{Sanguinis fluxilitas in cadaueribus rara.}
 raro existit, vt, si quando euenerit, portenti, ac prodigii simile numeretur; & quemadmodum ab insolenti causa id proficiscitur: ita vires, effectusque nonnisi insolentes nostris in corporibus producere valet. Sed iam vtraque tam solidorum, quam fluidorum mala seorsim, diligenterque perpendamus.

II. De mortifero præcordiorum, ^{Signa}
 cerebrique spasmo clara occurrunt ^{spas-}
 indicia ante, & post mortem, ^{mum in præcordiis, &}
 videlicet sepulti in pectore dolores, difficultas respirationis absque ^{cerebro}
 vlla anacatharsi, angor suffocati- ^{indican-}
 uus, spuma ex naribus, & ore, quæ, ^{cantia.}
 pressis pulmonibus, affluentior fiebat, sternum depressum, oculorum retractio, totius denique corporis, atque ipsius etiam penis conuulsio; quibus adiuncta fuit elegans observatio rotunditatis, ac tensionis in corde, quæ probabiliter nos docuit vitalem hunc musculum, dum æger interiit, pertinaci con-

uulsiua systole fuisse correptum; cui sane cum ingens accesserit quantitas cruoris intra suas cauitates reperti, nostrum subit animum dubitatio de insuperabili renixu sanguinis, qui, cum ob pulmonum, totiusque corporis conuulsiones liberum in arteriis spatium inuenire non posset, vt cordis pulsioni obsecundaret, necessario intra ventriculos diastolis tempore admissus, a quantacunque cordis contractione vrgeretur ad egressum, subsistere tamen, tandemque validissime reniti coactus fuit. Vnde postremus ille ortus est præcordiorum angor, penitusque, & ex tempore disruptus vitalis ille circulus a corde in cerebrum, & a cere-

*Ex aorta compressione cordis immobilitas, rotundi-
tas &c.* bro in cor. Qui sæpe viuorum sectionibus interfuerunt, ignorare nequeunt sanguinem, arteria magna casu, vel arte compressa, non inuenire spatium, per quod libere excurrere possit; vnde cor matet plenum, immobile, ac rotun-

tundum , citoque animal moritur.

III. Status deinde duræ matris clare pariter nobis ostendit pertinacem conuulsionem , in quam ipsa paulo ante Ægri mortem venerat; inuenta enim est excolor , simulque contracta , vt non sit hæsitandum , quin idem meningum spasmus , qui cerebrum obsidebat , ac circumcingebat , vniuersæ radix extiterit conuulsionis.

Spasmus meningum vniuersæ conuulsionis origo.

IV. Sed hæc notiora sunt, quam vt longius examen mereantur. Pergamus igitur ad particularem illam, & raram conditionem fluiditatis, qua sanguis non in præcordiis modo, & cerebro, sed in toto etiam succutaneo corpore donabatur. Hoc fane phænomenon pro causa habuisse suspicamur non solum violentiam motus corporis, quam Æger postremo suæ vitæ die sustinuit, & per quam id contingere cruori suo potuit , quod euenit in recenter effuso , & diu in vase

Sanguis in Cadauere cur fluxilis adhuc persistit.

agitato sanguine, qui cum ob motum in fibras coalescere nequit; sed potissimum exaltationem salium acrium, maxime ad vrinofam naturam accedentium in homine, cæteroquin hæmorrhoidibus, ac biliosis diarrhæis olim detento; qui profecto sales, cum per vehementem, crebroque repetitam corporis exercitationem, oleosis spiritibus, & aqueis partibus, quorum miscella cicurabantur, exhausti fuerint, nil mirum, si intime cum sanguine agitati, ac permixti eam fluxilitatem eidem conciliare potuerunt, quam induci passim videmus in extracto recenter e vena sanguine per additionem salis vrinosi, & præcipue spiritus salis armoniaci.

*Salis
vrinosi
eis ad
Sanguinem dis-
soluen-
dum.
Conie-
ctura
de con-
uulsio-
num
causa
experi-
mentis
confir-
matur,*

V. Cum vero infusiones liquidorum acrium intra viuentium brutorum venas nobis non semel ostenderit, easdem præcordiorum, totiusque corporis immanes conuulsiones, quas illico mors sequitur, inducere, nihil est, cur dubitemus, quin

quin vera causa conuulsionum, quæ nostrum ægrum ad necem perduxerunt, extiterit copia huiusmodi liquidorum salino-acrium, quæ, cum nimium exaltata, & acutissima red-
 dita, ex hypochondriis intra san- *Mali*
 guineos canales magna copia trans- *fomes*
 ducuntur, veneni naturam indu- *in hy-*
 unt: tunc enim propriæ excessu mo- *pochon-*
 lis naturalem reliquarum in sangui- *driis.*
 ne particularum superant propor-
 tionem, ac proinde ratione pro-
 priæ indolis cruorem non tantum
 fluidiorem, ac mobiliorem, sed,
 quod magis est, procliuiorem effi-
 ciunt, vt ex naturalibus vasorum
 cancellis facile se proripiat, atque
 intra strictissimam compagem fibra-
 rum muscularium vasorum, & glan-
 dularum vltro se insinuet, ac pene-
 tret; hinc neruorum, musculorum,
 vasorumque conuulsiones, vnaque
 simul incongruæ contentorum flui-
 dorum separationes, ac moræ, vt
 in præsentī casu, solent contin-
 gere,

VI. Mouet autem nos ad credendum, scatebram prædicti liquidi salino-acris, & armoniacalis in hypochondriorum folliculis latitasse, quod obseruauerimus non solum cysticam bilem fluidissimam, ac subobscuri coloris (cuiusmodi eua- dere solet artificiali admixtione salium acrium) sed ipsum quoque pancreas lentorem plicabilem, ac fere ductilem adeptum fuisse, qui plane oriri poterat ex diuturna, & copiosa secretione fluidi acerrimi, ac dissoluentis, quod strictam illius glandulæ fibrarum cohæsi- onem eliminare, debilitare, ac fere tollere valuerit; vnde resistentia minor, seu mollities maior eo in viscere producta fuit: quemadmodum sane in cadaueribus illorum, qui ex diabete perierunt, renes omnino flaccidi, plicabiles, ac ductiles ob eandem rationem inueniri solent.

*Diabe-
tico-
rum re-
nes du-
ciles.*

VII. Similiter non aliunde petenda esse videtur causa tam profundæ intrusionis sanguinis intra
stri-

strictissimam cerebri medullam, quam ex conuulsione continentium, simulque dissoluta nimium compage contenti liquidi, cuius maior fluiditas, vt e succutaneis vasculis ad simplicem integumentorum scissionem, erumpendo, prodiit; ita in cerebro vltiorem penetrandi vim nacta fuit a meningibus, sinubusque conuulsis, perinde quasi a consociatis ad circumpellendum manibus. Vnde cruor, ad usque medullarem cerebri substantiam expressus, rubentibus illam punctis variegauit.

Sanguinis intrusio ad cerebri medullam hinc.

VIII. Ipsa quoque perseverans post mortem penis tensio (quæ raro in strangulatis non inuenitur) præteritæ vniuersalis conuulsionis testis adfuit. Cum enim virile membrum sit musculus mirabilis contexturæ, cæterorum instar musculorum spasmodicas affectiones pati potest. Modum vero, quo penis iuxta naturæ ordinem tenditur, egregie tradidit (a) Malpighi-

Penis musculus.

(a) In conf.

us.

de im- us. Illud tantummodo ad rem no-
 pot. ve- stram hic perstringimus, quod, sic-
 ner. uti spuria quædam colis erectio in
 apud cadaueribus excitari potest per so-
 Bibl. lam iniectionem tepentis cuiusli-
 Med. bet liquidi intra eiusdem arterias,
 Man- dummodo venulæ filo strangulatæ,
 get. ne refluat, impedian; ita profecto
 Eius- non dubitamus, quin eiusdem ere-
 dem no- ctio, quæ ob neruorum, fibrarum-
 tha ere- ctio, quæ ob neruorum, fibrarum-
 ctio in que conuulsionem, fluida in sinu-
 cada- bus fistulosorum corporum inter-
 ueribus, cipientem, ante huius ægri mor-
 quomo- tem cœpit, persistente eodem fi-
 do ex- brarum spasmō, vel post mortem
 citetur. perseuerauerit.

Sangui- IX. Cæterum non adeo labo-
 ne flu- randum in ea dubitatione, quomo-
 xili exi- do scilicet stare simul potuerint
 stente summa fluiditas sanguinis, & facies
 quomo- excolor, atque artuum illud frigus,
 do faci- quibus Æger iteratis in præfocatio-
 es palli- nibus detinebatur. Etenim, eadem
 da, & vasorum strangulatio circa præcor-
 extre- dia, quæ suffocatum asthma sæpe
 ma fri- intulit, liberum sanguinis per ex-
 gida tremas
 perdu-
 raue-
 rint.

tremas arterias excursum, & ignearum particularum per minima carnis diffusionem præpediebat. Unde caloris, ac viuidi coloris priuatio exoriebatur; quam sane priuationem consequitur sensus frigoris, quemadmodum apud hystericas mechanica ista vasorum lege accedere, ac recedere passim obseruamus. Quo fit, vt magnus ille Medicorum Romulus, vt recte (a) Hipp. solertissimus Bagliuus noster, post Sydenhamium, appellauit, scripserit ad rem. *Colorum mutationes, corde adstringente venas, (intellige etiam arterias) ac laxante fiunt; laxante quidem rubicundi, ac bene colorati; constringente vero cum pallore liuidi &c.*

X. Mortuus itaque improuiso miserrimus homo iuxta magni Senis (b) effatum, cum tam frequenter, ac fortiter absque manifesta, scilicet externa, causa animo defecisset; & denatus est ob complicationem trium malorum, suffocationis,

(a) Lib. de off. nat.

n. 28.

iuxta varias cordis affectiones colorum in facie mutatione, ex Hipp.

(b) Aph. 41.

Triplitem ob morbum hic

eger
perit.

(a) Lib.
de
gland.
n. 9.
Hippo-
cratis
oracu-
lum.

Sydera-
tio in-
terdum
a corde
eiusque
Basis
deriva-
tur.

onis, syncopis, & apoplexiæ, quam sub voce syderationis, ab acri humore pendentis, idem (a) Hippocrates per hæc verba, oraculorum loco habenda, accuratissime descripsit. *Cerebrum autem cladem perfert, etiam ipsum non sanum existens, sed, siquidem radatur, (enimmodum conuulsionis) turbationem multam sustinet, & cerebrum conuellit, ac distrabit totum hominem, (enim conuulsio vniuersalis) qui in se ipso vocem non edit, (enim aphonia) & suffocatur, (enim suprema complicatio malorum, præfocationis scilicet, syncopis, & apoplexiæ) demum concludit: & hæc affectio syderatio, & apoplexia appellatur: quæ quidem non semper in solo cerebro quærenda est. Aliquando in vasis, aut cavitatibus cordis obstructis, compressis, atque conuulsis, intercepto cruore, delitescit. Sæpe in vno ægro multæ partes, immo omnes obseruan-*

tur

tur affectæ, vitio vel primario,
vel ſecundario, vt ſcite aduertit

Thomas ^(a) Bartholinus, & nos

in præſenti caſu notaui-

mus.

(a)
conf. de
Anat.
pract.

MS (o) 90

OBSERVATIO V.

*Improuisa mors ex subita Causa intra
pericardium disruptione cum a-
neurysmate arterie
magne.*

HISTORIA.



Stephanus Ascieri sutor
Ianuensis, sexagenario
maior, habitus carnosus,
octo abhinc annis po-
dagra, & chiragra circa æquino-
ctia grauitè vexatus, ante bienni-
um tussi cum spirandi difficultate
detineri cœpit; deinde cordis pal-
pitationem, & sepultum quendam
sub dextero sterni latere grauati-
uum, atque interdum acutum do-
lorem, ad usque humerum propa-
gatum, pectoris angustiam, ac pro-
fundam pulsationem passus fuit.

*Sepul-
tus sub
dextero
sterni
latere
dolor
cum
palpi-
tatione
cordis.
Vertigo
tene-
bricosa.*

II. Decursu proxime præteritæ
hyemis non raro corripiebatur et-
iam vertigine cum sensibili capitis
excalefactione, ac præcipiti virium
lapsu.

lapsu. Quare sæpe ad suendum ineptus reddebatur. Dimidium quadragesimæ falsamentis transegit. Tandem die 14. Martii 1706. hora 17. cum a prandio merum ingurgitasset, statim aponia, atque angore cecidit exanimis.

CAD AVERIS DISSECTIO.

Mirabile profecto nobis visum fuit, quod nullum in abdomine contentum viscus a naturalis œconomia legibus recessisset; adeo singula colore, mole, ac substantiæ ratione optime constituta occurrerunt. Sola cystica bilis subobscurum quid referebat.

II. Horrendum e contrario spectaculum thorax nobis exhibuit; detracto enim sternone, (quod parte sui dextera elatius erat sinistra) dexter pulmo rubicundior, & pleuræ admodum adglutinator, cum adnato duro, & magno corpore apparens, curiositatem nostram lactavit,

*Dexte-
ra Ster-
ni pars
elatior.*

*Aorta
aneu-
ryfma.
Lamel-
la offea
in a-
neurys-
mate.*

*Rara
polypi
conftitu-
tio in
aneu-
ryfma-
te.*

uit, vt diligentius rei nouitatem detegeremus. Latebat enim ftatim extra pericardium aortæ aneurysma; deinde adacto cultro, illico lamellam offeam deprehendimus figuræ oualis, quæ externam dilatatæ arteriæ partem, qua fternum, costasque dexteras respicit, occupauerat. Sub ea lamina, & circum aortæ cavitatem, quæ antè posita eft, polypeam substantiam inftar lardi in fornicem adeo concinne incrustatam inuenimus, vt nunquam alias in aneurysmatum cystide similem detegere datum fuerit; hoc siquidem corpus igne prius liquatum, & mox frigore integre concretum videbatur; non enim in multiplices laminas, ac veluti in folia distrahi (vt passim solet) patiebatur. Vnde constitit, validum aggerem pulsioni sanguinis versus externas partes positum fuisse. Facie vero, qua pulmones tanguntur, minori polypeo repagulo obsessam, tectamque aortam depre-

deprehendimus. Aneurysmatis interea cavitās tam ampla occurrit, ut pugnum facile admisisset, tamque grumoso plena sanguine, ut nihil fluidi amplius capere posse videretur; nusquam tamen magno aliquo foramine dehiscebat, licet ad cordis basim intra pericardium, & ad inferum latus aneurysmatis nigrae quaedam striae maiorum forte futurorum hyatum indicia, observatae fuerint. Longitudo ipsius aneurysmatis non excedebat longitudinis aortae, qua curva est, dimidium, quae proinde aorta tum supra, cum iuxta cor nativam diametrum, ac fibrarum validitatem sartam, tectamque eleganter servabat.

*Striae
ad latus
aneu-
rysmatis
quid
indica-
rent.*

III. Sed non hic malorum finis; etenim cum ipsum pericardium maxime tumidum, molle tamen, animadverteremus, suspicati fuimus de latente aliquo praeternaturali fluido. Sectum proinde ingentem dedit, quantam scilicet capere

*Concre-
ti san-
guinis
copia*

*intra
peri-
cardi-
um.*

*Vena
caue
ruptu-
ra.*


poterat, effusi, atque in grumos conuerſi cruoris quantitatem, quæ certe duarum librarum pondus excedebat. Sanguis vero effluxerat, aperto intra vestibulum venæ cauæ iuxta dexteram auriculam foramine diametri vnicae circiter vnus, quod paulatim ab erodente liquido factum fuisse in musculari eiusdem textura plane indicabant ipsius oræ, quæ non in fimbrias, ac lacinias solutæ, sed veluti per limam omnino expolitæ obseruabantur. Quominus autem sanguis multo prius intra pericardium exunda-erit, impediuit forsitan subtilis illa, in quam muscularis desinit, tunica, quæ, hiatus super extensa, egressum claudebat, cuius tunicae tenuata fragmenta ad vlceris extrema videbantur pendere.

IV. Secto tandem cranio niger sanguis ex vulnerato forte fortuna posteriori sinu duræ meningis large profluxit; quod genus magna pariter copia in lateralibus sinibus con-

con-

continebatur. Ventriculi cerebri limpidi tumebant fero, quod ad principium spinalis medullæ redundauerat.

SCHOLIVM.

 Deo perfpicue patet natura, & vis lethalis mali, quo hic homo subito decessit, vt nullo pene commentario indigere videatur. Etenim, cum integritas, & continuitas magnorum sanguiferorum ad vitæ conseruationem omnium maxime sit necessaria; mirum procul dubio videri non debet, si, adeo enormiter dilatata arteria magna, & abrupta repente continuitate, & integritate summi caudicis venæ cauæ, fluxus sanguinis a venis in cor, atque a corde quaquauersum vna cum vita illico in exposito sene defecerit.

II. Possem hic de ortu, ac discrimine aneurysmatum plura disserere, sed, quia nunc scholio-

Præcordiorum aneurysmata sæpe ab vniuersali arteriarum spasmo incipiunt. Clariora præfati morbi indicia.

rum breuitati studendum, aptiorem illis locum, volente Deo, tribuemus. Id vero crebra experientia nos edocuit, aneurysmata præcordiorum apud Ægros, erodentibus ichoribus refertos, pleurumque incipere ab vniuersali quadam spasmodica arteriarum affectione, quæ postremo in corde, aut summis vasis determinatur. Quo fit, vt primum de vaga, atque huc illuc per collum, & artus errante arteriarum palpitazione conquerrantur. Deinde intra pectus malum sistitur, sæpe tussis vrget, cor salit, & grauius pulsat, mox sepultus, ac breui fugitiuus corripit dolor, qui postea pertinacius hæret, & modo ad alteram scapulam, clauiculamue, modo per brachium, quandoque usque ad cubitum propagatur. Tandem profunda persentitur pulsatio; eleuantur alicubi costæ, aut sternum; cæteraque succrescunt grauia, & prorsus miseranda atrocis huius mali phænomena,

mena , quæ vt plurimum subita morte finiuntur.

III. At vero, quanquam omnia, & singula symptomata, quibus hic homo suorum initio malorum tentatus fuit, & an eadem vexauerint, quæ superius exposuimus, noscere minime potuerimus: attamen qualiscumque morbi progressus, quem ab illius familiaribus sedula inquisitione comperimus, atque extispicio præfiximus, satis ostendit, eiusdem corpus, podagra obsessum, acribus, pungentibusque ichoribus (vt vel cystica bilis argumento fuit) redundauisse; qui sane ichores, cum per biennium ante illius mortem subsistere cœperint in præcordiis, tusim excitarunt, & paulatim, comitantibus doloribus, pondere, atque anhelitu, intra substantiam tendineam aortæ, simulque muscularem venæ cauæ intercepti fuerunt, quibus in locis verosimile est primum irritationem, & conuulsionem cum cordis palpita-

*Aneu-
rysmat-
um na-
tura in
quo
consi-
stat.*

*Ars Su-
toria
quomo-
do in-
firman-
dis præ-
cordio-
rum
Easis
contu-
derit.*

*Artifi-
ces se-
dentia-
rii cur
raro
sani
confe-
vescant.*

tione, deinde vero istorum etiam canalium exesione, tandemque productam fuisse diloricationem, in qua vera aneurysmatum natura consistit.

IV. Si quis autem diligenter animo teneat, arteriam magnam, & venam cavam in Ægro incurui habitus ob artem suturiam, angustiori situ, quam humani corporis ferat constitutio, coerceri; forte causam inueniet, cur initio morbi sanguis maiori nisu ob tussim exagitatus, prædicta sanguifera vasa vehementius distenderit. Deinde quomodo per impetum reciprocati sanguinis minimo negotio haberi potuerit intrusio, & mora pertinax salino erodentium ichorum intra fibras eorundem canalium. Raro enim qui sesilem, incuruamque ducunt vitam, si vitiosis redundant succis, absque insigni aliqua pulmonum, cordis, aut magnorum vasorum labe consenscunt.

V. Et

V. Et quoniam nigræ quædam
 striæ ab aneurysmatis fundo ad cor-
 dis basim intra pericardium appa-
 ruerunt; dubitandi ansam nunc
 præbent subtilem, acremque sani-
 em (quam aneurysmaticus quisque *Ex aneu-*
 folliculus perpetuo fundit) sensim *rysmat-*
 supra Cavam distillasse, vt illius *tum fol-*
 magnam erosionem saltē acceler- *liculis*
 rauerit; præsertim cum Aorta isto *Saniei*
 in homine, vt dictum est, ex infle- *effusio.*
 xo, ac dilatato trunci situ necessa- *Cava*
 rio magis appropinquauerit ad Ca- *erosio*
 uam: quo factum fuit, vt affectio- *quomo-*
 nes vtriusque sanguiferi fere per *do in-*
 contactum adaugeri mutuo potue- *ducta.*
 rint.

VI. Non admodum hic labora-
 bimus in exponenda cæterorum
 ætiologia symptomatum, quæ suto-
 rem hunc ante mortem maxime
 exercuerunt; cum abunde ex legi-
 bus motus sanguinis euadat per-
 spicua. Etenim, vt recurrens cor- *Fre-*
 dis palpitatio procedebat ex refle- *quens*
 xione motus sanguinis ab Aortæ a- *Cordis*
 neu- *palpi-*
 tatio, &

neuryfmate versus cor; sic frequens vertigo, & capitis excalefactio ex impedita identidem traiectione sanguinis a caua intra dexterum cordis ventriculum proficiscebantur. Sanguis enim qui a cerebri sinubus in iugulares, & Cauam, indeq; intra cor, solute, ac libere in homine valente, atque incolumi, motus fuisset; in casu nostro ab erosa, suisque propterea viribus eneruata Cauæ textura, per cordis itinera non nisi ægre vrgeri poterat; ac propterea idem sanguis, maiori sæpe sæpius quantitate intra Cauam collectus, impedimento erat, quominus subsequuturus e iugularibus venis, sinubus duræ matris, ac cæteris capitis sanguiferis, libere descenderet. Vnde quemadmodum ex maiori ignearum particularum per minima cerebri diffusionem, inæqualique irritatione, & pressione; calor, ac vertigo contungebat; ita ex intercepto eodem tempore motu sanguinis e Caua in Cor, præceps virium

*Quare
præceps
virium
lapsus.*

rium lapsus oriebatur; cuius certe deliqui causam nunquam aliam quæremus: cum in promptu sit, Cor Cor duo in-
ter a-
neurys-
mata
loca-
tum. inter duo positum fuisse aneurysmata, Cauæ nimirum, quod sanguinem frequenter eidem subtrahabat, & Aortæ, quod illum identidem in cor repellebat. Quæ sane res in causa fuit, ut sanguis in cerebro etiam remoratus, ex dissecto duræ matris sinu large profluxerit. Neque aliunde petenda est ratio inuentæ serositatis intra cerebri ventriculos, quam ex summa plexuum turgentia, ac distensione, cuius vi, diductis, ampliatisque poris tunicularum vascula comprehendenti-um, subtilis percolatio feri, veluti per manicam Hippocratis, habita est.

VII. Denique repentina mors, quam ^(a) Hipp. prædixit Senibus, (a) In
coac. quibus cordis dolores sæpius consuescunt, tribuenda esse videtur subitæ ruptioni tuniculæ illius, quæ, cauæ foramen tegens, cruoris efflu-
xui

xui retinebatur. Sanguini vero duplex consociata probabiliter vis nouissime accessit, scilicet erosiuæ ex falsamentis, per dimidium quadragesimæ ingurgitatis, & extrusiuæ, seu distractiuæ ex hausto tandem meraco. Vnde iunctis cuneis, & vectis viribus in sanguine, tenuissimum illud membranæ repagulum cedere coactum fuit; vitæque, fluente cruore de Caua in pericardium, illico recessit.

Vnde
repentina
mors

VIII. Neque sane huiusmodi mortis genus nouum erit iis, qui in medicarum historiarum lectione versantur. Prostant enim similia exempla apud (a) Bellinum, aliosque, vt nostra nunc taceamus. Sed vnum legimus descripto casui fere tam simile, quam ouum ouo apud (b) Andream Laurentium in Equite Guicciardino Legato Magni Ducis Hetruriæ ad Regem Gallorum, qui, tametsi cum Magnatibus quibusdam obambulans, familiariter colloqueretur, subito respiratione, pulsu,

(a) De
morb.
pect.
tit. de
inter.
puls.

(b) Lib.

9.
quæst.
18.

Similis
historia
ex Lau-
rentio.

pulsu, & vita priuatus cecidit; cuius in cadauere inuentum fuit venæ Cauæ ostium disruptum, & Arteria magna ita dilatata, vt brachii amplitudinem æquaret. Sed hic de-
mirari satis non possumus, quomodo insignis adeo Anatomicus miratus fuerit, quod nulla externa causa ad Cauæ disruptionem accesserit; perinde quasi internæ, vt passim videmus, satis esse non potuerint.

Causa interna ad vasorum disruptionem sola sufficiunt.

F I N I S.

Lectori suo.

HActenus pro viribus nostram fidem persolui-
mus. Speramus interea, vt, quæ
non minus celeriter, inter oc-
cupationes nostras, quam
candide scripsimus, ab æquis,
ingenuisque Lectoribus, ad
Reipublicæ vtilitatem, ad
quam studia nostra direxi-
mus, perhumaniter referan-
ur. Huic vero labori, inchoato
in Ædibus Vaticanis medio
Ianuario, supremam imposui-
mus manum in Ædibus Qui-
rinalibus ipsis Kalendis No-
uembris eiusdem anni
MDCCVI. Augustissimis no-
bis fauentibus auspiciis S.D.N.
CLEMENTIS XI. PONTI-
FICIS vere, inter Optimos,
Maximi.

INDEX

Rerum, & verborum, quæ in hoc opere continentur.

A.

- A** Bdominis tensionem eneruantia. pag. 183
 Abscessus polypeus meningum. 48. fin.
 Acicula sub unguibus adacta apoplecticos excitat. 182
 Equinoctia apoplexiarum feracia. 115
 Aër unum ex tribus fluidis maioris usus. 18
 — sanguinem fecundat. 58
 — in conclavi calido, montiumque cacuminibus sanguini premendo est insufficiens. 20
 — ad subitam necem diuersimode concurrat. 58
 — eius in pulmones ingressus varie inhibitus repentinae mortis causa. 33
 — pondus vel moles nimium aucta, aut diminuta subita necis causæ. 19. seqv.
 — in fodinis metallicis ponderosus, & lethifer. 20
 — qui prauus dicitur, iuxta corporum dispositiones noxiam infert. 21
 — externus cum interno æquilibratus mortem infert repentinam. 34
 Aëris probi mutatio in deteriorem mortifera. 94
 — motus vebemens vasorum rupturam cur acceleret. 134
 — vi-

INDEX.

- *virus in hac Romana constitutione non vnice cul-*
pandum. 153
- *eius tamen intemperies quomodo subita morti*
contulerit. 155
- Agyrtæ cur vitandi.* 41
- Aloetica phlegmaticis congestionibus curandis op-*
portuna. 141
- Amara præseruant a spasms ex materia viscida.*
137
- Aneurysmata quid.* 307
- *sub varicum nomine comprehendit Hippocra-*
tes. 132
- *præcordiorum sæpe ab vniuersali arteriarum*
spasmo incipiunt. 306
- *interna quosnam citius perimant.* 106.
- *ex horum folliculis sanies effunditur.* 309
- *horum prophylaxis, quæ securior.* 309. seqv.
- Animalia in machina Boyliana cur moriantur.* 20
- Animalium perfectorum vita in quo vere consistat.*
3.
- Animi deliquia inter signa corrosionis magnorum*
vasorum. 14.
- *vt subitam mortem præsagiant, quid opus sit.*
103
- Animi passiones solida debilitando, mortem impro-*
uisam accersunt. 18
- *spirituum excursus ad præcordia perturbant.* 27
- *cur sint lethales.* 18. 54.
- Animi tranquillitas, & diæta ad subitam mortem*
auertendam ex sacr. 154.
- Anni*

I N D E X.

<i>Anni quadam tempora noxia.</i>	pag. 92
— <i>etiam ex Hipp.</i>	93
<i>Aorta compressa cordis rotunditas.</i>	290
— <i>eius aneurysma.</i>	302
<i>Apoplexia ex epilepsia cur, & quando.</i>	28. seqv.
— <i>epileptica ex animi passionibus.</i>	54
— <i>ob vasorum thoracis interceptionem.</i>	273
— <i>eius potior causa non est lymphæ in cerebri sinu- bus collecta.</i>	24
— <i>a frigidis succis raro procedit.</i>	185
— <i>aliquando ob hamorrhoides suppressas.</i>	193
— <i>raro prehendit absque præviis signis, & quæ sint.</i>	64. seqv.
— <i>inter morbos huius constitutionis.</i>	57
— <i>hac correpti, vid. præfocati.</i>	
— <i>in senibus quando inuincibilis.</i>	63
— <i>pulmonum mortifera.</i>	88
<i>Apoplexiæ præservatio Romæ.</i>	139
— <i>eius curatio quibus remediis tractanda.</i>	181
— <i>non semper calefacientibus.</i>	185
— <i>per inediam curata apud Hippocratem.</i>	65
<i>Aphonis sublingualium incisio prodest.</i>	174
— <i>eius rei experimentum.</i>	189
<i>Aquea utilia in spasmodicis hypochondriorum.</i>	137
— <i>in salinis pectoris congestionibus.</i>	141. seqv.
<i>Arcanorum abusus in medicina.</i>	41. seq.
<i>Aristoteles de Vita obscure sensit.</i>	2
<i>Ars Naturæ opera imitatur.</i>	4
<i>Ars sutoria, vide sutoria.</i>	
<i>Arteriæ carotides vid. carotides.</i>	

INDEX.

<i>Articuli pulmonum vid. pulmonum.</i>	
<i>Artifices sedentarii cur raro consenescent.</i>	308
<i>Artuum sphacelatorum amputatio quandoque subito interficit.</i>	55
<i>Aspera arteria, vid. trachea.</i>	
<i>Asthma convulsivum quando mortiferum.</i>	91
<i>Athletæ quomodo, & quando repentinis mortibus corripiantur.</i>	107
<i>— quomodo a subita nece præservandi.</i>	123
<i>— his quando imperanda exercitatio.</i>	124
<i>— iisdem stomachus validus obest.</i>	125
<i>Audacia vide timoris.</i>	
<i>Auri tinctura absque menstruo corrosivo laudatur.</i>	186
<i>Auster, & Aquilo noxii ex Hipp.</i>	156
<i>— ille Romæ deterior.</i>	157
<i>Autumnale æquinoctium phthysicis mortiferum.</i>	110

B.

B <i>Aglius laudatur.</i>	297
<i>Balnea aquæ dulcis in calida paralysi.</i>	208
<i>Balneum frigidum post corporis calefactionem repentine mortis causa.</i>	23
<i>— eius usus in spasmis a materia subtili.</i>	137
<i>Bernabeus Physicus nominatus.</i>	172
<i>Bernardini Medici mentio.</i>	192
<i>Biliaria vesica pus, & ulcera in cadauere observata.</i>	242
<i>— mala ab his producta.</i>	245
<i>Bilis vitia multorum pectoris morborum radix.</i>	251
	Bo-

INDEX.

Bonum nullum in terris absque mixtura mali. 168
Brutorum mors repentina quandoque ex causis vni-
uersalibus. 150

C.

C*Adauerum frequens sectio magnæ utilitatis.* 106
— quales internæ lesiones inueniende sint, caute a
Medicis prædicendæ. 244

Cadauerum fœtor signum mortis certissimum. 73

Calcis effluvia nocua. 201

Campborata in spasmo pectoris. 138

Capitis vulnera, vid. vulnera.

— leuis contusio & c. sæpe funesta, & cur. 45

Carbonum fumus, vid. fumus.

Cardiaca in spasmis pectoris quomodo vsurpanda. 138

Cardiogmos quando mortem repentinam portendat
etiam ex Hipp. 101

— rationes adducuntur. 102

Carotides ad explorandum superstitem pulsum cur
aptiores. 79

Catarrhus suffocatiuus. 88

Causæ subitaneæ mortis quot, & quales. a pag. 15. usq;
ad 55

— semper cum tempore operantur. 15

Cerebri structura, eiusque viarum libertas ad vitam
necessaria. 43

Cerebrum per nervos cor, & thoracem mouet, & vi-
cissim mouetur. 5

— est vnum ex tribus solidis maioris usus. 18

— eius hemisphæria an e directo corporis partibus re-
spondeant. 231

INDEX.

- *per decussum respondere probatur.* 232
- *horum subita, & constans læsio mortem repentinam accersit.* 233
- *eius lentæ congestiones repente tandem ingulant.* 46
- *corticalis substantia polypea.* 49
- *vasorum turgentia quomodo dignoscatur.* 208
- *spasmm quenam indicent.* 289
- *eius, & cordis læsio respirationis causa, & contra.* 58
- *eodem conuulso, serum in eius sinubus tanquam effectus reperitur.* 24
- Chalybeata, vide Martialia.*
- Chocolata pro causa grassantis repentina mortis perperam adducta.* 152
- *est probi nutrimenti.* 160
- Ciborum indigentia, vide indigentia.*
- Circulatio in præcordiis duplici ex causa intercepta.* 276
- Circulationis in cerebro inæqualitas ob sanguinis vitium.* 214
- *ab Hipp. indicatur.* *ibid.*
- Coffe potus in congestionum cura.* 142
- Congestionum curatio Medicum exigit omnino prudentem.* 140. *seq.*
- Conuulsio vasorum quomodo contingat.* 277
- *eius causa experimentis roboratur.* 292
- Conuulsiones pertinaces ad subitam mortem sunt viæ.* 131. *fin.*
- *ipsarum curatio extra paroxysmum.* 205

I N D E X.

<i>Cor suis vasis est vnum ex tribus solidis maioris vsus.</i>	23
<i>Cordis congrua structura ad vitam necessaria.</i>	36
— <i>etiam systole, & diastole.</i>	38
— <i>eius, & vasorum vis circumpulsiva rationem habet ad determinatam sanguinis molem, & gravitatem.</i>	24
— <i>eadem a structura, fluidisque nerueo, & sanguineo pendet.</i>	36
— <i>ideo ab istorum fluidorum defectu, aut vitio labe- factatur.</i>	37
— <i>conuulsio, obstructio &c. mortis causa.</i>	ibid.
— <i>morsus a vermibus.</i>	38.
— <i>dolor pertinax in senibus exitialis.</i>	40. 100
— <i>huius rei ratio.</i>	102
— <i>an in pectoris conuulsionibus cor compatiatur ma- xime obseruandum.</i>	137
<i>Cordis motus in pseudo-mortuis quinam.</i>	72
— <i>sepultus quid indicet.</i>	74
— <i>in pseudo-mortuis quot modis perquirendus.</i>	78
— <i>paralysis future indicia.</i>	98
— <i>palpitatio qualis plus, minus perniciosa.</i>	99
— <i>eadem cum sterni dolore sepulto.</i>	300
— <i>cum vertigine vnde.</i>	309
— <i>prodest vrina stranguriosa.</i>	100
<i>Cordis sarcomata in semilunaribus valvulis.</i>	220
— <i>vitia diuersa ab Authoribus notata.</i>	226
— <i>ingens amplitudo.</i>	242
— <i>a Marchetto etiam inuenta.</i>	267

I N D E X.

- magni, & prolabentis supra diaphragma symptomata. 253
- eius rigiditas in cadauere. 286
- immobilitas ex aortæ compressione. 290
- idem cor inuentum inter duo aneurysmata. 311
- Cornacchini pulueris vsus in subitaneis morbis. 199
- Corpora repentinæ morti subiecta multipliciter consideranda. 114
- bene nutrita phlebotomiam cur felicius fuerint experta. 174
- Corporum varia dispositio aëri noxio diuersimode resistit. 21
- post eorum excalesfactionem frigidus potus, & balneum cur lethifera. 23
- Corrosio lenta sanguiferorum valetudinarios sæpe detinet. 132
- Corrosionem magnorum vasorum quam præcedant. 14
- Corticis peruuiiani vsus in præseruatione a spasmo. 137
- cerebri pars dextera flaccida reperta in quodam cadauere. 218
- Cranii foramen, vide foramen.
- Cranio desquamato, cerebrum facile afficitur. 251
- Crisis suppressa ubi subitam mortem præsagiat. 109
- Cursorum præcordia cur facile labefactentur. 258
- Cyathus supra Xiphidem positus ad explorandum an vere quis mortuus.

I N D E X.

D.

- D***Ecoctiones vulneraria, vide vulnera.*
— exsiccantes dictæ in apoplecticis sæpe noxia. 185
- Deliquia animi, vide animi deliquia.*
- Diabeticorum renes flaccidi, ac ductiles.* 294
- Diaphragmatis vulnera, vide vulnera septi &c.*
— læsio tussim siccam excitat. 48
— qualis motus in pseudo-mortuis. 74. *sequ.*
— idem quomodo perquirendus, vide cyathus.
- Dieta athletis necessaria.* 123
— exsiccans obesis iungenda. 127
— præservatiua in aneurysmatibus ex Hipp. 132
— cur in his tantopere commendetur. 134
— in Epilepsia idiopathica. 140. *seqq.*
— pro præservatione a subito interitu. 145
- Diætæ animi tranquillitas iungenda ex diuino Oraculo.* *ibid.*
- Diluentia temperata ab Hipp. quandoque laudata.* 184
- Disruptio vasorum non a solis externis causis excitari potest contra Laurentium.* 313
- Diuites a mortibus repentinis præ pauperibus cur felicius euaserint.* 159
- Dolores diuturni circa cor &c. quid indicent.* 100
— interni pectoris quinam lethales. 89
— laterales quosnam morbos arguant. *ibid.*
— in spasmodicis affectibus quid admittant. 138
— vagi externarum partium quando lethales. 203

I N D E X.

<i>Doloris in syncipite, & oculo sinistro causa in opposito latere delitescens.</i>	49
<i>Ducia in spasmodis a tenui materia pendentibus.</i>	137
<i>Dura matris morbofa contractio in cadauere.</i>	247
— <i>notabilis laxitas.</i>	247
— <i>paralysis.</i>	249

E.

E <i>Misarii occlusio saepius subita mortis praludium.</i>	111
— <i>dum viget est medela.</i>	114
<i>Emplastica in spasmodis a subtili materia ortis.</i>	137
<i>Emulsiones in spasmodis pectoris.</i>	138
<i>Epicratica purgatio, vide purgatio.</i>	
<i>Epidemica non fuit praesens morientium constitutio.</i>	164
<i>Epilepsia cessante, cur interdum mortifera corripiat apoplexia.</i>	30
<i>Epilepsia pertinax cur frequenter in apoplexiam transeat.</i>	ibid.
— <i>quomodo contingat.</i>	28
— <i>hac correpti, qui repente decedant.</i>	116. seq.
— <i>in idiopathica abstinendum a vino.</i>	140
— <i>in sympathica tam vomitus, quam purgatio conuenit.</i>	139
<i>Epileptica apoplexia, vide apoplexia &c.</i>	
<i>Essexarum repulsio aliquando mortifera.</i>	239
<i>Ethnicorum sententia de subita morte eligenda damnatur.</i>	119

I N D E X.

<i>Euacuationes suppressæ modo sunt signa, modo etiam subita mortis causæ.</i>	111
<i>— & contra.</i>	112
<i>Exercitatio Athletis quando imperanda.</i>	124
<i>— eius utilitas.</i>	128
<i>Exercitium vehemens vasorum rupturam promouet.</i>	134
<i>Experimenta Authoris de causis particularibus in singulis hoc anno morientibus.</i>	153
<i>Extispiciorum utilitas, & cautela.</i>	245

F.

<i>Facies in Ægrotis iuxta cordis affectiones varie coloratur.</i>	297
<i>— cadauerum sæpe Medicos erudit.</i>	240. fin.
<i>Facultas pulsiva ad Vitam necessaria.</i>	36
<i>Febris quando subitam mortem posset auertere.</i>	248
<i>Ferramenta ignita pedum plantis admota in forti apoplexia.</i>	181
<i>Fibræ tendineæ, vide tendineæ.</i>	
<i>Fistulis ani occlusis mors repentina quando.</i>	111
<i>Fluida, & solida maioris vsus animalium perfectorum Vitam constituunt.</i>	3
<i>— qualia sint.</i>	18
<i>Fluxilitas summa sanguinis in cadauere.</i>	285
<i>— raro inuenitur.</i>	289
<i>— cur acciderit in nostro casu.</i>	291
<i>Fœminæ in hac mortifera constitutione maribus feliciores.</i>	161
<i>— rationes adducuntur.</i>	162

INDEX.

<i>Fonticulorum occlusio sæpius mortis signum , quam causa.</i>	112
<i>Fonticulus vtiliter excitatus.</i>	238
<i>Foramen cranio forsan innatum.</i>	243
<i>— quomodo infirmanda dura matri contulerit.</i>	250
<i>Frigidus potus quando, & quomodo subitæ necis causa.</i>	23
<i>Frontis venarum incisio in præsentì constitutione utilis.</i>	171
<i>Fru menti corrupti exhalationes cur pestifera.</i>	21
<i>Fumus carbonum aërem ad necem vsque inquinat.</i>	20
<i>— ex eodem trachæa color vitiat.</i>	277
<i>Funerum apparatus tardi cur inuenti.</i>	69. seq.
<i>Fungi Melitensis vis vulneraria.</i>	136

G.

G <i>Attuccius Physicus allegatus.</i>	211
<i>Gaudio subito perculsi cur interdum repente concidant.</i>	23
<i>Glandula scirrhusa sub cerebello cur subitam mortem asciuerit.</i>	52
<i>Glandularum racemi ad sinus duræ matris obseruati.</i>	217
<i>Glandulæ vberius liquida secernentes cur euadant graciliores, & e conuerso.</i>	233
<i>Graciles cur variis repente moriantur.</i>	108
<i>Gummosa in phlegmaticis congestionibus curandis.</i>	142

INDEX.

H.

H æmorrhagia quando sit subita necis præſagium.	105
— larga in quodam ſene utilis.	178
Hæmorrhoides ſenum ſuppreſſa aliquando ſubita mortis præluſium.	110
— iisdem reſtitantibus fortis apoplexia.	193
— arte reuocatis morbi ſolutio.	194
Hemiſphæria cerebri, vide cerebri &c.	
Hepatis tumor folliculatus tuſſim ſictam excitabat.	48. ſin.
— abſceſſus poſt interimentia capitis vulnera.	117
Herbarum epicerauſticarum uſus.	142
Hirudines naribus quando applicandæ.	208
Hiſpanium vinum ſeptentrionalis ventus glaciât.	20
Homo grauius, & frequentius agrotat, quam bruta.	119
Hydatiſ inſignis in pia meninge.	50
Hydrops pectoriſ repentinus cur aliquando ex tempore perimat.	33
— ex cauæ ligatura ortus.	278
Hypochondriorum ſucci præcordiis, & cerebro ſæpe mortiferi.	24
— qua via ad haſ partes ferantur.	195. 204. 279.
— conuulſiones eliminantia.	137
— tenſioni quomodo ſuccurrendum.	204
Hystericis paroxyſmis ſolum tempus quandoque medetur.	65
	In-

I N D E X.

I.

I ntemperantes &c. in prasenti constitutione repente sublati.	154. 162
Inuincibiles repentinæ mortis causæ quales.	62
Iudicium cautela aduersus simulatos mortuos.	68
Jugularium incisio in hac constitutione cur proficua.	172
— cerebri, & præcordiorum morbos leuat.	173
Iuris longi vsus.	184

L.

L Actis vsus in spasmis a tenui materia.	137
Lamella ossæa in aneurysmate.	302
Lamina ignitæ pedibus admotæ in forti apoplexia utiles.	181
Lana naribus admota ad dignoscendum an quis mortuus.	75
Latex a cadaueris pulmone compresso manans.	271
Latinus Physicus carcerum.	240
Liquida quedam morbosæ per secernicula naturalia ægre secedunt.	196
Liquidî impetus, vide impetus.	
Liquidorum magna vitia solidis exitialia, & contra.	60
Loquela post raninas incisas restituta	191
Lympha in thorace aut cerebro collecta non semper morbi, aut mortis causa.	24
Lymphatica piæ matris varicosa.	48
Lym-	

INDEX.

- Lymphaticorum internorum ruptura quomodo pra-
cauenda.* 135
- Lympha congestio in spasmis pectoris quibus auerten-
da.* 138
- con crescentis causa ex Chymicis.* 265

M.

- M***Ala, quæ mortem præcedunt, diligenter inuesti-
ganda.* 245
- Manfredus inter Romanos Medicos, laudatur.* 192
- Mares in hac constitutione fœminis deterius habue-
runt.* 161
- Marmontana, vide muris montani.*
- Martialia in præseruatione a spasmis ex materia visci-
da.* 137
- Mechanicam in Medicina primus inuexit Hippocra-
tes.* 4
- Medici spes in hystericis paroxysmis qualis.* 65
- prudentia, & fama in scientia prædicendi.* 82
- 118
- ingens labor in curandis solidorum morbis.* 209
- cautela in prædicendis internis cadauerum lesioni-
bus.* 244
- Medico-astronomica vide observationes.*
- Medicus in diuinando sit peritus ex Hippocrate.* 115.
- Meningum, & corticis cerebri motus ad Vitam ne-
cessarius.* 43
- ex horum constanti lesione mors citissima.* 44
- compressis neruis ad has partes tendentibus idem
euenit.* 52
- con-

INDEX.

— conuulsio in epilepsia idiopathica duplici de causa contingit.	28
— motus multipliciter ablati.	53
— abscessus polypeus.	48. sequ.
Menti, & sensibus non omnia innotescunt.	72
Mistichellus Physicus laudatus.	181
Morbi externi diuturni cur valetudinariis saepe proficiunt.	143
— ex loco tantum differunt.	195
— ipsorum occasiones perpendenda ex Hipp.	212
Mors quid sit.	10
— eius diuisio, & natura.	11
— etsi indiuidua in plures tamen vulgo distinguitur.	7
— variae eius species multipliciter consideranda.	8
— eius varia discrimina Moralists ad corrigendos mores hominum utilia.	ibid.
— inopinata a probis Viris non exoptanda.	120
— naturalis accidit decrepitis aequae ac iuuenibus languidis.	12
— subita ex obstructione, compressione &c. cordis, & vasorum.	37
— quibus potissimum accidat.	86
— qualibet est repentina, & cur.	7
Mortis idea ex Vita notione desumenda.	1
— differentiae vnde petenda.	9
— sunt duplicis generis.	17
— causae in repentina semper cum tempore operantur.	16

I N D E X.

— <i>occasiones sæpe confunduntur cum causis, vide occasiones.</i>	
— <i>signum certissimum, vide fætor.</i>	
<i>Mortui simulati quomodo dignoscantur.</i>	67
— <i>repente tardius sepeliendi.</i>	70
<i>Mortuus a pseudo-mortuo quomodo distinguendus.</i>	74
<i>Motus non vitales aliquando etiam in mortuis.</i>	77
— <i>cordis in pseudo-mortuis, vide cordis &c.</i>	
<i>Muris montani adeps ad paralysem.</i>	190. seqq.
<i>Mumiata in spasms præcordiorum quomodo usurpanda.</i>	138. fin.

N.

N <i>Arcoticorum vsus in spasms cum dolore.</i>	137
— <i>Nasi mucus suppressus a calcis effluviis.</i>	202
— <i>cruenta ab eodem filamenta pendentia interceptionis vasorum sunt indicia.</i>	278
— <i>venæ apertæ utiles in hac constitutione.</i>	171
— <i>eidem hirudines quando applicanda.</i>	208
<i>Nervus succus vnum ex tribus fluidis maioris usus.</i>	18
<i>Negligentia quandoque superantur morbi.</i>	61. fin.
<i>Nervis prope iugulum ligatis, mors in cane ex Valsalva.</i>	53
<i>Nervorum discontinuatio cum cerebro insuperabilis causa repentinæ mortis.</i>	62
— <i>liquidi motus in pseudo-mortuis qualis.</i>	72
— <i>motiones sopitas excitantia.</i>	81
— <i>opticorum compres. vide optic.</i>	

INDEX.

- Nobiles huius constitutionis vim rari subierunt.* 159
— contrarium accidit Leidenſibus teſte Syluio. *ibid.*
Nuccarinus Fulginei Phyſicus commendatus. 47

O.

- O***Befis repentina totalis vaſorum intra cranium obſtructio facilis.* 51
— cur præ gracilibus mors accidat improuiſa. 108
— præſeruatiua remedia qualia. 128
Obſeruatiōes Medico-aſtronomicae vtilēs ad prædicendum. 116
Occaſiones aliquando confunduntur cum cauſis ſubite mortis. 16
Odoramenta venefica aërem peſtiferum reddunt. 21
Oleoſa cum fluidis exhibita a quibus ſpaſmis præſeruant. 137
— in ſpaſmis peſtoris cum lymphæ congeſtione. *ibid.*
Omenti loco nigra membrana in cadauere inuenta. 218
Opī vſi vis vulneraria. 136
Opticorum neruorum compreſſionem quanam indicent. 116
Ordo anima diſciplinarum. 113
Oris ventriculi morſus a vermibus. 38
— collutiones ex diſſoluentibus vtilēs in aphonis. 189

P

- P***Acchionus Phyſicus laudatus.* 49
Palpitatio, vide cordis &c.
Pancreatidis mollities excedens in cadauere. 285
Para-

I N D E X.

- Paralysis præcordiorum, vide præcordiorum &c.*
— cordis, & arteriarum 37. vide etiam cordis,
— partium omnium intra cranium. 249
— post syncopem &c. opportuna. 207
— ex inæqualitate circulationis sanguinis. 214
— ex causa calida curatio. 208
Paregorica in spasmis pectoris quando conducant. 138.
Pascolus Phyzicus publicus Anatomes Professor. 240
Pauli Sacr. Pal. Ap. Medicus. 240
Pauperes, vide Diuites.
Pectoris hydrops repentinus, vide hydrops.
— dolores, vide dolores pectoris.
Penis est musculus. 295
— rigidus in cadauere obseruatus. 285
— spuria erectio in cadauere quomodo excitetur. 296
Pericardii cum corde adhesio quibus familiaris. 225
Pericardium concreto sanguine plenum. 303
Periculum mortis quibus ægris aperiendum. 87.
seqq.
Perspiratio in agentibus sessilem Vitam, cur, &
quibus in partibus minor habeatur. 126
Pestes animalium particulares vnde. 21. & seqq.
Philosophia experimentalis illustratur etiam iis, quæ
successum non habuerunt. 9
Phyzicis quale æquinoctium magis lethale. 110
Phyzicis mortium varia discrimina quid sugge-
rat. 8
Pie matris lymphatica, vide lymphatica.

I N D E X.

<i>Pierleonus Medicus allegatus.</i>	193
<i>Pillul. de succino Cratonis vsus.</i>	194
<i>— de spuma chalyb.</i>	139
<i>Placentius Medicorum Urbis senior in authorita- tem adductus.</i>	152
<i>— eiusdem mentio.</i>	102. 211. 240
<i>Plethora nimia repentina mortis causa.</i>	23
<i>— oritur sæpe a stomacho valido.</i>	125
<i>Podagra suppressa quinam morbi insurgant.</i>	50
<i>Pondus aëris ex fodinarum effluuiis maius.</i>	20
<i>Polypi acidis non alcalicis dissoluuntur.</i>	282
<i>— constructio in aneurysmate.</i>	302
<i>Præcordia in Cursoribus, vide Cursorum &c.</i>	
<i>— iisdem conuulsis seri effusio intra thoracem.</i>	24
<i>Præcordiorum labes aliene communicata.</i>	275
<i>— aneurysmata, vide aneurysmata &c.</i>	
<i>— paralysis mortem infert insensilem.</i>	14
<i>— dilatatio morbose principiis hydrometricis illu- strata.</i>	261
<i>— pertinax conuulsio postquam cessauerit cur nibilo- minus interdum mortifera.</i>	40
<i>— spasmus quæ signa indicent.</i>	289
<i>Præfocati aliquando naturaliter rediuiui.</i>	61
<i>Præseruatiua methodus a subitaneis mortibus.</i>	130. seqq.
<i>— ex Christi Oraculo vera in tranquillitate, & so- brietate.</i>	145
<i>Prolabentis Cordis supra diaphragma modus me- chanicus exponitur.</i>	259
<i>— cur in isto casu palpitatio post cibum succedat. ib.</i>	
<i>Pro-</i>	

I N D E X.

<i>Prolapsus cordis quandoque hydropem mentitur.</i>	268
— <i>symptomata ipsum concomitantia.</i>	253
<i>Prudentia summa est necessaria in Medicina.</i>	83
— <i>quomodo acquiratur.</i>	84
<i>Pseudo-mortui difficulter a mortuis distinguuntur.</i>	71
— <i>quomodo tamen id assequimur.</i>	74
— <i>in his centrum diaphragmatis solum trepidat.</i>	71
— <i>cordis motus in iisdem qualis.</i>	ib.
<i>Puerperis mors repentina quando.</i>	109
<i>Pulmonica vena, vide venæ &c.</i>	
<i>Pulmonum adhesio cum costis.</i>	271
— <i>aliquibus forte naturalis.</i>	280
— <i>latex ab ipsorum superficie manans.</i>	271
— <i>rigiditas in cadauere.</i>	286
— <i>apoplexia mortifera.</i>	88
— <i>eorundem articulorum conuulsio.</i>	ib.
— <i>quosnam repente interimat.</i>	90
— <i>ex ea quinam diutius seruentur.</i>	91
<i>Pulsus in carpis deficiens non semper cordis motus cessationem testatur.</i>	79
— <i>intermittens non semper funestus.</i>	96
— <i>Authoris experimento comprobatur.</i>	97
— <i>tardus quando exitialis.</i>	98
— <i>aliquando ob tangentis incuriam mortuis attri- bui potest.</i>	80

INDEX.

Q.

Quercet. antepilepticum medicamentum laudatur. 209

R.

- R**aninis incis, vide loquela.
- Realis Sacr. Pal. Apost. Medicus. 240
- Remedia mixta quando vsurpanda. 142
- Repente mortui tarde sepeliendi. 70
- quo morbo laborauerint maxime sciendum. 236
- Repentinae mortis idea. 14
- species rara etiam ex Laurentio. 312
- causa sunt duplicis generis. 17
- semper cum tempore operari solent. 15
- non omnes inuincibiles. 62. 64
- vincibiles ex medentium audacia, & natura viquales. 64
- eadem mors a magna sanguinis diminutione. 22
- ex pertinaci eiusdem mora, aut impetu in praecordiis, & cerebro. 23
- ob spiritum sponte cohibitum. 34
- ex esis parietibus cordis, & sanguiferorum. 36
- quomodo ex inflicto pugno sub Xiphoide. 39
- inhibito spirituum animalium influxu ad praecordia. 44

INDEX.

— <i>a leui capitis contusione &c.</i>	45
— <i>cur in his præcedat rigor.</i>	45
— <i>quomodo ex sternutatione contingat.</i>	ibid.
— <i>ex lentis in cerebro congestionibus.</i>	140
— <i>compressis &c. neruis etiam extra cranium.</i>	52. fin.
— <i>aëris, ac instrumentorum respirationis vicio.</i>	58
— <i>ob triplicem contemporaneum morbum.</i>	60. 298
<i>Repentina mors quandoque grassatur in homines,</i> <i>& bruta, ex causis vniuersalibus.</i>	150
— <i>eiusdem causa in præsentì constitutione non vni-</i> <i>uersalis, sed particularis fuit.</i>	151
— <i>idcirco non vnicum signorum genus præiuit.</i>	162
— <i>cum ab vniuersali causa producitur eadem sem-</i> <i>per signa adsunt.</i>	163. fin.
— <i>ea grassante, cæteri morbi, & mortes, Romæ mi-</i> <i>nus frequentes.</i>	166
— <i>& contra.</i>	168. fin.
<i>De Rubeis Medicus nominatus.</i>	193

S.

<i>Salis vrinosi vim ad dissoluendum sanguinem.</i>	292
<i>Salsæ infusio in paralyssi utilis.</i>	189. 194
<i>Sanguis vnum ex fluidis maioris vsus.</i>	18
— <i>instar aquæ hydraulica machina mouetur, & mo-</i> <i>uet.</i>	4
Z 3	— qua-

I N D E X.

- *quadrupliciter fit causa mortis repentina.* 22
- *intra compressam arteriam violenter trusus cunei, & vectis potentiam induit.* 262
- Sanguinis impetus aut mora pertinax ubi mortis repentina causa.* 23
- *fluxus ad cerebrum interceptus subito interficit.* 26
- *missio parca in principio aneurysmatum laudatur.* 132. seqv.
- *item in morbis capitis cum plenitudine.* 139
- *in hac constitutione profuit ex syderata etiam parte, & cur.* 171
- *ex iugularibus, sublingualibus.* 172. seqq.
- *tollit vasorum interceptionem.* 175
- *Rome non semper prodest.* 176
- *quando omittenda.* 200
- Sanguinis coagulatio lacti coacto assimilatur ab Hipp.* 158
- *hanc serositatem exundatio consequitur.* 157
- *morbofa penetratio ad cerebri medullam vnde.* 295
- *fluxilitas, vide fluxilitas.*
- Sarcomata cordis, vide cordis &c.*
- Saxus Physicus allegatus.* 211
- Secernicul. natural. vide liquida.*
- Senes syderationibus sunt subiecti.* 114
- *quando facile euadant apoplectici.* 116
- Sensibus, & menti non omnia innotescunt, vide menti.*
- Senum tussis, vide tussis.*

I N D E X.

— dolor cordis, vide cordis.	
— hæmorrhoides, vide hæmorrhoides.	
— iisdem bene nutritis phlebotomia salutaris.	178
Septitransuersivulnera, vide vulnera thorac.	
Septentrionalis ventus mortifer, vinumque hispanicum congelians.	20
Sepulchrorum exhalationes cur exitiales.	21
Serum lactis quibus spasms conferat.	137
— cum infusione radicis chinæ ubi usurpandum.	144
Setonis vsus.	209
Simoncellus publ. Anat. Minister.	240
Sincipitis sinistri dolor, vide dolor.	
Sinibaldus Protomedicus laudatus.	179. 211. 240
Sinister cordis sinus duplo maior dextero.	255
— cur sanguinis motus per hunc tardior fuerit.	263. seq.
Sobrietas Vitæ protrahende fundamentum.	127
— aneurysmaticis maxime conducit.	133
Solida, & fluida maioris vsus quomodo animalium perfectorum Vitam constituent.	3. sequ.
— utraque sunt tria.	18
— ad interitum mutuo conspirant.	32
— eadem structura, vel motu pertinaciter læsa sunt mortis repentinæ causa.	34
— ipsorum vitia fluidis exitialia, & contra.	60
Solidorum morbi difficilis sunt curationis.	209
Solstitia apoplexiarum feracia.	115
Spasmi pectoris quomodo sint tractandi.	138

INDEX.

<i>Spasms a materia subtili productis quomodo succurrendum.</i>	137.
— <i>a materia viscida aliter tractandi.</i>	ib.
<i>Spasms vniuersalis a meningibus.</i>	291.
<i>Sphacelati artus, vide artuum.</i>	
<i>Spiritus in homines summa necessitas.</i>	33.
— <i>sponte cohibitus subita mortis causa.</i>	34.
<i>Spiritus dictus Vita quid, eiusque vsus.</i>	189.
<i>Spirituum defectus mortalis ex variis causis.</i>	26.
— <i>copia quomodo exitialis.</i>	27.
— <i>item acrimonia.</i>	ib.
— <i>vitium ab aëre haustum.</i>	31.
— <i>animalium descensus ad præcordia inhibitus subita mortis causa.</i>	44.
<i>Sterni dolor sepulius &c.</i>	299.
— <i>pars dextera elatior inuenta.</i>	160.
<i>Sternuentibus mors subita.</i>	45. seq.
— <i>mos precandi salutem vnde.</i>	46.
<i>Sternutatoria acria pro sepulta respiratione excitanda.</i>	75.
<i>Stibiata in thoracis spasms quando conueniant.</i>	138.
— <i>in curatione pblegmaticarum congestionum.</i>	141. fin.
<i>Stibii diaph. vsus ad aphoniam utilis.</i>	189.
<i>Stomachus validus cur interdum plethoricis infensus.</i>	125.
— <i>debilis quomodo ad protrahendam vitam conferat.</i>	136. fin.
— <i>ad eius languorem ius appropriatum.</i>	200.
	Suc-

I N D E X.

<i>Succinata in thoracis spasms.</i>	138. fin.
<i>Suffocatio inter morbos huius constitutionis.</i>	58
<i>Sulphurata in spasms pectoris.</i>	138
<i>Sutoria ars in firmandis præcordiorum partibus conducit.</i>	308
<i>Syderationis origo interdum a corde eiusque vasis.</i>	298
<i>— nomine quid comprehendat Hippocrates.</i>	ib.
<i>Syncope ex cordis, & arteriarum paralyfi.</i>	37
<i>— morbus huius constitutionis.</i>	57
<i>— hac correpti, vide præfocati.</i>	
<i>— ab erosione & c. est invincibilis.</i>	63
<i>— eiusdem recursus.</i>	204
<i>— vitio valvularum cordis observata.</i>	218
<i>Syncopem lethalem ex obstructione & c. quanam præ- cedant.</i>	14
<i>Syncopis particularis mortiferæ causæ mixta.</i>	248
<i>— periculum detractum.</i>	206

T.

<i>T</i> <i>Abaci usus non fuit in causa grassantium repen- tinarum mortium.</i>	152
<i>Tabidis & c. cordis cum pericardio adhesio familia- ris.</i>	225
<i>Taciturnitas quid indicet.</i>	206. 208
<i>Temperati mortem repentinam hoc anno non subie- runt.</i>	159
<i>Tendineæ fibræ pulmones costis colligantes.</i>	271

INDEX.

<i>Terra motus pro causa huius mortiferae constitutionis falso accusatur.</i>	152
<i>The in congestionibus curandis.</i>	142
<i>Thomassinus Proto-Medicus allegatus.</i>	240
<i>Thoracis vasis interceptis, apoplexia succedit ex Mart. & Fracass.</i>	273
<i>Therebintinata in spasmodis pectoris cum lymphæ congestionem.</i>	138
<i>— in curatione congestionum.</i>	142
<i>Thoracis vulnera, vide vulnera thoracis.</i>	
<i>— in spasmodis quid observandum.</i>	138
<i>Timidi quomodo a subita nece præcauendi.</i>	129
<i>— subito perculsi interdum repente concidunt.</i>	23. seq.
<i>— ipsorum cerebri constitutio qualis.</i>	24
<i>— phlebotomia quando conveniat.</i>	ib.
<i>Timoris, & audaciæ causa in solidis partibus.</i>	104
<i>Tracheæ vitio subita mors varie contingit.</i>	33
<i>— color fulgineus, vide fulgineus.</i>	
<i>Trullus Physicus laudatur.</i>	49. 198
<i>Tuberculo apparente ad exteriora pectoris, & cerebri, quorundam symptomatum alleviatio.</i>	209
<i>Tuberculum pulmonis sepultum quomodo dignoscatur.</i>	89
<i>— de ipso quando dubitandum.</i>	138
<i>Tussis sicca ex diaphragmatis labe.</i>	48
<i>— cum fœtore quid indicet.</i>	90
<i>— diu.</i>	

INDEX,

- diuturna humida in siccam conuersio in senibus exitialis. 87
- suffocatiua quomodo. 88

V.

- V**aletudinarii alii interius, alii exterius egrotant. 130. *fin.*
- triplex affectionum genus eos ad subitam necem disponit. 131
 - quomodo ab eadem præseruandi. 143
 - in præfenti constitutione subito periere. 154
- Valetudinariis diuturni morbi externi sæpe conferunt. 143
- mors subita fuit Romæ instar malæ crisis. 154
- Valsalua Anatomicus Bonon. laudatur. 213. 231
- eiusdem experimentum nobile. 53
- Valuularum semilunarium sarcomata. 220
- a nemine indicata. 226
 - productio quomodo euenerit. *ibid.*
 - iisdem durantibus, quomodo pulsus æqualis esse potuerit. 227
 - quomodo syncopem sollicitauerint. 228
- Varices in pulmone cadaueris. 219
- pro aneurysmatibus accipit Hippocr. 132
 - internæ cognitu difficiles. 84
 - lymphaticorum piæ matris. 48
- Variolarum retrocessio quando mortifera. 110
- Vasorum magnorum corrosionem quid præcedat. 14. *seq.*
stru-

INDEX.

— <i>structura, & libertas ad vitam necessaria.</i>	36
— <i>convulsio, compressio &c. mortis cause.</i>	37
— <i>interceptio, vide interceptio.</i>	
— <i>dehiscencia in ascite.</i>	281
— <i>disruptio, vide disruptio.</i>	
<i>Vasorum, & cordis vis pulsiva determinata moli, & gravitati sanguinis proportionalis.</i>	24
<i>Venæ pulmonicæ dilatatæ indicia.</i>	89
— <i>rupturam quænam precedant.</i>	90
<i>Venæ causæ ruptura.</i>	304
— <i>corrosio quomodo inducta.</i>	309
<i>Venetiis olim repentinæ mortes grassatæ sunt.</i>	51
<i>Ventriculi vitia cerebro, & præcordiis communicata.</i>	24
<i>Ventus interdum mortiferus.</i>	21
<i>Venus in senibus perniciosa.</i>	27
<i>Vermium morsus quomodo mortem inferat.</i>	38
— <i>in ipsorum suspitione quid agendum.</i>	138
<i>Vertigo tenebricosa.</i>	300. fin.
— <i>cum palpitatione cordis vnde.</i>	309
<i>Vesicantia sunt emisaria artificialia.</i>	180
— <i>ipsorum usus, & utilitas.</i>	180. & 194
— <i>quid excitent.</i>	196
<i>Veternus larga hæmorrhagia in sene sanatus.</i>	178
<i>Victus plenus ubi noxius.</i>	198
<i>Vini abstinencia Athletis necessaria.</i>	123
— <i>item in Epilepsia idiopathica.</i>	140
<i>Viperata in præcordiorum spasmodis quando præscribenda.</i>	138
— <i>valetudinariis præservandis.</i>	144
<i>Viri-</i>	

I N D E X

<i>Virium praeceptus lapsus.</i>	310. fin.
<i>Vis mouens ad vitam necessaria.</i>	36
<i>Viscerum vigor confert ad morbos ad exteriora de- trudendos, & contra.</i>	213
<i>Vita notio veram mortis ideam exhibet.</i>	1
— <i>de hac Aristoteles obscure scripsit.</i>	2
— <i>uniuersalis conceptus vnde.</i>	ib.
— <i>tria sunt necessaria ex parte cordis magnorum va- sorum.</i>	36
<i>Vita in animalibus perfectis in quo consistat.</i>	3
— <i>longa ob sobrietatem.</i>	127
— <i>sepulta in morientibus quomodo excitanda.</i>	80
<i>Vomica pulmonum, vide pulmonum.</i>	
<i>Vomitus in epilepsia sympathica excitandus.</i>	139
— <i>quibus proficius.</i>	184
<i>Vrina stranguriosa in palpitatione salutaris.</i>	100
— <i>quando dubia.</i>	206
<i>Vteri conuulsionum medela.</i>	137
<i>Vterus quomodo labem mortiferam in praecordia, & cerebrum suffundat.</i>	24
<i>Vulnera circa iugulum cur lethalia.</i>	26
— <i>thoracis, & septi simul transuersi quanam, & cur perimant.</i>	34
— <i>capitis subito enecantia, quæ. 117. & seqq.</i>	
<i>Vulnerar. decoct. usus in vasorum aponia.</i>	135.
<i>Vulnus capitis profundum cur lethale.</i>	44

INDEX.

X.

- X** *Iphoidis cartilaginis percussio cur aliquando
mortifera. 39*
— *mirabilis partium nexus sub ipsa delitescens. ibid.*
— *Cyathus eidem applicatus ad quid. 77*

FINIS.







2/6-

RB-

24020th

